

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA FRUTTIFERI n° 24 del 25 giugno 2015

INFORMAZIONI GENERALI

- Le indicazioni fornite nel presente bollettino relative alla difesa dalle avversità e al controllo delle infestanti, nonché all'uso di fitoregolatori, sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale, e risultano vincolanti solo per le aziende che aderiscono a programmi di difesa integrata volontaria al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità (Global gap, marchio regionale AQUA, ...), o alla conduzione biologica (quando specificato), mentre per tutte le altre aziende le indicazioni devono essere considerate consigli dati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 relativo alla difesa integrata obbligatoria.
- Il Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia da applicarsi nell'annata agraria 2014-2015 che ha ottenuto i pareri di conformità dei gruppi tecnici "Difesa" e "Tecnica agronomica" operanti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stato approvato con Decreto del Direttore del Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 50/SCS/ del 5 marzo 2015 ed è pubblicato sul sito dell' ERSA al seguente link: <http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/avviso-homepage/approvazione-del-disciplinare-di-produzione-integrata-per-lanno-2015>
- Aggiornamento Disciplinare Produzione Integrata della Regione Friuli Venezia Giulia in vigore dal 22 aprile 2015. Le variazioni riguardanti il melo sono le seguenti:
 - inserimento della miscela contenente **tebuconazolo + fluopyram** per il controllo di ticchiolatura e oidio (rispettare le limitazioni dei SDHI e degli IBE; al massimo 2 interventi all'anno)

è possibile consultare le schede aggiornate al seguente link <http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2015-aggiornamento-22-aprile>

• **Novità DPI FVG 2015 - MELO:**

- Nelle norme generali delle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti" è specificato che in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari (CLP) viene sospeso per due anni (2015 e 2016) il vincolo che prevede che quando della s.a. esistono diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.
- Un'importante novità presente nel Disciplinare di produzione integrata del Friuli Venezia Giulia per l'annata agraria 2014-2015 per il melo riguarda gli interventi massimi previsti per **ditianon e captano**. Le note e limitazioni d'uso di queste due sostanze attive prevedono infatti che "tra ditianon e captano indipendentemente dall'avversità possano essere eseguiti al massimo:
 - 12 interventi per Gala, Red Delicious, Modì, Renetta, Pinova, Kanzi, ecc
 - 14 interventi per Golden Delicious, Fuji, Granny Smith, Morgenduft, Cripps Pink, Braeburn

- Ulteriori novità riguardano l'inserimento di nuove sostanze attive: **penthiopyrad** per il controllo della ticchiolatura, oidio e alternaria, **metamitron** per il diradamento dei frutti, (**glifosate + diflufenican**) per il diserbo degli impianti in allevamento e **bifenazate** per il ragnetto rosso.

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

- Captano:
Con Decreto Dirigenziale del 8 ottobre 2014, pubblicato in G.U: Serie Generale n.258 del 6-11-2014, si è completato il processo di ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di captano, sulla base del dossier Captan 80 WG di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. Prestare attenzione all'intervallo di sicurezza oltre alle altre novità inserite nelle nuove etichette (dose max hl/ha, intervallo tra i trattamenti, numero max trattamenti/anno).

SITUAZIONE METEOROLOGICA (Previsioni Osmer - Arpa del 25 giugno 2015)

Venerdì 26 giugno

Su pianura e costa cielo da sereno a poco nuvoloso. Sui monti poco nuvoloso al mattino con maggior variabilità nel pomeriggio. Brezza sulla costa.

Sabato 27 giugno

Nuvolosità variabile, con maggiori annuvolamenti in montagna dove saranno probabili locali rovesci o temporali, possibili nel pomeriggio anche in pianura. Venti a regime di brezza.

Domenica 28 giugno

Al mattino cielo sereno. Dal pomeriggio possibile formazione di nuvolosità locale in montagna. In pianura farà più caldo. Brezza sulla costa.

Lunedì 29 giugno

Cielo da poco nuvoloso a variabile in prevalenza per il passaggio di nubi a quote medio-alte. Venti a regime di brezza.

Maggiori informazioni sul sito www.osmer.fvg.it

MELO

AREE DI MONITORAGGIO

Il monitoraggio viene eseguito in un numero di aziende rappresentative dell'areale di coltivazione del melo nella regione Friuli Venezia Giulia. Sono state individuate quattro macro aree, con caratteristiche pedoclimatiche simili, per le quali settimanalmente verranno forniti i dati relativi a fenologia, voli dei lepidotteri, presenza di altri insetti, sviluppo di patologie e momento ottimale di raccolta:

- Area A: Montagna
(Tolmezzo, Enemonzo, Verzegnis, Cavazzo)
- Area B: Alta pianura
(Montereale Valcellina, Sequals, Spilimbergo, Maniago, Buia)
- Area C: Media pianura
(Valvasone, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, Rive d'Arcano, Tapogliano, Sedegliano, Cordenons, San Vito al Tagliamento, Zoppola)

- Area D: Bassa pianura
(Castions delle Mura, Varmo, Latisana, Fiumicello)

FENOLOGIA (Fleckinger)

Le varietà monitorate sono le seguenti: Gala, Golden Delicious, Red Delicious, Granny Smith, Fuji.



(J)- Ingrossamento dei frutti. I frutti continuano ad ingrossarsi.
Tutte le varietà hanno superato la fase di frutto noce (frutto king diametro > 30 mm)

SITUAZIONE FITOSANITARIA E AGRONOMICA

Patogeni: ticchiolatura, cancri rameali

Parassiti: carpofagi, cocciniglia S. Josè, ricamatori e microlepidotteri, eriofide, cicaline

Batteriosi: colpo di fuoco batterico

STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni:

Ticchiolatura

In questa fase è opportuno valutare attentamente lo stato fitosanitario del frutteto (presenza di macchie di ticchiolatura sulle foglie di 100 germogli) al fine di impostare la più opportuna difesa estiva. In base all'esito del rilievo, le strategie di difesa proposte sono le seguenti:

- presenza di macchie su foglia superiore al 2 % (2 germogli con macchie sulle foglie su 100 germogli campionati) su varietà sensibili alla ticchiolatura tardiva (Gala fino a metà giugno, Golden Delicious, Morgenduft, Granny smith, Braeburn e Fuji) oppure superiore al 5 % su varietà non sensibili alla ticchiolatura tardiva (Red Delicious): ripristinare la copertura prima di eventuali periodi piovosi od in funzione dei dilavamenti e comunque indicativamente ogni 10-12 giorni;
- presenza di macchie su foglia inferiori al 2 % su varietà sensibili alla ticchiolatura tardiva od inferiori al 5 % su varietà non sensibili alla ticchiolatura tardiva: ripristinare la copertura prima di eventuali periodi piovosi od in funzione dei dilavamenti e comunque indicativamente ogni 12-14 giorni.

In questa fase i prodotti utilizzabili sono: **Fluazinam** (intervallo di sicurezza 60 giorni), **Dodina**, **Captano** e **Strobilurine**. Si ricorda che i trattamenti con Fluazinam hanno azione collaterale nei confronti dell'alternaria mentre la miscela Pyraclostrobin + Boscalid ha un'azione diretta contro questo patogeno. Le strobilurine sono attive nei confronti dell'oidio.

Cancri rameali

Si consiglia di tagliare i getti sintomatici e di bruciarli.

Erwinia amylovora

Si consiglia di monitorare i meleti nelle prossime settimane e di segnalare la presenza di germogli sintomatici ai tecnici del Servizio Fitosanitario (Pozzuolo del Friuli: 0432 529240; Pordenone 0432 506720; Gorizia 0481 386244).

Parassiti:

Eulia

Prosegue il secondo volo. In questa fase non sono necessari trattamenti specifici.

Tortrice verde e cacecia

Sono state rilevate poche catture in alcuni impianti monitorati. Non sono necessari trattamenti per il loro controllo. Qualora il volo risulti sopra soglia (15 adulti di Pandemis per trappola in 2 settimane oppure 30 adulti in totale delle due specie, oppure 5% di germogli infestati) intervenire con prodotti ad azione larvicida.

Capua

Non sono state rilevate catture in questa settimana.

Cemiostoma e litocollete

Sono state rilevate catture non significative negli impianti monitorati. Non sono necessari trattamenti per il loro controllo.

Cydia molesta

Sono state rilevate catture in lieve calo che si riferiscono al volo della seconda generazione. Non sono necessari trattamenti per il suo controllo.

Carpocapsa

Da studi sperimentali riportati in bibliografia, l'evoluzione del ciclo della carpocapsa può essere definito in funzione delle sommatorie termiche (ΣT medie giornaliere > 10 °C dal 1 gennaio) come da tabella di seguito riportata.

Gradi giorno (g.g.)	Stadio fenologico
140	Inizio primo volo
230	Inizio deposizione uova
330	Prime penetrazioni nei frutticini
880	Inizio secondo volo
1.000	Prime larve 2 ^a generazione

Nel corso di questa settimana non sono state registrate catture sopra soglia nelle aree monitorate. I valori delle sommatorie termiche sono prossime ai 650 g.g.

La sommatoria termica dei gradi giorno è consultabile quotidianamente nella sezione meteo del sito dell'ERSA al seguente link <http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

La strategia di difesa può essere la seguente:

- In presenza di nuovi fori di penetrazione (0,3 % di frutti con fori, controllando 1000 frutti/ha o almeno 500 frutti/appezzamento), in questa fase possono essere utilizzate sostanze attive ad azione larvicida (**virus della granulosi, clorpirifos etile**).

La sommatoria termica dei gradi giorno è consultabile quotidianamente nella sezione meteo del sito dell'ERSA al seguente link <http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

È possibile consultare il volo dei lepidotteri dannosi del melo al seguente link:

<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/modelli-previsionali-e-monitoraggio/melo/grafici-dei-voli-dei-lepidotteri-dannosi-del-melo/>

Cocciniglia di San Josè (*Comstockaspis perniciosa*)

Si ricorda di eseguire un accurato monitoraggio del frutteto per verificare la presenza della migrazione delle neanidi al fine di eseguire un intervento mirato con **fosfororganici** o **Spirotetramat**.

Eriofide (*Aculus schlechtendali*)

Si ricorda di eseguire un accurato monitoraggio del frutteto per verificare la presenza di sintomi ascrivibili a questo parassita. Negli impianti in allevamento o sulle varietà sensibili, se nell'annata precedente si sono verificati attacchi, oppure nel caso di presenza intervenire con **Abamectina**.

La sostanza attiva è fotolabile, pertanto si consiglia la miscela con un bagnante che favorisca un rapido assorbimento ed il posizionamento del trattamento la sera o la mattina presto. Verificare in etichetta che il formulato commerciale sia registrato per il parassita e che sia ammesso per questo momento di intervento.

Cicaline

Nel corso di questa settimana nei meleti si è osservato un aumento della presenza di forme giovanili ed adulti di *Empoasca vitis* e primi danni su foglia. Valutare accuratamente l'entità della presenza dell'insetto nel frutteto per programmare, considerando anche l'evoluzione delle popolazioni nelle passate stagioni, un trattamento con **Buprofezin**.

Trattare su foglia asciutta nelle prime ore della mattina o la sera tardi quando l'insetto è meno mobile. Questo intervento è efficace anche per il controllo della Cocciniglia di S. Josè.

INTERVENTI AGRONOMICI

Irrigazione

Il fabbisogno idrico giornaliero della coltura melo con interfila inerbita per il mese di giugno è di 4,0 mm/giorno.

Gestione della chioma e regolazione del carico produttivo

Qualora necessario, procedere con il diradamento manuale dei frutti sia per favorire l'accrescimento dei frutticini restanti che per stimolare la differenziazione delle gemme a fiore per il prossimo anno (quest'ultima se eseguita entro 50-60 giorni dalla piena fioritura). Iniziare

il diradamento manuale dalle varietà Fuji e Red Delicious spur per proseguire con Gala, Red Delicious standard e le restanti.

Approfittare di questo intervento per rilevare l'eventuale presenza di foglie e frutti con macchie di ticchiolatura e di frutti con fori di penetrazione.

Prevenzione butteratura amara

Al fine di prevenire l'insorgenza di butteratura amara si consiglia di proseguire con interventi fogliari specifici a base di calcio.

Eventi grandinigeni

In caso di grandinate intervenire entro 24-36 ore con prodotti a base di captano (no su Red Delicious e Braeburn) oppure sali di rame (no sulle varietà soggette a rugginosità) al fine di accelerare il processo di cicatrizzazione delle ferite.

ALTRE INFORMAZIONI

Installazione trappole a feromoni

- L'ottimale posizionamento dei trattamenti insetticidi avviene grazie anche al costante monitoraggio dei voli degli insetti nei frutteti. Per questa ragione è necessario installare le trappole a feromoni prima dell'inizio dei voli.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI. PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.

DRUPACEE

AREE DI MONITORAGGIO

Il monitoraggio viene eseguito in alcune aziende della bassa pianura a Fiumicello, Tapogliano, Bicinicco, Precenicco, Muzzana e Pocenia, dove si concentra prevalentemente la coltivazione di drupacee. Di seguito sono fornite alcune informazioni tecniche relative al monitoraggio effettuato su pesco, albicocco, ciliegio e susino.

INFORMAZIONI GENERALI

- Con **Decreto del Direttore del Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 235 SCS/CF/GF del 4 giugno 2015**, pubblicato sul sito dell' ERSA al seguente link, <http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/avviso-homepage/disciplinare-di-produzione-integrata-2013-concessione-di-deroga-per-12019impiego-di-formulati-commerciali-oggetto-di-autorizzazione-eccezionale>, è stata concessa deroga per l'impiego di formulati commerciali oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009 per far fronte ad alcune specifiche criticità fitosanitarie (*Drosophila suzukii* e *Rhagoletis cerasis*) in atto nella Regione Friuli Venezia Giulia.
- Aggiornamento Disciplinare Produzione Integrata della Regione Friuli Venezia Giulia in vigore dal 22 aprile 2015. Le variazioni riguardanti le drupacee sono le seguenti:
 - inserimento della miscela contenente **tebuconazolo + fluopyram** per il controllo di monilia (ciliegio, pesco, albicocco) e oidio (pesco, albicocco). Rispettare le limitazioni dei SDHI e degli IBE; al massimo 2 interventi all'anno.
 - Inserimento del **pyriproxifen** (ammesso anche in post fioritura) su pesco
 - Inserimento dell' **acetamiprid** per il controllo di *Drosophila suzukii* su ciliegio

è possibile consultare le schede aggiornate al seguente link <http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2015-aggiornamento-22-aprile>

- Prestare attenzione alle indicazioni contenute nelle nuove etichette (dosi, intervalli di sicurezza, ecc..) che nel corso dei mesi potrebbero essere introdotte e alle limitazioni d'uso delle sostanze attive previste dal Disciplinare di produzione integrata FVG 2015.

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

- prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **spinosad** sulla coltura del ciliegio per il controllo dell'avversità *Rhagoletis cerasi*. E' stato emanato il decreto dirigenziale del 9 marzo 2015 relativo all'estensione d'impiego richiesto per i prodotti fitosanitari SPINTOR FLY e TRACER FLY per un periodo limitato a 120 giorni con validità dal 15 maggio all'11 settembre 2015.
- prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva **dimetoato** sulla coltura del ciliegio per il controllo dell'avversità *Drosophila suzukii*. E' stato emanato il decreto relativo all'estensione d'impiego richiesto per il prodotto fitosanitario DANADIM 400 per un periodo limitato a 120 giorni con validità dal 27 febbraio al 27 giugno 2015.
- è stato autorizzato l'uso di emergenza di Delegate 2015 (prodotto contenente la sostanza attiva **spinetoram**) dal 5 maggio al 1 settembre 2015 per pesco e ciliegio per il controllo di *Drosophila suzukii*.

PESCO

FENOLOGIA (Baggiolini)

Prosegue la raccolta con le varietà a maturazione intermedia.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni: monilia

Parassiti: *Cydia molesta*, *Anarsia lineatella*

STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni:

Monilia

Le condizioni meteo degli ultimi giorni sono predisponenti alla malattia. In previsione di ulteriori eventi piovosi la strategia prevede un primo trattamento in fase di invaiatura con (**tryfloxystrobin+tebuconazolo**) e un secondo a 5-6 giorni dalla data di presunta raccolta con (**pyraclostrobin + boscalid**), nel rispetto dell'intervallo di sicurezza e delle limitazioni previste dal disciplinare.

Parassiti:

Cydia molesta e *Anarsia lineatella*

Prosegue il volo della seconda generazione di *Cydia molesta* con catture sopra soglia. Prosegue il volo di *Anarsia lineatella* con catture modeste.

Per le aziende che non hanno ancora eseguito un trattamento larvicida, al superamento delle soglie (*Cydia molesta*: 10 adulti/trappola/settimana; *Anarsia lineatella*: 7 adulti/trappola/settimana oppure 10 in 2 settimane), intervenire con sostanze attive **thiacloprid**, **etofenprox**, **emamectina benzoato**, **clorantraniliprole** per il controllo di entrambi i lepidotteri.

ALBICOCCO (Baggiolini)

FENOLOGIA

Prosegue la raccolta delle varietà a maturazione medio-tardive.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni: monilia

Parassiti: *Anarsia lineatella*

STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni:

Monilia

Le condizioni meteo degli ultimi giorni sono predisponenti alla malattia. In previsione di ulteriori eventi piovosi la strategia prevede interventi a base di **IBE**, **Bacillus subtilis**, **cyprodinil**, **cyprodinil+fludioxonil**, **fenhexamid**, **pyraclostrobin+boscalid**, nel rispetto dell'intervallo di sicurezza e delle limitazioni previste dal disciplinare di produzione.

Parassiti:

Anarsia lineatella

Questa settimana il volo di *Anarsia lineatella* è proseguito con catture modeste.

Per le aziende che non sono ancora intervenute posizionare un trattamento con sostanze attive ad azione larvicida (**thiacloprid**, **etofenprox**, **emamectina benzoato**, **clorantraniliprole**, **spinosad**, **bacillus thuringiensis**).

SUSINO

FENOLOGIA (Baggiolini)

Varietà europee accrescimento frutti (J), inizio raccolta delle varietà precoci cinogiapponesi.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni: monilia

Parassiti: *Cydia funebrana*

STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni:

Monilia

Con l'approssimarsi della raccolta, viste le condizioni meteorologiche predisponenti, in previsione di ulteriori eventi piovosi, la strategia di difesa prevede interventi a base di **IBE**, **Bacillus subtilis**, **cyprodinil+fludioxonil**, **fenhexamid**, **pyraclostrobin+boscalid**, **trifloxystrobin+tebuconazolo** nel rispetto dell'intervallo di sicurezza e delle limitazioni previste dal disciplinare di produzione.

Parassiti:

Cydia funebrana

Prosegue il volo di seconda generazione con catture modeste. In questa fase non si consigliano trattamenti specifici.

CILIEGIO

FENOLOGIA (Baggiolini)

Si sta ultimando la raccolta delle varietà più tardive.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni: monilia

Parassiti: *Rhagoletis cerasi*, *Drosophila suzukii*.

Segnalare al Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA (0432 529240) la presenza di ciliegie con sintomi riconducibili a danni causati da *Drosophila suzukii*.

STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni:

Monilia

La strategia prevede un primo trattamento ad invaiatura con in alternativa **IBE**, o **Pyraclostrobin + Boscalid** oppure **cyprodinil+fludioxonil**, **bacillus subtilis** (ammesso anche in agricoltura biologica), **fenhexamid** e un secondo a 7-10 giorni dalla data di presunta raccolta, nel rispetto dell'intervallo di sicurezza e dalle limitazioni previste dal disciplinare.

Le condizioni meteorologiche di quest'ultimo periodo sono predisponenti allo sviluppo di infezioni causate da questo patogeno e quindi potrebbe non essere sufficiente un unico intervento in invaiatura.

Parassiti:

Drosophila suzukii

Proseguono i voli. Con decreto n. 235 SCS/CF/GF del 4 giugno è stato ammesso l'utilizzo in deroga dei seguenti prodotti: **Delegate 2015** (10 giorni intervallo di sicurezza), **Danadim 400** (14 giorni intervallo di sicurezza), **Decis evo** (7 giorni intervallo di sicurezza), **Bitam 15 ec** (7 giorni intervallo di sicurezza). La strategia di difesa va scelta in funzione dei tempi di raccolta delle

diverse e degli intervalli di sicurezza. Si ricorda che il trattamento con **Danadim 400**, posizionato ad invaiatura, ha una buona efficacia per il controllo di *Rhagoletis cerasi*.

Rhagoletis cerasi

E in corso il volo di questo dittero con catture non elevate. Nel caso di catture si consiglia di intervenire sulle varietà che sono nella fase di invaiatura con **acetamiprid**, **thiametoxam**, **etofenprox**. Con decreto n. 235 SCS/CF/GF del 4 giugno è stato ammesso l'utilizzo in deroga dei seguenti prodotti: **Spintor fly** (7 giorni intervallo di sicurezza) e **Tracer fly** (7 giorni intervallo di sicurezza). La strategia di difesa va scelta in funzione dei tempi di raccolta delle diverse e degli intervalli di sicurezza. Si ricorda che il trattamento con **Spintor fly** e **Tracer fly** hanno una buona efficacia per il controllo di *Drosophila suzukii*.

È possibile consultare il volo dei fitofagi dannosi delle drupacee al seguente link:

<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/modelliprevisionali-e-monitoraggio/drupacee/>

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI. PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.

ALTRE INFORMAZIONI

Installazione trappole a feromoni

- L'ottimale posizionamento dei trattamenti insetticidi avviene grazie anche al costante monitoraggio dei voli degli insetti nei frutteti. Per questa ragione è necessario installare le trappole a feromoni prima dell'inizio dei voli.