

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO SERVIZIO RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

AVVERTIMENTO DIFESA OLIVO n° 7 del 7 giugno 2013

INFORMAZIONI GENERALI

Il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Friuli Venezia Giulia da applicarsi nell'annata agraria 2012-2013 ha ottenuto i pareri di conformità dei gruppi tecnici "Difesa" e "Tecnica agronomica" operanti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nel corso delle prossime settimane il Disciplinare sarà anche approvato con delibera della Giunta Regionale e successivamente pubblicato sul sito dell' ERSA.

SITUAZIONE CLIMATICA

Le previsioni meteorologiche sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>


SITUAZIONE FENOLOGICA



Pozzuolo
Ascolana



Pozzuolo
Bianchera



Pozzuolo
Leccino



Muggia - D.S. Bartolomeo
Leccino



Muggia - D.S. Bartolomeo
Bianchera



Muggia - D.S. Bartolomeo
Bianchera

Lo sviluppo fenologico rilevato manifesta una notevole variabilità nei comprensori regionali in relazione alle specifiche condizioni microclimatiche delle diverse zone e della composizione varietale degli impianti. I rilievi settimanali hanno evidenziato il raggiungimento delle fasi prevalenti di mignolatura piena, inizio-fioritura, fioritura piena e/o fine fioritura (su Bianchera solo nelle zone costiere) secondo uno stato di avanzamento delle sub-fasi, comprese tra gli intervalli 57 - 67 della scala BBCH.

In particolare sono state rilevate:

- nelle zone interne le sub-fasi di mignolatura piena e/o di inizio-fioritura;
- nelle zone costiere la fase di mignolatura piena e di inizio-fioritura (su Leccino) nonché negli impianti meglio esposti in prossimità del mare le sub-fasi di fioritura piena e fine-fioritura (su Bianchera).

INSETTI

Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

L'attività di volo della tignola è ormai in consistente riduzione in tutti i comprensori, come evidenziato dalle catture settimanali di entità bassa e/o trascurabile che confermano l'esaurimento della generazione antofaga (vedi tabella 1).

GESTIONE AGRONOMICA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica durante la fase di fioritura ed allegagione.

Concimazione fogliare – Nel periodo di post-fioritura è possibile effettuare un eventuale trattamento fogliare con prodotti a base di boro, microelemento importante per favorire l'allegagione.

Si consiglia di non miscelare il prodotto con altri antiparassitari ed attenersi sempre alle indicazioni riportate in etichetta.

N.B. IN FIORITURA È VIETATO EFFETTUARE TRATTAMENTI FITOSANITARI

TABELLA 1 - Catture Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Prov.	Comune	Località	20° sett.		22° sett.		24° sett.		26° sett.		28° sett.	
			13-19 mag	20-26 mag	27mag-2giu	03 - 09 giu	10 -16 giu	17 - 23 giu	24 - 30giu	01 - 07 lug	08 -14 lug	
PN	Caneva	Caneva	1	1	0	0						
PN	Caneva	Fiaschetti	152	85	12	9						
PN	Aviano	Aviano	0	0	1	/						
UD	Rive d'Arcano	Rivotta	8	6	6	/						
UD	Tarcento	Coja	40	10	3	/						
UD	Moimacco	Bottenicco	620	293	176	18						
GO	San Floriano	San Floriano	> 200	65	27	2						
GO	Sagrado	Sagrado	> 200	70	22	9						
TS	Duino Aurisina	Medeazza	1	1	40	12						
TS	Duino Aurisina	S.Croce	1	1	26	10						
TS	Trieste	Costalunga	0	1	57	15						
TS	San Dorligo	Moccò	30	280	580	35						
TS	San Dorligo	Bagnoli	0	> 200	> 200	39						
TS	San Dorligo	Domio	0	73	147	27						
TS	San Dorligo	Caresana	1	27	84	16						
TS	Muggia	S.Barbara	1	47	70	34						
TS	Muggia	Darsella	18	24	57	20						
TS	Muggia	Chiampore	10	70	126	33						

Per informazioni contattare i tecnici di zona:

- Gorizia, Pordenone, Udine cell. 3346564270 – 0432 529206

- Trieste cell. 3357543021

Gli Avvertimenti di difesa dell'olivo sono consultabili sul sito dell'ERSA <http://www.ersa.fvg.it>