

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO
SERVIZIO SPERIMENTAZIONE**

AVVERTIMENTO DIFESA OLIVO n°2 del 4 maggio 2012





INFORMAZIONI GENERALI

Con la delibera 539 del 29 marzo 2012 della Giunta Regionale è stato approvato il Disciplinare di produzione integrata delle colture della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il testo della delibera è consultabile sul sito www.regione.fvg.it/asp/DelibereInternet/asp/internet/layout1.asp oppure sul sito dell'ERSA – Agenzia regionale per lo sviluppo rurale <http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/disciplinariproduzione-Integrata-fvg/disciplinari-di-produzione-integrata-anno-2012/>

SITUAZIONE CLIMATICA

La situazione meteo-climatica del mese di aprile è stata caratterizzata da temperature medie inferiori alle medie di lungo periodo e da precipitazioni superiori ai valori normali che hanno contribuito ad aumentare le risorse idriche del suolo.

Le previsioni meteorologiche sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>



SITUAZIONE FENOLOGICA



Le fasi fenologiche prevalenti rilevate nei comprensori olivicoli si differenziano significativamente secondo le seguenti sub-fasi, in relazione alle condizioni climatiche e alle caratteristiche varietali degli impianti:

- Areali interni: ripresa vegetativa apicale e laterale (sviluppo di nuovi germogli) e inizio mignolatura (formazione degli abbozzi fiorali);
- Areali litoranei costieri: inizio mignolatura e mignolatura (sviluppo delle mignole e allungamento-distensione dei grappoli fiorali) in particolare nelle varietà precoci (es. Bianchera).

DIFESA CRITTOGAME

Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*)

In caso di infezioni fungine accertate si consiglia un intervento con Sali di rame o con dodina soprattutto nelle zone notoriamente favorevoli al patogeno e sulle varietà suscettibili alla malattia (es. Bianchera).

AVVERSITA' NON PARASSITARIE

Danni da gelo

Nelle zone dove dopo la ripresa vegetativa si siano accertati danni da gelo sui rami e rametti, relativi al periodo invernale (terza decade di gennaio – prima quindicina di febbraio), si consiglia di effettuare con urgenza trattamenti con prodotti a base di sali rame.

GESTIONE AGRONOMICA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica durante la fase di fioritura ed allegagione.

Per informazioni contattare i tecnici di zona:

- Gorizia, Pordenone, Udine cell. 3346564270 – 0432 529206
- Trieste cell. 3357543021

Gli Avvertimenti di difesa dell'olivo sono consultabili sul sito dell'ERSA <http://www.ersa.fvq.it>