

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO
SERVIZIO SPERIMENTAZIONE**





AVVERTIMENTO DIFESA OLIVO n°3 del 11 maggio 2012

INFORMAZIONI GENERALI

Con la delibera 539 del 29 marzo 2012 della Giunta Regionale è stato approvato il Disciplinare di produzione integrata delle colture della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il testo della delibera è consultabile sul sito www.regione.fvg.it/asp/DelibereInternet/asp/internet/layout1.asp oppure sul sito dell'ERSA – Agenzia regionale per lo sviluppo rurale <http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/disciplinariproduzione-Integrata-fvg/disciplinari-di-produzione-integrata-anno-2012/>

SITUAZIONE CLIMATICA

La prima decade di maggio è stata caratterizzata da un significativo incremento delle temperature medie, con il raggiungimento di valori superiori alle medie di lungo periodo, e da precipitazioni, leggermente inferiori ai valori normali, che contribuiscono a mantenere una buona dotazione idrica del terreno. Le previsioni meteorologiche sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>



SITUAZIONE FENOLOGICA



Gli incrementi di temperatura rilevati in tutti i comprensori hanno favorito lo sviluppo vegetativo delle piante e l'avanzamento dello stato fenologico che si manifesta con sub-fasi maggiormente anticipate soprattutto nella varietà Bianchera rispetto ad altre varietà.

Negli areali interni le fasi fenologiche rilevate prevalentemente sono l'inizio mignolatura e mignolatura con crescita delle infiorescenze e allungamento dei grappolini fiorali.

Negli areali litoranei e costieri la fase fenologica prevalente è la mignolatura con allungamento-distensione dei grappoli fiorali.

DIFESA CRITTOGAME

Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*)

In caso di infezioni fungine accertate si consiglia un intervento con Sali di rame o con dodina soprattutto nelle zone notoriamente favorevoli al patogeno e sulle varietà suscettibili alla malattia (es. Bianchera).

AVVERSITA' NON PARASSITARIE

Danni da gelo

Nelle zone dove dopo la ripresa vegetativa si siano accertati danni da gelo sui rami e rametti (ferite, lesioni corticali, ecc.), relativi al periodo invernale (terza decade di gennaio – prima quindicina di febbraio), si consiglia di effettuare con urgenza trattamenti con prodotti a base di sali rame.

GESTIONE AGRONOMICA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica durante la fase di fioritura ed allegagione.

Per informazioni contattare i tecnici di zona:

- Gorizia, Pordenone, Udine cell. 3346564270 – 0432 529206

- Trieste cell. 3357543021

Gli Avvertimenti di difesa dell'olivo sono consultabili sul sito dell'ERSA <http://www.ersa.fvg.it>