

## AVVERTIMENTO VITICOLO N° 9 DEL 05 GIUGNO 2013

### ANDAMENTO METEOROLOGICO

Per i prossimi giorni è prevista ancora una certa variabilità, anche se rimangono basse le possibilità di precipitazioni diffuse. Con sabato un anticiclone garantirà bel tempo e rialzo termico. Per la giornata di lunedì 10 giugno è previsto l'arrivo di un nuovo flusso instabile.

### FENOLOGIA

Dai rilievi di lunedì 3 giugno, le varietà precoci presentano mediamente il 20-30% dei fiori aperti (BBCH 62-63), mentre le altre evidenziano lo stadio di inizio fioritura (BBCH 60) o, specialmente nei vigneti dell'alta pianura, ancora i bottoni floreali in fase di separazione (BBCH 57).

### DIFESA

Le piogge della scorsa settimana, unitamente al successivo rialzo termico, stanno favorendo una recrudescenza degli attacchi di peronospora sia su foglia, con evidente sporificazione sulla pagina inferiore (foto 1) che su grappolo (foto 2 e 3).

Sulla base dello sviluppo fenologico della vite e dell'andamento climatico si consiglia di intervenire

### *Venerdì 07 – Sabato 08 giugno*

con prodotti a base di CAA (*Dimetomorf* \* o *Iprovalicarb*\* o *Mandipropamide*\*) + p.a. di copertura (preferibili i ditocarbammati\*\*\*) o *Ametoctradina*\*\* + *Metiram*\*\*\*. Contro l'oidio impiegare prodotti a base di *Cyflufenamide*<sup>o</sup> o di *strobilurine* (*Azoxystrobin*<sup>oo</sup> o *Pyraclostrobin*<sup>oo</sup> o *Trifloxystrobin*<sup>oo</sup>) che presentano efficacia contro Black-rot .

Nei vigneti a conduzione biologica utilizzare prodotti a base di **rame** (idrossido, ossicloruro, ecc.) e **zolfo bagnabile** alle dosi massime di etichetta, avendo cura di rientrare dopo piogge dilavanti.

*Si raccomanda di trattare su vegetazione asciutta; inoltre sono necessarie almeno 2-3 ore per il completo assorbimento dei principi attivi ad azione endoterapica.*

\* *al massimo 4 interventi/anno in alternativa tra loro con CAA.*

\*\* *al massimo 3 interventi/anno.*

\*\*\* *non applicabile oltre la fase fenologica dell'allegagione.*

<sup>o</sup> *al massimo 2 interventi/anno;* <sup>oo</sup> *indipendentemente dall'avversità non più di 3 interventi/anno con strobilurine.*

#### **Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Grave**

Via A. Boito, 37 • Corva - 33082 Azzano Decimo (PN)

Tel. + 39 0434 646538 - Fax + 39 0434 646621

C.F. e P. IVA e R.I. CCIAA PN 00189540933

docgrave@docfriuligrave.com - www.docfriuligrave.com



Foto 1: evidente sporificazione su pagina inferiore (03.06.2013)



Foto 2: attacco di peronospora su grappolo (03.06.2013)




Foto 3: peronospora su grappolo, con evidenti i rami conidiofori (03.06.2013)

## SCAPHOIDEUS TITANUS

Nel prossimo avvertimento verranno date indicazioni riguardo il trattamento obbligatorio contro *Scaphoideus titanus*, insetto vettore del fitoplasma della Flavescenza Dorata.

[Si ricorda che gli avvertimenti viticoli, per quanto riguarda le varie strategie di difesa fitosanitaria, di controllo delle infestanti e le norme tecniche agronomiche, seguiranno gli indirizzi tecnici del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.](#)

### **Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Grave**

Via A. Boito, 37 • Corva - 33082 Azzano Decimo (PN)  
Tel. + 39 0434 646538 - Fax + 39 0434 646621  
C.F. e P. IVA e R.I. CCIAA PN 00189540933  
docgrave@docfriuligrave.com – www.docfriuligrave.com