

SERVIZIO DI LOTTA GUIDATA E INTEGRATA IN VITICOLTURA AVVERTIMENTO N° 09 del 24/06/2013

“SPECIALE BOTRITE – *Botrytis cinerea*”

PREVISIONI DEL TEMPO: stanno affluendo in quota correnti nordoccidentali fresche ed ancora instabili. Martedì e mercoledì avremo cielo da variabile a nuvoloso con possibili piogge sparse e qualche rovescio. Giovedì miglioramento.

(Fonte Osmer: www.meteo.fvg.it)

BOTRITE

Situazione: i vitigni a grappolo compatto, stanno raggiungendo la fase di pre-chiusura (B 75-77) in tale periodo è consigliata la lotta antibotritica.

Consigli: si consiglia di eseguire un intervento entro questa settimana utilizzando *una delle seguenti sostanze attive:* **Fludioxonil, (Ciprodinil + Fludioxonil), Fenhexamide, Boscalid, Fluopyram, Pyrimethanil, Fluazinam, Fenpyrazamine.**

Il ***Bacillus amyloliquefaciens plantarum*** e il ***Bacillus subtilis*** sono consentiti anche nella conduzione della difesa biologica.

Vanno impiegati alle dosi ettaro indicate in etichetta **localizzando il trattamento sulla fascia dei grappoli.**

Si consiglia di eseguire un' accurata sfogliatura per consentire al prodotto di penetrare all'interno della chioma e per favorire l'arieggiamento dei grappoli. Fare riferimento sempre alle indicazioni riportate in etichetta.

INFORMAZIONI UTILI

Le sostanze attive e le limitazioni d'uso indicate nel presente avvertimento rispettano quanto previsto dalle prescrizioni

riportate nelle **NORME TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA EMANATE DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA** (delibera n. 981 approvata dalla Giunta Regionale il 7 giugno 2013):

Bacillus amyloliquefaciens plantarum sono consentiti al massimo 6 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.

Bacillus subtilis al massimo 5 interventi all'anno.

Sono consentiti al **massimo 2 interventi all'anno con fungicidi organici di sintesi** contro questa avversità (*consigliato in pre chiusura grappolo e invaiatura*):

Pyrimethanil al max 1 intervento all'anno.

Ciprodinil + Fludioxonil al max 2 interventi all'anno contro questa avversità.

Tra Pyrimethanil e (Ciprodinil + Fludioxonil) al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

Fludioxonil al max 1 intervento all'anno se utilizzato da solo, al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità se utilizzato in associazione al Ciprodinil.

Tra Boscalid e Fluopyram al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.

Fenpyrazamine al max 1 intervento all'anno.