

LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO *Scaphoideus titanus* VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Comunicazione n. 05 del 22/06/2018

Situazione

Dai monitoraggi effettuati sul territorio regionale, i primi individui giovanili sono stati osservati nella prima decade del mese di maggio.

Nei monitoraggi degli ultimi giorni in tutte le località sono stati rilevati individui di 5° stadio.

In alcuni siti sono stati catturati i primi individui adulti.

Nelle tabelle seguenti vengono indicate le percentuali delle diverse età giovanili di *Scaphoideus titanus* osservate nei siti di monitoraggio.

BAGNARIA ARSA (UD)						
data	% di forme mobili per stadio di sviluppo					
	I	II	III	IV	V	Adulti
09/05/2017	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2017	96.30	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2018	63.72	33.63	2.65	0.00	0.00	0.00
05/06/2018	51.35	24.32	20.00	4.32	0.00	0.00
12/06/2018	21.78	23.76	19.80	27.72	6.93	0.00
20/06/2018	5.38	16.13	17.20	25.81	32.26	3.23

SEDEGLIANO – SAN LORENZO (UD)						
data	% di forme mobili per stadio di sviluppo					
	I	II	III	IV	V	Adulti
09/05/2017	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2017	98.97	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2018	84.83	14.48	0.69	0.00	0.00	0.00
01/06/2018	49.53	34.91	13.21	2.36	0.00	0.00
11/06/2018	9.52	30.95	28.57	29.76	1.19	0.00
19/06/2018	4.76	11.11	28.57	28.57	22.22	4.76

MORUZZO - (UD)						
data	% di forme mobili per stadio di sviluppo					
	I	II	III	IV	V	Adulti
10/05/2017	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2017	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2018	96.18	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2018	77.38	17.14	5.00	0.48	0.00	0.00
11/06/2018	39.12	30.00	20.88	9.71	0.29	0.00
19/06/2018	7.94	28.89	27.94	25.71	9.52	0.00

OSLAVIA (GO)						
data	% di forme mobili per stadio di sviluppo					
	I	II	III	IV	V	Adulti
17/05/2017	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2018	77.78	16.67	5.56	0.00	0.00	0.00
04/06/2018	78.38	14.86	5.41	1.35	0.00	0.00
13/06/2018	32.00	22.00	32.00	10.00	4.00	0.00
20/06/2018	28.00	28.00	16.00	8.00	20.00	0.00

DUINO AURISINA - TERNOVA (TS)						
data	% di forme mobili per stadio di sviluppo					
	I	II	III	IV	V	Adulti
17/05/2017	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2018	72.80	24.80	2.40	0.00	0.00	0.00
04/06/2018	44.53	37.50	15.63	2.34	0.00	0.00
12/06/2018	15.15	25.76	28.79	28.79	1.52	0.00
20/06/2018	1.39	16.67	27.78	33.33	20.83	0.00

POVOLETTO - PRIMULACCO (UD)						
data	% di forme mobili per stadio di sviluppo					
	I	II	III	IV	V	Adulti
10/05/2017	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2017	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2018	98.11	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2018	74.03	22.65	3.31	0.00	0.00	0.00
13/06/2018	26.12	45.52	19.40	8.96	0.00	0.00
19/06/2018	9.32	29.66	39.83	19.49	1.69	0.00

Indicazioni per i trattamenti

Dalle osservazioni sulla fenologia dell'insetto, e precisamente sulla percentuale stimata dei diversi stadi giovanili nelle popolazioni, si possono trarre indicazioni utili per il posizionamento degli interventi insetticidi.

Dai rilievi finora effettuati si conferma un anticipo di circa una settimana rispetto all'anno scorso. Per il 2018 è stata predisposta la Circolare – nota tecnica che stabilisce le modalità e la tempistica dei trattamenti insetticidi obbligatori contro *Scaphoideus titanus*. La circolare è stata pubblicata sul sito dell'agenzia al seguente indirizzo:

http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/lotta-obbligatoria-contro-la-flavescenza-dorata-della-vite-e-il-vettore-scaphoideus-titanus-anno-2018/Circ_Viticoltori_2018.pdf/view

Al seguente indirizzo è pubblicata la tabella allegata:

http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/lotta-obbligatoria-contro-la-flavescenza-dorata-della-vite-e-il-vettore-scaphoideus-titanus-anno-2018/TABELLA_VITICOLTORI_FVG_2018.pdf/view

Le disposizioni per la lotta obbligatoria con le indicazioni per impiego dei prodotti ad azione abbattente sono state diramate con il documento pubblicato al seguente indirizzo:

http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/lotta-obbligatoria-contro-la-flavescenza-dorata-della-vite-e-il-vettore-scaphoideus-titanus-anno-2018/Abbattente_ST_2018.pdf

Il periodo indicato per eseguire il trattamento è **dal 14 al 23 giugno**.

Solo negli **areali più tardivi** potrà essere posticipato **dal 19 al 28 giugno**.

Si ricorda di **eseguire sempre lo sfalcio della vegetazione spontanea prima dell'impiego di prodotti insetticidi**, per salvaguardare le api e gli altri pronubi.