

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO n° 5 del 8 giugno 2018

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

FENOLOGIA

Le fasi fenologiche prevalenti rilevate si differenziano nei comprensori in relazione alle condizioni climatiche e all'esposizione degli impianti.

Negli impianti litoranei costieri o meglio esposti della provincia di Trieste è stata rilevata la fase fenologica prevalente di 1° ingrossamento del frutto, mentre nelle zone più fresche della provincia quella di comparsa del frutticino e/o allegagione.

Nei comprensori di GO, UD, PN le piante si trovano nella fase fenologica prevalente di fine-fioritura nella pianura friulana, oppure di imminente fine-fioritura nelle zone collinari interne più fresche e in particolare sulle cv. Gorgazzo e Frantoio.



SITUAZIONE FITOSANITARIA

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Questa settimana il monitoraggio ha evidenziato un significativo incremento delle popolazioni del lepidottero nelle zone più calde e meglio esposte dei comprensori di Trieste e del Collio goriziano e isontino. Nei comprensori di Udine e Pordenone le catture si mantengono di bassa o trascurabile entità.

Non sono state rilevate infestazioni di rilievo.

STRATEGIE DI DIFESA

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Sono sconsigliati trattamenti chimici contro questa generazione. Negli oliveti dove si presenta regolarmente il problema della tignola, è possibile effettuare trattamenti a base di *Bacillus thuringiensis* contro le larve in nutrizione sui fiori se viene superata la soglia economica di intervento stabilita nel 40-45 % delle infiorescenze attaccate. Il momento migliore per l'intervento è nella fase discendente del volo degli adulti, dopo il picco delle catture.



OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleagina*)

Sono state segnalate infezioni del fungo su varietà suscettibili alla malattia (es.: Bianchera, Frantoio) in zone notoriamente favorevoli al patogeno.



Negli impianti con accertate infezioni di occhio di pavone sulla nuova vegetazione, su piante in cui la fase fenologica è di primo accrescimento del frutto si consiglia di effettuare un tempestivo trattamento con prodotti rameici oppure con Dodina.



GESTIONE DELLA COLTURA

EVITARE I TRATTAMENTI DI BORO E DI RAME DURANTE LA FASE DELLA FIORITURA.

Solo negli oliveti in cui la fase fenologica abbia raggiunto lo stadio di fine-fioritura è possibile effettuare il trattamento fogliare di post-fioritura con prodotti a base di boro, per favorire l'allegagione. Si consiglia di non miscelare il prodotto con altri antiparassitari.

Sono state segnalate grandinate locali in provincia di Trieste nelle zone di Bagnoli, San Dorligo e Moccò.

Negli impianti colpiti si consiglia di effettuare un urgente trattamento con prodotti rameici.

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica durante la fase di fioritura ed allegagione.

Si ricorda che in fioritura sono vietati tutti i trattamenti insetticidi ad eccezione del *Bacillus thuringiensis*

Tabella 1 catture tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Provincia	Comune	Località	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
<i>Pedemontana Pordenonese</i>										
PN	Caneva bio	Fiaschetti		2	4					
PN	Caneva	Stevenà		0	0					
<i>Colline del Friuli</i>										
UD	Rodeano	D'Angelo		0	2					
UD	Tricesimo	Adorgnano	-	19	5					
UD	Gemona bio	Facchin	-	0	0					
<i>Alta Pianura Friulana</i>										
UD	Cividale	Ducale		29	4					
UD	Udine	Servadei		0	0					
UD	Cividale	Spessa		3	3					
<i>Bassa Pianura Friulana</i>										
UD	Castions di Strada	Ellis		2	2					
UD	Latisana	Lorenzonetto		0	7					
<i>Collio goriziano e isontino</i>										
GO	San Floriano	Giasbana	12	16	39					
GO	Cormons	Monte Quarin	8	18	25					
GO	Ronchi	Selz	2	5	27					
GO	Sagrado	Sagrado		10	12					
<i>Trieste provincia</i>										
TS	Duino Aurisina	Sgonico	8	1	0					
TS	Duino Aurisina	S. Croce	66	70	7					
TS	Trieste	Campanelle	15	18	25					
TS	San Dorligo	Moccò	22	51	54					
TS	San Dorligo	Bagnoli	1	47	83					
TS	San Dorligo	Domio	21	74	99					
TS	San Dorligo	Caresana	8	36	45					
TS	Muggia	S.Barbara	3	9	7					
TS	Muggia	Darsella	2	41	41					
TS	Muggia	Pisciolon	11	2	14					
TS	Duino Aurisina	Medeazza		1	19					
TS	San Dorligo	San Giuseppe		1	68					
TS	San Dorligo	Dolga Krona		5	40					

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021