

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO n° 7 del 22 giugno 2018

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

FENOLOGIA

Lo sviluppo fenologico delle piante rilevato questa settimana è quello 1° ingrossamento del frutto secondo stadi di accrescimento delle drupe diversificati nei comprensori in relazione variabilità microclimatica delle zone e all'esposizione degli impianti.




SITUAZIONE FITOSANITARIA

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Il monitoraggio della tignola ha evidenziato una tendenziale significativa riduzione delle catture in tutti i comprensori (v. tabella 1), segno che il "picco delle catture" è stato mediamente raggiunto la scorsa settimana. In alcuni campioni di olivine esaminati non sono state riscontrate ovideposizioni e larvette in fase di penetrazione.

Gli adulti di queste popolazioni origineranno la generazione carpofaga che, al superamento della soglia d'intervento del 10-15% di uova e/o larvette in fase di penetrazione delle olivine potrà causare la cascola dei frutticini in luglio e successivamente in settembre-ottobre.

2018 Catture settimanali medie di Tignola dell'olivo per comprensorio



STRATEGIE DI DIFESA

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Si consiglia di contattare i tecnici di zona per verificare il superamento o meno della soglia d'intervento e per valutare il posizionamento più idoneo del trattamento affinché risulti efficace in relazione alle strategie di difesa adottate.

Strategia di difesa integrata – Nelle zone in cui è stata superata la soglia d'intervento del 10-15% di uova e/o larvette in fase di penetrazione delle olivine, dopo il "picco delle catture" e nella fase discendente della curva di volo (orientativamente entro 7-10 giorni), è possibile effettuare un trattamento larvicida con formulati sistemici o citotropici (es. Fosmet).

Non si possono miscelare altri prodotti fitosanitari con questo trattamento.

Strategia di difesa in agricoltura biologica – Nelle zone in cui sono state rilevate elevate catture e/o sono iniziate le prime ovideposizioni, nonché in zone notoriamente infestate dalla Tignola, si consigliano due trattamenti con *Bacillus thuringiensis* da effettuare, il primo entro questa fine settimana e il secondo verso la fine della prossima settimana. In agricoltura biologica è possibile utilizzare anche il formulato Azadiractina ad azione parzialmente larvicida.

Non si possono miscelare altri prodotti fitosanitari con il trattamento di *Bacillus thuringiensis*.

OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleagina*)

Sono state segnalate infezioni del fungo su varietà suscettibili alla malattia (es.: Bianchera, Frantoio) in zone notoriamente favorevoli al patogeno.

Negli impianti con accertate infezioni di occhio di pavone sulla nuova vegetazione si consiglia di effettuare un tempestivo trattamento con prodotti rameici (es.: ossicloruro o idrossido di rame) oppure con Dodina.

GESTIONE DELLA COLTURA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma.

Tabella 1 catture tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Provincia	Comune	Località	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
<i>Pedemontana Pordenonese</i>										
PN	Caneva bio	Fiaschetti		2	4	3	0			
PN	Caneva	Stevenà		0	0	0	0			
<i>Colline del Friuli</i>										
UD	Rodeano	D'Angelo		0	2	28	5			
UD	Tricesimo	Adorgnano		19	5	27	10			
UD	Gemona bio	Facchin		0	0	3	10			
<i>Alta Pianura Friulana</i>										
UD	Cividale	Ducale		29	4	53	59			
UD	Udine	Servadei		0	0	0	6			
UD	Cividale	Spessa		3	3	11	0			
<i>Bassa Pianura Friulana</i>										
UD	Castions di Strada	Ellis		2	2	84	17			
UD	Latisana	Lorenzonetto		0	7	31	0			
<i>Collio goriziano e isontino</i>										
GO	San Floriano	Giasbana	12	16	39	14	10			
GO	Cormons	Monte Quarin	8	18	25	12	9			
GO	Ronchi	Selz	2	5	27	34	30			
GO	Sagrado	Sagrado		10	12	16	9			
<i>Trieste provincia</i>										
TS	Duino Aurisina	Sgonico	8	1	0	1	1			
TS	Duino Aurisina	S. Croce	66	70	7	17	11			
TS	Trieste	Campanelle	15	18	25	18	17			
TS	San Dorligo	Moccò	22	51	54	173	130			
TS	San Dorligo	Bagnoli	1	47	83	88	60			
TS	San Dorligo	Domio	21	74	99	125	70			
TS	San Dorligo	Caresana	8	36	45	60	50			
TS	Muggia	S.Barbara	3	9	7	36	16			
TS	Muggia	Darsella	2	41	41	36	36			
TS	Muggia	Pisciolon	11	2	14	14	7			
TS	Duino Aurisina	Medeazza		1	19	14	1			
TS	San Dorligo	San Giuseppe		1	68	168	115			
TS	San Dorligo	Dolga Krona		5	40	153	139			

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021