

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO SERVIZIO RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

AVVERTIMENTO DIFESA OLIVO n° 12 del 12 luglio 2013

INFORMAZIONI GENERALI

Il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Friuli Venezia Giulia da applicarsi nell'annata agraria 2012-2013 ha ottenuto i pareri di conformità dei gruppi tecnici "Difesa" e "Tecnica agronomica" operanti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed è stato approvato con Delibera n. 981 dalla Giunta regionale il 7 giugno 2013. Il Disciplinare di Produzione Integrata può essere scaricato dalla home page del sito dell'ERSA.

SITUAZIONE CLIMATICA

Le previsioni meteorologiche sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>

SITUAZIONE FENOLOGICA



Caneva – Pendolino



Aviano – Frantoio



Tarcento

Lo sviluppo fenologico delle piante prosegue ancora con la fase di 1° accrescimento del frutto in tutti i comprensori regionali.

La fase di accrescimento delle drupe si manifesta secondo uno stadio di avanzamento più o meno marcato in relazione alle condizioni climatiche delle zone-località, dell'esposizione degli impianti e alle varietà.



Muggia

INSETTI

Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

L'attività di volo della tignola è risultata in diminuzione, in taluni casi consistente, nei punti di monitoraggio di Gorizia, Udine e Pordenone, mentre ancora prevalentemente in incremento nei monitoraggi della provincia di Trieste salvo eccezioni (vedi tabella 1).

Si consiglia di contattare i tecnici di zona per verificare il superamento o meno della soglia d'intervento.

Strategia di difesa integrata – Per chi non avesse ancora effettuato un trattamento contro la tignola, al superamento della soglia d'intervento, dopo il picco delle catture e nella fase discendente della curva di volo si consiglia di effettuare un trattamento larvicida con formulati sistemici o citotropici (es. Fosmet o Dimetoato) orientativamente entro la metà di luglio.

Strategia di difesa in agricoltura biologica – Nei casi in cui il picco delle catture sia già passato si consigliano trattamenti con *Bacillus thuringensis* o *Azadiractina*, prima possibile.

Nei casi in cui le catture siano ancora in aumento è consigliabile effettuare il trattamento subito dopo il raggiungimento del picco la settimana prossima.

Si consiglia di contattare i tecnici di zona per valutare il posizionamento più idoneo del trattamento in relazione alle località e alle strategie di difesa adottate.

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

Sono state installate nei comprensori le trappole di monitoraggio della mosca delle olive della rete di monitoraggio regionale.

Dai primi rilievi effettuati su parte dei punti di monitoraggio è stata rilevata la presenza nulla della mosca nella maggior parte delle trappole o trascurabile in singole stazioni (vedi tabella 2).

DIFESA CRITTOGAME

Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*)

Nelle località in cui siano accertate infezioni di occhio di pavone sulla nuova vegetazione si consiglia di intervenire con Dodina, eventualmente anche miscelata con il prodotto larvicida per il controllo della tignola nelle località in cui sia stata superata la soglia d'intervento del fitofago.

GESTIONE AGRONOMICA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica con le piante.

TABELLA 1 - Catture Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Prov.	Comune	Località	Servizio tecnico controllo	Settimane								
				20° sett.	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
				13-19 mag	20-26 mag	27mag-2giu	03-09 giu	10-16 giu	17-23 giu	24-30giu	01-07 lug	08-14 lug
PN	Caneva	Caneva	ERSA	1	1	0	0	/	2	21	13	5
PN	Caneva	Fiaschetti	ERSA	152	85	12	9	0	0	122	51	42
PN	Aviano	Aviano	ERSA	0	0	1	/	/	0	60	26	9
UD	Faedis	Campeglio	ERSA								95	6
UD	Rive d'Arcano	Rivotta	ERSA	8	6	6	/	3	1	27	31	10
UD	Tarcento	Coja	ERSA	40	10	3	/	0	0	2	43	35
UD	Moimacco	Bottenicco	ERSA	620	293	176	18	3	0	206	284	175
UD	Osoppo	Osoppo	ERSA								7	5
UD	Ragogna	Villuzza di Ragogna	ERSA								70	20
GO	Mossa	Mossa	ERSA								23	3
GO	Sagrado	Sagrado – Castelv.	ERSA	> 200	70	22	9	9	3	42	102	5
TS	Duino Aurisina	Medeazza	DOPTS	1	1	40	12	8	14	64	32	74
TS	Duino Aurisina	S.Croce	DOPTS	1	1	26	10	17	23	84	54	67
TS	Trieste	Costalunga	DOPTS	0	1	57	15	2	26	90	48	128
TS	San Dorligo	Moccò	DOPTS	30	280	580	35	70	47	120	74	83
TS	San Dorligo	Bagnoli	DOPTS	0	> 200	> 200	39	10	17	153	48	94
TS	San Dorligo	Domio	DOPTS	0	73	147	27	2	40	110	123	105
TS	San Dorligo	Caresana	DOPTS	1	27	84	16	2	57	125	131	74
TS	Muggia	S.Barbara	DOPTS	1	47	70	34	42	31	100	94	80
TS	Muggia	Darsella	DOPTS	18	24	57	20	37	44	92	82	112
TS	Muggia	Chiampore	DOPTS	10	70	126	33	21	25	87	90	134

TABELLA 2 - Catture Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

Prov.	Comune	Località	Servizio tecnico controllo	Settimane							
				27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.	31° sett.	32° sett.		
				1-7 lug	8-14 lug	15-21 lug	22-28 lug	29 lug - 4 ago	5-11 ago		
PN	Caneva	Caneva	ERSA	0							
PN	Caneva	Fiaschetti	ERSA	0							
PN	Aviano	Somprado	ERSA	0							
UD	Ragogna	Villuzza	ERSA								
UD	Rive d'Arcano	Rivotta	ERSA	0							
UD	Gemona	Gemona	ERSA	0							
UD	Osoppo	Osoppo	ERSA								
UD	Tarcento	Coja	ERSA	4							
UD	Moimacco	Bottenicco	ERSA	1							
UD	Cividale	Rubignacco	ERSA	/							
UD	Faedis	Campeglio	ERSA								
UD	Pozzuolo del Friuli	Pozzuolo del Friuli	ERSA	3							

Per informazioni contattare i tecnici di zona:

- Gorizia, Pordenone, Udine cell. 3346564270 – 0432 529206

- Trieste cell. 3357543021

Gli Avvertimenti di difesa dell'olivo sono consultabili sul sito dell'ERSA <http://www.ersa.fvg.it>