

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO  
SERVIZIO RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

**AVVERTIMENTO DIFESA OLIVO n° 2 del 3 maggio 2013**





**INFORMAZIONI GENERALI**

Il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Friuli Venezia Giulia da applicarsi nell'annata agraria 2012-2013 ha ottenuto i pareri di conformità dei gruppi tecnici "Difesa" e "Tecnica agronomica" operanti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nel corso delle prossime settimane il Disciplinare sarà anche approvato con delibera della Giunta Regionale e successivamente pubblicato sul sito dell' ERSA.

**SITUAZIONE CLIMATICA**

Nella 3° decade di aprile le temperature medie si sono mantenute lievemente superiori o comparabili ai valori normali.

Le previsioni meteorologiche sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>



## SITUAZIONE FENOLOGICA



Lo sviluppo fenologico si manifesta negli areali prevalentemente nella fase di mignolatura secondo uno stato di avanzamento di inizio-mignolatura differenziato nelle sub-fasi, a) di emissione delle infiorescenze con comparsa dei palchi dei bocci fiorali e b) di allungamento delle infiorescenze, in relazione alle specifiche condizioni climatiche delle diverse zone e della composizione varietale degli impianti.

## DIFESA CRITTOGAME

### Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*)

Le infezioni fungine maggiormente segnalate sono quelle dell'Occhio di pavone che hanno causato defogliazioni più o meno consistenti nelle zone notoriamente favorevoli al patogeno e sulle varietà suscettibili alla malattia (es. Bianchera).

#### Difesa

Nel caso di infezioni fungine accertate di Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), qualora non già provveduto, si consiglia un intervento urgente con sali di rame o con dodina soprattutto nelle zone notoriamente favorevoli al patogeno e sulle varietà suscettibili alla malattia (es. Bianchera).



Il trattamento con Sali di rame in questo periodo è utile a contenere anche le infezioni di Piombatura (*Pseudocercospora cladosporioides*) segnalata in singoli oliveti.

## GESTIONE AGRONOMICA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica durante la fase di fioritura ed allegagione.

Per informazioni contattare i tecnici di zona:

- Gorizia, Pordenone, Udine cell. 3346564270 – 0432 529206
- Trieste cell. 3357543021

Gli Avvertimenti di difesa dell'olivo sono consultabili sul sito dell'ERSA <http://www.ersa.fvg.it>