ersa REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO - SERVIZIO SPERIMENTAZIONE

AVVERTIMENTO DIFESA OLIVO n°12 del 6 agosto 2010

INFORMAZIONI GENERALI

Le Norme tecniche generali, le Norme tecniche di coltura e le schede relative alla Difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti sono consultabili sul sito dell'ERSA nella sezione "Avvertimenti e segnalazioni fitosanitarie" (http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/disciplinariproduzione-Integrata-fvg).

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche regionali sono consultabili sul sito www.meteo.fvg.it.

SITUAZIONE FENOLOGICA

La fase fenologica negli oliveti si differenzia nei comprensori olivicoli in relazione alle condizioni climatiche dell'areale di coltivazione, alle condizioni microclimatiche degli impianti ed alle varietà come sotto indicato:

- negli areali costieri e litoranei è stato rilevato il completamento della fase di indurimento del nocciolo;
- nei comprensori interni l'indurimento del nocciolo completato è stato rilevato nella zona di Caneva (PN) mentre nelle altre zone olivicole (provincie di Gorizia e Udine) la fase fenologica prevalente risulta ancora di pre-indurimento del nocciolo con lignificazione dei tessuti parziale o in via di indurimento quasi completo in alcune località.

DIFESA INSETTI

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

Con la fase di indurimento del nocciolo completato le olive diventano recettive alle infestazioni del dittero.
L'attività di volo della mosca risulta modesta in tutti i comprensori; nella settimana sono state rilevate catture di bassa o trascurabile entità.
In provincia di Trieste sono state rilevate nelle drupe le prime ovideposizioni e larve di prima età, che hanno determinato un'infestazione attiva molto bassa al di sotto della soglia d'intervento.
Non sono necessari interventi larvicidi contro la mosca delle olive.

Gli olivicoltori che applicano strategie di difesa adulticide-preventive contattino i tecnici di zona per conoscere le metodiche di intervento territoriali.

GESTIONE AGRONOMICA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica.

Tecnici di zona:

Gorizia, Pordenone, Udine	Servizio Sperimentazione cell. 3346564270		
	AIPO cell. 3479422892	cell. 3474797033	tel. 040 631494
Trieste	S.A.S. Trieste cell. 3886171588	cell. 3485872062	
	AIPO cell. 3479422892	cell. 3474797033	tel. 040 631494
	Servizio Fitosanitario e chimico	cell. 3357543021	