

## SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

### BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 7 del 12 giugno 2015

#### INFORMAZIONI GENERALI

- ∞ Le indicazioni fornite nel presente bollettino relative alla difesa dalle avversità e al controllo delle infestanti, nonché all'uso di fitoregolatori, sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale, e risultano vincolanti solo per le aziende che aderiscono a programmi di difesa integrata volontaria al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità, mentre per tutte le altre aziende le indicazioni devono essere considerate consigli dati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 relativo alla difesa integrata obbligatoria.
- ∞ Il disciplinare di produzione integrata per l'anno 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, comprensivo dell'aggiornamento delle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti" del 22 aprile 2015, è consultabile e scaricabile sul sito dell' ERSA:  
<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/disciplinare-di-produzione-integrata-fvg-per-lanno-2015/>

#### SITUAZIONE METEOROLOGICA

In questo fine settimana e i primi giorni della prossima, è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche con temporali, piogge e cielo coperto che porteranno a un abbassamento delle temperature.

Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

#### FENOLOGIA


Lo stadio fenologico prevalente nei comprensori olivicoli costieri e nelle zone interne più calde è la caduta petali -allegagione e primo accrescimento del frutto. Nelle zone più fresche, le piante, soprattutto di cv tardive, sono ancora in fioritura.



#### SITUAZIONE FITOSANITARIA

##### TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Le catture sono ancora in diminuzione nelle aree più interne, anche se nelle aree costiere e più calde si nota una ripresa dei voli degli adulti (vedi tabella 1).



##### COCCINIGLIA MEZZO GRANO DI PEPE (*Saissetia oleae*)

In alcuni oliveti si osserva un incremento della presenza di cocciniglia dell'olivo. Si consiglia di monitorare il proprio oliveto per osservare la presenza di scudetti e di eventuali fumaggini sulle foglie.

## DISSECCAMENTI DELLA CHIOMA

Chi notasse sui propri olivi dei disseccamenti fogliari anomali o di interi rametti o branche, soprattutto a carico di giovani piante, può rivolgersi ai numeri sottostanti per un sopralluogo dei tecnici ERSA e un eventuale prelievo di materiale da sottoporre ad analisi.

## STRATEGIE DI DIFESA

### TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

In considerazione delle alte temperature dei giorni scorsi, che hanno ostacolato la tignola, e della situazione fenologica dell'olivo, si sconsigliano trattamenti chimici contro la generazione carposfaga a carico delle olive. Solo nelle zone dove di solito si riscontrano danni da tignola: nel caso di forte presenza dell'insetto nelle trappole di monitoraggio in concomitanza con la presenza di drupe in accrescimento, sarà possibile effettuare un trattamento larvicida nelle prossime settimane.

### COCCINIGLIA MEZZO GRANO DI PEPE (*Saissetia oleae*)

Per i trattamenti contro questo parassita è necessario attendere la presenza degli stadi giovanili, più vulnerabili agli insetticidi rispetto alle femmine adulte, e quindi verosimilmente il mese di luglio. Se sono presenti rami fortemente infestati si consiglia il taglio e l'asportazione dall'oliveto delle parti colpite, prima della fuoriuscita delle neanidi.

## GESTIONE DELLA CULTURA

Concimazione fogliare – Si consiglia di effettuare un trattamento fogliare con prodotti a base di boro, microelemento importante per favorire l'allegagione, alla caduta petali. Si consiglia di non miscelare il prodotto con fitofarmaci.

Si consigliano sfalci del manto erboso sotto chioma.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

**N.B. in fioritura è vietato effettuare trattamenti fitosanitari con insetticidi, acaricidi, erbicidi. Sono utilizzabili fungicidi solo se non presentano tossicità per gli impollinatori.**

TABELLA 1 - Catture Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

			20° sett.	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
Prov.	Comune	Località	18-22 mag	25-29 mag	01-05 giu	08-12 giu					
UD	Caneva	Stevenà	/	0	1	/					
UD	Tricesimo	Leonacco	/	5	0	0					
UD	Moimacco	Bottenicco	19	3	1	0					
UD	Faedis	Campeglio	2	0	0	/					
GO	Sagrado	Castelnuovo	2	0	1	/					
GO	Cormons	Quarin	13	36	2	1					
GO	San Floriano	Giasbana	11	23	5	2					
GO	Gorizia	Oslavia	7	6	1	0					

			20° sett.	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
Prov.	Comune	Località	18-22 mag	25-29 mag	01-05 giu	08-12 giu					
TS	Duino Aurisina	Slivia	24	28	3	4					
TS	Duino Aurisina	S.Croce	37	50	12	7					
TS	Trieste	Costalunga	48	152	14	3					
TS	San Dorligo	Caresana	21	70	1	54					
TS	San Dorligo	Bagnoli	32	97	2	10					
TS	Muggia	S.Barbara	27	65	7	9					
TS	Muggia	Chiampore	34	83	9	25					

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN tel. 0432 5293270 cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021