

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 4 del 26 maggio 2017

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Nei prossimi giorni si prevedono condizioni di stabilità in tutta la Regione.

Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

FENOLOGIA

Nei comprensori le piante si trovano nelle fasi e sub-fasi fenologiche differenziate a seconda delle varietà, delle condizioni climatiche delle zone e dell'esposizioni degli impianti.

Negli areali costieri e nei comprensori più caldi si rilevano le fasi di:

- fioritura, inizio fioritura e rigonfiamento dei bottoni floreali su Bianchera;
- inizio fioritura, rigonfiamento dei bottoni floreali e allungamento dei grappoli floreali su Leccino.

Negli areali più interni più freschi si rilevano le fasi di:

- mignolatura completa con lievi differenze tra le cultivar, rigonfiamento dei bottoni floreali e primi fiori aperti nelle località più calde.



SITUAZIONE FITOSANITARIA

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

E' iniziato il monitoraggio della Tignola dell'olivo in tutti i comprensori. Le popolazioni in questa fase della stagione daranno luogo alla generazione antofaga (che si sviluppa sui fiori) che è soggetta a numerosi fattori di limitazione che ne riducono le popolazioni.

Il monitoraggio del lepidottero è importante per costruire la curva di volo che permette di individuare l'epoca ottimale di un eventuale intervento.

La strategia di difesa con trattamenti chimici verrà impostata sulla generazione carpo-faga a carico delle olivine, mentre la difesa con prodotti ammessi in agricoltura biologica si baserà sul controllo dell'infestazione delle infiorescenze e delle olivine.

Tabella 1 - Catture Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Prov.	Comune	Località	20° sett.	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
<i>Pedemontana Pordenonese</i>											
PN	Caneva bio	Fiaschetti		2							
<i>Colline del Friuli</i>											
PN	Pinzano	Perisinotto		0							
UD	Tricesimo	Adorgnano		12							
UD	Gemona bio	Facchin		1							
<i>Alta Pianura Friulana</i>											
UD	Cividale	Ducale		115							
UD	Codroipo	Beano		5							
<i>Bassa Pianura Friulana</i>											
UD	Castions di S.	Ellis		0							
<i>Collio goriziano e isontino</i>											
GO	Cormons	Monte Quarin		1							
GO	Ronchi	Selz		6							
GO	Monfalcone	San Canzian D'Isonzo		0							
<i>Trieste provincia</i>											
TS	Duino Aurisina	Sgonico		7							
TS	Trieste	Contovello		7							
TS	Trieste	Costalunga		12							
TS	San Dorligo	Moccò		40							
TS	San Dorligo	Bagnoli		34							
TS	San Dorligo	Domio		55							
TS	San Dorligo	Caresana		23							
TS	Muggia	S.Barbara		5							
TS	Muggia	Darsella		6							
TS	Muggia	Chiampore		11							

COCCINIGLIA MEZZO GRANO DI PEPE (*Saissetia oleae*)

E' stata segnalata la presenza di neanidi di cocciniglia mezzo grano di pepe e fumaggine in alcune zone costiere, su singole piante, "storicamente" infestate da questo parassita.

Dove si manifestino questi casi si consiglia di contattare il tecnico di zona per valutare un intervento con olio minerale (olio bianco) nel periodo più adatto per colpire le forme mobili.

Nei casi in cui la presenza fosse molto elevata è consigliabile il taglio dei rami infestati.



COTONELLO DELL'OLIVO (*Euphyllura olivina*)



In alcune zone litoranee è stata segnalata la presenza sulle infiorescenze di secrezioni cerose caratteristiche del cotonello dell'olivo.

Le infestazioni di questi insetti psillidi generalmente non provocano danni di rilievo perché lo sviluppo delle loro popolazioni è limitato da numerosi antagonisti naturali e da eventi meteorologici avversi.

La limitazione delle popolazioni di questo insetto non richiede trattamenti chimici ma può efficacemente essere raggiunta adottando tecniche di difesa agronomica tramite potature di sfooltimento della chioma per favorire l'arieggiamento e il soleggiamento della chioma.

GESTIONE DELLA CULTURA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica durante la fase di fioritura ed allegagione.

N.B.: IN TUTTO IL PERIODO DELLA FASE FENOLOGICA DELLA FIORITURA È VIETATO EFFETTUARE TRATTAMENTI FITOSANITARI

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021