

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 9 del 30 giugno 2017

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

FENOLOGIA

Nei comprensori lo sviluppo fenologico prevalente rilevato è il "primo accrescimento del frutto" che può manifestarsi secondo uno stadio di avanzamento della sub-fase diversificato in relazione alle condizioni microclimatiche delle zone e all'esposizione degli impianti.



SITUAZIONE FITOSANITARIA

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Nei comprensori di Udine, Gorizia e Pordenone è stata rilevata una marcata riduzione delle catture di Tignola che evidenzia la tendenza alla conclusione della generazione, mentre in alcune zone della provincia di Trieste si riscontrano ancora catture di elevata entità.

STRATEGIE DI DIFESA

Nelle zone in cui sia stata superata la soglia d'intervento, oppure nei casi di elevate catture rilevate si consiglia di effettuare un trattamento larvicida con formulati sistemici o citotropici (es. Fosmet).

Si consiglia di contattare i tecnici di zona per la verifica della soglia di intervento.

Le aziende che seguono le tecniche di difesa biologiche possono effettuare un trattamento con *Bacillus thuringensis* secondo le indicazioni dei tecnici di zona.

Questo è l'ultimo periodo per effettuare trattamenti contro la tignola

Tabella 1 - Catture Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Prov.	Comune	Località	20° sett.	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
<i>Pedemontana Pordenonese</i>											
PN	Caneva bio	Fiaschetti		2	0	0	22	30	3		
<i>Colline del Friuli</i>											
PN	Pinzano	Perisinotto		0	0	1	1	4	0		
UD	Tricesimo	Adornano		12	10	3	3	43	31		
UD	Gemona bio	Facchin		1	1	1	5	30	20		
<i>Alta Pianura Friulana</i>											
UD	Cividale	Ducale		115	20	0	5	62	22		
UD	Codroipo	Beano		5	1	1	7	22	0		
<i>Bassa Pianura Friulana</i>											
UD	Castions di S.	Ellis		0	0	1	0	0	0		
<i>Collio goriziano e isontino</i>											
GO	Cormons	Monte Quarin		1	0	1	7	4	1		
GO	Ronchi	Selz		6	0	0	19	10	2		
GO	Monfalcone	San Canzian D'Isonzo		0	0	2	6	9	5		
<i>Trieste provincia</i>											
TS	Duino Aurisina	Sgonico		7	2	1	6	9	1		
TS	Trieste	Contovello		7	3	0	23	23	14		
TS	Trieste	Costalunga		12	0	24	98	94	92		
TS	San Dorligo	Moccò		40	3	70	130	90	45		
TS	San Dorligo	Bagnoli		34	6	20	155	135	88		
TS	San Dorligo	Domio		55	3	75	101	101	130		
TS	San Dorligo	Caresana		23	0	15	49	45	52		
TS	Muggia	S.Barbara		5	0	1	60	21	15		
TS	Muggia	Darsella		6	7	32	76	70	42		
TS	Muggia	Chiampore		11	10	18	83	75	48		

MOSCA DELLE OLIVE (*Bactrocera oleae*)

Il monitoraggio settimanale ha evidenziato la presenza di mosca delle olive di significativa entità solo in alcune zone. Nelle altre località le catture sono ancora nulle o trascurabili.

Il monitoraggio del volo degli adulti risulta importante quale misura di difesa preventiva, soprattutto per chi attua la strategia di difesa di tipo adulticida.

STRATEGIE DI DIFESA

Agli olivicoltori che applicano la strategia di difesa adulticida, nelle località in cui si rilevano catture crescenti di significativa entità si consiglia di contattare i tecnici di zona per posizionare il primo intervento adulticida specifico (con esche proteiche o con l'installazione di trappole Attract and kill o con trappole di cattura massale) nei momenti di maggiore presenza degli adulti della mosca, rendendolo così maggiormente efficace.

Tabella 2 – Catture di mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

Punti di monitoraggio			25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.
Prov.	Comune	Località	19 - 25 giu	26 giu – 2 lug				
<i>Pedemontana Pordenonese</i>								
PN	Caneva		0	2				
PN	Caneva		0	7				
PN	Polcenigo		0	0				
PN	Aviano		0	0				
PN	Caneva		0	3				
<i>Colline Friulane</i>								
PN	Pinzano		0	1				
UD	Ragogna		0	0				
UD	Osoppo		0	0				
UD	Tarcento		0	0				
UD	Tricesimo		0	0				
UD	Faedis		0	1				
UD	Gemona		1	0				
<i>Alta Pianura Friulana</i>								
UD	Rodeano		0	0				
UD	Martignacco		0	0				
UD	Cividale		0	0				
UD	Cividale		0	4				
UD	Buttrio		0	4				
UD	Codroipo		0	0				
<i>Bassa Pianura Friulana</i>								
UD	Castions di St		0	0				
UD	Pertegada		0	0				
<i>Collio goriziano e isontino</i>								
GO	Cormons	Monte Quarin		0				
GO	Ronchi	Selz		0				
GO	Monfalcone	San Canzian D' isonzo		0				
<i>Trieste provincia</i>								
TS	Sgonico	Sgonico		1				
TS	Duino Aurisina	Contovello		0				
TS	Trieste	Costalunga		0				
TS	San Dorligo	Moccò		0				
TS	San Dorligo	Bagnoli		1				
TS	San Dorligo	Domio		0				
TS	San Dorligo	Caresana		0				
TS	Muggia	S.Barbara		0				
TS	Muggia	Darsella		0				
TS	Muggia	Chiampore		0				

OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleagina*)

Dopo le piogge dei giorni scorsi, agli olivicoltori che non avessero ancora effettuato trattamenti e in particolare sulle cv. suscettibili alle infezioni, si consiglia di effettuare un trattamento con Dodina oppure con prodotti rameici (preferibilmente in forma di ossicloruro o idrossido).

GESTIONE DELLA COLTURA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica.

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021