

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA COLTURE ERBACEE n.05 del 04.07.2019

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni date con il presente bollettino forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della **difesa integrata obbligatoria** ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012. Vengono fornite anche le indicazioni in merito alle strategie di **difesa integrata volontaria** che sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale (DPI) e vincolanti al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI –Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e misure agroclimatico ambientali del PSR FVG 2014-2020.


Il Disciplinare di Produzione Integrata - norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia a cui fare riferimento per la stagione produttiva 2019, con i relativi aggiornamenti normativi è stato pubblicato sul sito dell' ERSA al seguente link:

<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2019/>

Aggiornamento DIABROTICA

Sulla base delle simulazioni modellistiche effettuate (modello di Davis) attraverso l'utilizzo dei dati meteo pervenuti dall'Osservatorio Meteorologico Regionale - OSMER ARPA FVG, e sulla base dei monitoraggi in campo si evince che si sta completando lo sviluppo larvale delle popolazioni di diabrotica.

Dai monitoraggi condotti durante questa settimana nelle diverse località è stata riscontrata la **presenza dei primi adulti**. Si consiglia quindi di posizionare in campo le trappole cromotropiche per il monitoraggio degli adulti, unico strumento che permette di avere indicazioni sul livello di popolazione presente e quindi valutare la necessità di un effettuare un trattamento al momento opportuno (l'eventuale trattamento va eseguito al momento giusto, dopo l'inizio delle ovideposizioni, ma solamente se è stata superata la soglia di intervento determinata dalle catture settimanali con le trappole).



Localizzazione monitoraggi Diabrotica in Friuli Venezia Giulia.

Ulteriori informazioni in merito all'andamento della popolazione degli adulti verranno fornite nel successivo aggiornamento.

Nota Bene: il rischio di danno da Diabrotica si presenta su mais in monosuccessione, soprattutto se prolungata per più anni e solo in aree con densità di popolazione elevata. Per questi motivi si consiglia di ricorrere alla rotazione delle colture, in modo da ridurre il rischio di danno.

Per ulteriori informazioni:

**ERSA Servizio fitosanitario e chimico, ricerca,
sperimentazione e assistenza tecnica (sezione cerealicoltura):**
Tel.: 0432 529281 - E-mail: ersa@ersa.fvg.it