

AVVERTIMENTO FRUTTICOLO n. 5 del 14 APRILE 2010

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE (Da OSMER - ARPA FVG)

Sul nord Italia permane in quota aria fredda che favorisce una certa instabilità atmosferica.

MONITORAGGIO 2010

Come descritto nell'avvertimento precedente, il monitoraggio è stato eseguito nelle aree seguenti:

Area A: Maniago, San Leonardo Valcellina, Spilimbergo, Rive d'Arcano, Majano, Tolmezzo

Area B: Valvasone, Cordenone, San Vito al Tagliamento, Codroipo, Bicinicco, Mortegliano, Romans d'Isonzo, Gradisca, Cividale, Pozzuolo del Friuli

Area C: Morsano al Tagliamento, Varmo, Castions delle Mura, Fiumicello

FENOLOGIA (SCALA DI FLECKINGER)

In tabella sono indicati i valori minimi e massimi delle fasi fenologiche, rilevati nelle tre aree di monitoraggio

Varietà	Area A	Area B	Area C
Gala	E2/F	E2/F	E2
Red Delicious	E/E2	E2/F	E2
Golden delicious	E/F	E2/F	E2/F
Fuji	E/F	E/F	E2/F
Granny smith	E/F	F	E2/F

GESTIONE DEL FRUTTETO

Interventi agronomici

E' consigliato lo sfalcio dell'interfilare prima della fioritura del melo per favorire l'impollinazione entomofila e salvaguardare le api dal rischio di contaminazione da prodotti insetticidi.

Per prendere visione delle strategie di diradamento adottabili quest'anno, consultare lo speciale "Diradamento del melo - stagione 2010" disponibile sul sito dell'ERSA. Prestare attenzione ai dosaggi indicati in etichetta per ciascuna s.a. e fare attenzione al posizionamento dei trattamenti fitocosmetici che potrebbero interagire con le s.a. utilizzate per il diradamento chimico.

I trattamenti per il miglioramento della forma dei frutti a base di Gibberelline e Benziladenina, dovrebbero essere conclusi entro la fase di piena fioritura mentre gli interventi con fitocosmetici per prevenire la rugginosità si possono posizionare a partire dalla fase di caduta petali.

Patologie fungine

Ticchiolatura (Venturia inaequalis)

La scorsa settimana si sono osservate lievi liberazioni di ascospore mentre il modello previsionale non indica lo sviluppo di infezioni. La strategia di difesa prevede il ripristino della copertura entro questa settimana e in ogni caso prima di eventuali precipitazioni.

Insetti

Eulia (*Argyrotaenia pulchellana*)

In questa settimana sono state rilevate in media le seguenti catture/trappola. Area A: 48, Area B: 48, Area C: 42.

Tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*)

Il volo di questo carpofago è iniziato in tutta la regione.

Carpocapsa (*Cydia pomonella*)

Dove si prevede di adottare le strategie di autoconfusione, confusione e disorientamento sessuale, si può programmare l'installazione dei diffusori a partire dalla prossima settimana e comunque prima dell'inizio dei voli.

La situazione dei gradi giorno al 13/04 risulta esser compresa tra 40 e 50 gg in quasi tutto il territorio regionale.

ALTRE INFORMAZIONI

Con il 25% di fiori aperti si possono posizionare le arnie per l'impollinazione entomofila.

Aggiornamento revisione agrofarmaci: a seguito della revisione europea degli agro farmaci, il termine ultimo per l'utilizzo delle scorte aziendali dei prodotti fitosanitari contenenti le s.a. BNOA è fissato al 26 luglio mentre per il Triflumuron al 16 settembre.

In assenza di precipitazione di almeno 10 mm nell'ultima settimana, provvedere all'irrigazione prestando attenzione alle conseguenze per la difesa da ticchiolatura e di colpo di fuoco batterico.