

## Melo: Fasi fenologiche (Fleckinger)

Nel corso della stagione 2007 lo stadio “rottura gemme” è stato osservato nei primi giorni di marzo in buona parte del territorio regionale.

A metà marzo (14 marzo – Azienda Rinascita) quasi tutte le varietà monitorate presentavano la fase “punte verdi” e “orecchiette di topo”, mentre lo stadio di “bottoni rosa” ha preso avvio nella prima decade di aprile per le varietà *Gala*, *Red chief* e *Granny smith* e pochi giorni dopo per *Golden delicious* e *Fuji*.



Foto 1 - Melo in piena fioritura.

A metà aprile (17 aprile – Azienda Rinascita) tutte le varietà avevano raggiunto la fase di “piena fioritura”, che è risultata essere omogenea e ben distribuita tra le piante. Rispetto alla precedente stagione si è riscontrato un anticipo di circa 10-12 giorni (dal 24 al 26 aprile 2006 – Azienda Rinascita).

A fine aprile sono stati rilevati gli stadi di “fine caduta petali” e di “inizio allegagione”.

L’ingrossamento dei frutti è stato accelerato dalle condizioni climatiche favorevoli e lo stadio di “frutto noce” è stato osservato per quasi tutte le varietà da metà a fine maggio.

Tra fine giugno e inizio luglio, quando le precipitazioni erano scarse e le temperature in aumento, si è osservato un arresto dell’accrescimento dei frutticini. Successivamente le buone condizioni meteo hanno favorito i processi di maturazione dei frutti, che hanno raggiunto lo stadio ottimale di raccolta con un anticipo di circa 10-15 giorni.