

## SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

### BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA PERO n° 16 del 5 LUGLIO 2018

#### INFORMAZIONI GENERALI

- Le indicazioni fornite nel presente bollettino relative alla difesa dalle avversità e al controllo delle infestanti, nonché all'uso di fitoregolatori, sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale (DPI), e risultano vincolanti solo per le aziende che aderiscono a programmi di difesa integrata volontaria al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità (Global gap, SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, ecc.), mentre per tutte le altre aziende le indicazioni devono essere considerate consigli dati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 relativo alla difesa integrata obbligatoria.

- Il Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia da applicarsi nella stagione 2018 è consultabile sul sito dell' ERSA al seguente link: <http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2018/>

Il Decreto 311/SCS/PT/gf del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA del 26/04/2018 ha aggiornato le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti".

- In ottemperanza a quanto previsto dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN – DM 22 gennaio 2014), si ricorda che devono essere sottoposte al controllo funzionale, entro il 26 novembre 2018, fra le altre, le irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.
- Disciplinare di produzione integrata – Concessione di deroga per l'impiego dei formulati commerciali RELDAN LO e RUNNER LO oggetto di estensione d'impiego sulle colture del melo e del pero.  
Si ammette su tutto il territorio regionale l'impiego dei formulati commerciali RELDAN LO e RUNNER LO, contenenti la sostanza attiva Clorpirifos metile per un massimo di 2 interventi all'anno, nel limite complessivo massimo di 5 litri/ettaro/anno

#### AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Sul portale del Ministero della Salute sono stati pubblicati i comunicati di applicazione dei regolamenti (UE) 2018/783, 2018/784 e 2018/785 della Commissione del 29 maggio 2018, recanti modifiche alle condizioni di approvazione delle sostanze attive **imidacloprid**, **clothianidin** e **thiametoxam**. Al seguente link si possono consultare gli aggiornamenti normativi:

<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/melo/aggiornamenti-normativi-2018/>

## PREVISIONI METEOROLOGICHE

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito [www.osmer.fvg.it](http://www.osmer.fvg.it)

## FENOLOGIA

Di seguito la tabella con le fasi fenologiche di Fleckinger e BBCH:



Fase fenologica	Fleckinger	BBCH
Ingrossamento dei frutti	J	75-79

Tutte le varietà monitorate (William, Abate, Conference, Kaiser) sono in fase di accrescimento frutti (J).

## SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA

RILIEVI IN FRUTTETO	STRATEGIA
<b>Ticchiolatura/Maculatura bruna:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>In alcuni impianti monitorati si osservano lievi sintomi di entrambe le patologie.</li></ul>	Intervenire preventivamente, in funzione di piogge e/o bagnature prolungate, con prodotti efficaci nei confronti di entrambi i patogeni: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Captano</b></li><li><b>Penthiopirad + prodotto di copertura</b></li><li><b>Fluxapyroxad + prodotto di copertura</b></li><li><b>Fluopyram+Tebuconazolo</b></li><li><b>Tebuconazolo</b></li><li><b>Thiram , Ziram , Metiram (*)</b></li></ul> <p>(*) Possono essere utilizzati anche dopo il 20 giugno e fino a 40 giorni dalla raccolta <b><u>SOLO nei frutteti colpiti da maculatura bruna</u></b> e <b><u>LIMITATAMENTE alle varietà sensibili</u></b> (vedi Disciplinare di Produzione Integrata)</p>
<b>Colpo di fuoco batterico</b>	In generale si raccomanda un attento monitoraggio del frutteto, in particolare dove si sono verificati eventi grandinigeni e/o dove sono presenti fioriture secondarie. Segnalare la presenza di sintomi ai tecnici del Servizio fitosanitario
<b>Psilla (Cacopsylla pyri):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>In alcuni impianti monitorati si segnala una ripresa delle infestazioni</li></ul>	Con infestazioni in corso intervenire con <ul style="list-style-type: none"><li><b>Olio minerale</b></li><li><b>Agricolle</b></li></ul> Oppure effettuare lavaggi con: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Sali potassici di acidi grassi</b></li></ul>

<p><b>Cocciniglia di S. Josè:</b></p>	<p>In caso di presenza trattare con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Clorpirifos metile</b> (efficace anche nei confronti di <i>H. halys</i>)</li> </ul>
<p><b>Carpocapsa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E' iniziato il volo della seconda generazione</li> <li>• Soglia di intervento: 2 adulti per trappola catturati in 1 o 2 settimane</li> <li>• Verificare l'eventuale presenza di fori 100 frutti/ha. Soglia di intervento 1 %</li> </ul> <p>La sommatoria termica dei gradi giorno è consultabile quotidianamente nella sezione meteo del sito dell'ERSA al seguente link : <a href="http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/">http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/</a></p>	<p>Effettuare un trattamento con prodotti ovo-larvicidi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Triflumuron</b></li> <li>• <b>Metossifenozone</b></li> </ul>
<p><b>Eulia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coda di volo della seconda generazione con catture sporadiche</li> </ul>	<p>Non sono necessari trattamenti specifici (i trattamenti contro carpocapsa controllano anche questo fitofago)</p>
<p><b>Archips:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di volo</li> </ul>	<p>Non sono necessari trattamenti specifici (i trattamenti contro carpocapsa controllano anche questo fitofago))</p>
<p><b>Pandemis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di volo</li> </ul>	<p>Non sono necessari trattamenti specifici (i trattamenti contro carpocapsa controllano anche questo fitofago)</p>
<p><b>Cydia del pesco:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di volo</li> </ul>	<p>Non sono necessari trattamenti specifici (i trattamenti contro carpocapsa controllano anche questo fitofago)</p>
<p><b>Cimice marmorata asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosegue l'incremento delle forme giovanili e sono stati osservati i primi adulti della nuova generazione.</li> <li>• Presenza di danni ai frutti</li> </ul>	<p>Verificare la presenza dell' insetto e valutare la necessità di eseguire un trattamento insetticida con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acetamiprid</b> (efficace sia sugli adulti che sugli stadi giovanili). Max 2 interventi l'anno</li> <li>• <b>Clorpirifos metile</b> (efficace sia sugli adulti che sugli stadi giovanili ed attivo anche nei confronti delle cocciniglie) (Max 2 interventi l'anno se si usano i formulati Runner LO e Reldan LO)</li> </ul> <p>Ove possibile intervenire sui bordi o nelle aree più infestate.</p> <p>Maggiori informazioni nell'approfondimento settimanale pubblicato in home page sul sito <a href="http://www.ersa.fvg.it">www.ersa.fvg.it</a></p>

## ALTRE INFORMAZIONI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	EPOCA
<b>GRANDINE</b>	<b>STRATEGIA</b>
<p>Gli interventi eseguiti al fine di cicatrizzare le ferite causate da eventi grandinigeni sono consigliati entro 24 ore dall'evento.</p> <p>Questi trattamenti non incidono sul numero massimo di interventi ammessi con Dithianon+Captano previsti dal DPI.</p> <p>Vanno comunque rispettati i vincoli di etichetta relativi al numero massimo complessivo di interventi eseguiti ed all'intervallo tra gli stessi.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Captano</b></li></ul>
<p><b>Irrigazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualora necessario, procedere con l'irrigazione rispettando i volumi massimi di adacquamento previsti dal disciplinare di produzione integrata</li></ul>	Il fabbisogno irriguo per la coltura del pero su interfilare inerbito, nel mese di luglio, è di 5 mm/giorno

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI. PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.