

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DRUPACEE
n° 14 del 09 GIUGNO 2023**

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Sul Triveneto non ci sono perturbazioni definite; ad alta quota però permane aria relativamente fredda mentre, nei bassi strati, è presente aria umida che il forte irraggiamento diurno rende instabile dal pomeriggio, specie tra pianura e Prealpi.

Consultare le previsioni aggiornate che OSMER pubblica puntualmente ogni giorno dopo le 13.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA

La tabella con le fasi fenologiche di Baggiolini è scaricabile al link:

<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/melo/fasi-fenologiche-pomacee-e-drupacee/Fenologia%20drupacee.pdf>

Attualmente (23^a settimana) il pesco e il ciliegio si trovano nelle seguenti fasi fenologiche:

SPECIE	FASE FENOLOGICA	
	BAGGIOLINI	BBCH
Pesco	I (accrescimento frutto)	75/79
Ciliegio	Da (inizio invaiatura) a (maturazione di raccolta)	81-87

REVOCA PRODOTTI FITOSANITARI

La seguente sostanza attiva è stata revocata, i formulati commerciali contenenti questa sostanza potranno essere impiegati entro la data riportata:

- **Acrinatrina:** utilizzo entro il 29 giugno 2023.

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

Si informa che con **Decreto** del Direttore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA **n. 265 del 3 maggio 2023** sono state adottate le modifiche dei Disciplinari di Produzione Integrata regionale 2023.

Tutti i documenti sono disponibili sul sito ERSA all' indirizzo:

http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/difesa-produzione-integrata-fvg-anno-2023/0%20decreto%20265%20del%2003_05_2023%20adoz%20modif%20discipl%202023.pdf

SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA - PESCO

RILIEVI IN FRUTTETO	STRATEGIA
<p>Monilia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condizioni favorevoli al patogeno • Si approssima la raccolta delle varietà più precoci 	<p>Intervenire sulle varietà sensibili che si approssimano alla raccolta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IBE • Tryfloxistrobin • Tebuconazolo • Pyraclostrobin • Boscalid • Fluopyram • Cyprodinil • Fludioxonil • Mefentrifluconazolo <p>Per ridurre il rischio di resistenza si consiglia di utilizzare in miscela principi attivi con diverso meccanismo d'azione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bacillus subtilis</i> • <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <p>Verificare gli intervalli di sicurezza per le cultivar che si approssimano alla raccolta.</p>
<p>Batteriosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negli impianti solitamente colpiti e su varietà sensibili rischio infezione 	<p>In previsione di piogge e/o bagnature prolungate della vegetazione, effettuare un trattamento preventivo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acibenzolar-S-metile • Formulati rameici a basso dosaggio di Cu + Propoli • <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> • <i>Bacillus subtilis</i>

<p>Cydia molesta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosegue il secondo volo. • Verificare la presenza di germogli cidiati <p>Soglia d'intervento per la II generazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 catture per trappola a settimana 	<p>Al superamento della soglia intervenire con insetticidi ad azione larvicida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etofenprox (efficacie anche nei confronti di cimice asiatica) • Emamectina benzoato • Spinetoram <p>Verificare gli intervalli di sicurezza per le cultivar in maturazione.</p>
<p>Anarsia lineatella</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosegue il volo con catture in deciso aumento e sopra soglia in diverse stazioni. • Soglia d'intervento: 7 catture per trappola a settimana o 10 catture per trappola in due settimane 	<p>I prodotti utilizzati per <i>Cydia molesta</i> controllano anche questo fitofago.</p>
<p>Sharka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si continuano ad osservare sintomi evidenti sia su foglia che su frutto. • Da gennaio 2022 questo virus non è più considerato un organismo di quarantena, quindi non vi è più l'obbligo di difesa insetticida degli insetti vettori: <p>Decreto n. 60 del 28/01/2022 Abrogazione lotta obbligatoria</p>	<p>In tutti i pescheti è comunque buona norma effettuare controlli periodici ed eliminare le piante con sintomi.</p> <p>Altrettanto importante è monitorare e tenere sotto controllo gli afidi vettori.</p>

SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA CILIEGIO

RILIEVI IN FRUTTETO	STRATEGIA
<p>Monilia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In raccolta le varietà a maturazione intermedia (es. Grace Star, Black Star) • Condizioni favorevoli alle infezioni 	<p>Effettuare un trattamento preventivo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryfloxistrobin • Tebuconazolo • Pyraclostrobin • Boscalid • Fluopyram • Mefentrifluconazolo <p>Per ridurre il rischio di resistenza si consiglia di utilizzare in miscela principi attivi con diverso</p>

	<p>meccanismo d'azione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bacillus subtilis • Bacillus amyloliquefaciens <p>Verificare gli intervalli di sicurezza</p>
<p>Mosca del ciliegio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catture in aumento nei siti monitorati <p>Soglia d'intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Presenza</i> 	<p>In presenza del parassita effettuare un trattamento dall'invasatura con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etofenprox (efficacie anche nei confronti di cimice asiatica) • Deltametrina (efficacie anche nei confronti di cimice asiatica) • Spinosad (solo in formulazione Spintorfly) <p>Verificare gli intervalli di sicurezza</p>
<p>Drosophila suzuki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catture in calo, si osservano danni limitati 	<p>In presenza del parassita effettuare un trattamento dall'invasatura con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spinetoram • Deltametrina (efficacie anche nei confronti di cimice asiatica) <p>Verificare gli intervalli di sicurezza</p>
<p>Spaccatura delle ciliegie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andamento climatico favorevole • Si continuano ad osservare fenomeni di cracking dovuti alle piogge • Il livello di danno è condizionato in particolare dalla sensibilità varietale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Negli impianti sprovvisti di telo antipioggia è possibile intervenire con prodotti in grado di regolare la traspirazione dei frutti e ridurre l'incidenza di questa fisiopatia.

ALTRE INFORMAZIONI

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
<p>Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ Catture di adulti svernanti in calo nelle trappole di monitoraggio. ☞ Si segnala la prima cattura di forma giovanile (secondo stadio) ☞ Il monitoraggio, <u>sia visivo che con trappole appropriate</u>, permette di individuare la presenza dell'insetto nei propri appezzamenti e le fasi di sviluppo dello stesso. Questo consente di stabilire il momento più opportuno per effettuare un 	<p>Pesco</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osservata presenza limitata di adulti sulle piante di pesco all'interno degli impianti, ad ora rilevati danni di scarsa entità sui frutti. <p>Ciliegio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si osserva una limitata presenza di adulti e di danni a carico dei frutti <p>In caso di presenza di adulti e forme giovanili e di primi danni ai frutti programmare un intervento con:</p>

<p>eventuale trattamento insetticida.</p> <p>☞ È possibile consultare i dati delle catture registrate nei siti di monitoraggio al link: https://agrics.regione.fvg.it/agricsweb/fito</p> <p>☞ Per maggiori informazioni è possibile consultare il bollettino speciale H. halys presente nel sito dell'ERSA e trasmesso tramite canale telegram: link: https://t.me/ERSA_cimice_asiatric</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acetamiprid • Etofenprox • Deltametrina <p><u>Nel rispetto degli intervalli di sicurezza.</u></p>
<p>Grandine:</p> <p>Dopo una grandinata effettuare entro 24 ore dall'evento un intervento fungicida al fine di cicatrizzare le ferite. Questi trattamenti non incidono sul numero massimo di interventi ammessi con le s.a. consigliate previsti dal DPI. Vanno comunque rispettati i vincoli di etichetta relativi al numero massimo complessivo di interventi eseguiti e all'intervallo tra gli stessi.</p>	<p>I prodotti consigliati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Captano (solo su pesco; I.S. 21 giorni) • Propoli

Da quest'anno gli andamenti dei voli degli insetti dannosi dei fruttiferi sono consultabili sulla piattaforma "AgriCS, Agricoltura, Conoscenza, Sviluppo" progetto realizzato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e finanziato dalla sottomisura 1.2 del Programma di Sviluppo Rurale FVG 2014-2020. Dal link diretto

<https://agrics.regione.fvg.it/agricsweb/fito>

si può accedere alle sezioni "Monitoraggio della cimice marmorata asiatica" e "Monitoraggio altri insetti dannosi". Nella sezione cimice saranno aggiornate in tempo reale le catture settimanali di adulti e giovani in ciascun sito di monitoraggio; nella sezione altri insetti dannosi, dopo aver effettuato la scelta della coltura e del metodo di conduzione, si rende visibile la mappa in cui sono evidenziati i Comuni dove viene effettuato il monitoraggio e cliccando all'interno del Comune prescelto si possono consultare i grafici delle catture settimanali.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI. PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni date con il presente bollettino consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, indicazioni operative sulle principali colture relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III D.lgs. 150/2012).

Le indicazioni fornite nei bollettini fanno riferimento alle diverse aree produttive della regione e non esauriscono le possibili situazioni di dettaglio, che vanno monitorate e valutate a livello aziendale.

Quando espressamente precisato, forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della difesa integrata volontaria (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e misure agroclimatico ambientali del PSR FVG 2014-2020). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti" del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia.

PAN: Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Il PAN prevede che per il controllo delle diverse avversità delle colture sia possibile l'utilizzo dei fitofarmaci. Questa possibilità è però condizionata al rispetto preventivo di alcune misure ed in particolare specifica che questi prodotti possano essere impiegati solo all'interno di strategie di difesa integrata (obbligatoria o volontaria) o di difesa biologica.

Uno dei punti fondamentali della difesa integrata prevede che l'operatore professionale possa utilizzare i prodotti fitosanitari solo quando necessario e cioè quando ci sono le condizioni per lo sviluppo dell'avversità e nel rispetto rigoroso **delle indicazioni riportate in etichetta**.

CANALE TELEGRAM:

ERSA ha attivato un nuovo servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Per le drupacee il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram ERSA FVG Bollettini drupacee integrato
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_drupacee_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili sulla home page del sito ERSA
www.ersa.fvg.it