

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,  
 RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DRUPACEE  
 n° 16 del 22 GIUGNO 2023**

**PREVISIONI METEOROLOGICHE**

L'anticiclone nord-africano insisterà sulla regione fino alla notte tra giovedì e venerdì. Venerdì una depressione atlantica con aria più fresca in quota determinerà instabilità. Nel week-end alta pressione con aria più secca da nord-est.

Consultare le previsioni aggiornate che OSMER pubblica puntualmente ogni giorno dopo le 13. Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito [www.osmer.fvg.it](http://www.osmer.fvg.it)  
 Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

**FENOLOGIA**

La tabella con le fasi fenologiche di Baggiolini è scaricabile al link:  
<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/melo/fasi-fenologiche-pomacee-e-drupacee/Fenologia%20drupacee.pdf>

Attualmente (25<sup>a</sup> settimana) il pesco e il ciliegio si trovano nelle seguenti fasi fenologiche:

| SPECIE   | FASE FENOLOGICA   |          |
|----------|---|----------|
|          | BAGGIOLINI  | BBCH     |
| Pesco    | Da I (accrescimento frutto) a (maturazione di raccolta) | 75/79-87 |
| Ciliegio | Da (piena invaiatura) a (maturazione di raccolta)       | 85-87    |

**REVOCA PRODOTTI FITOSANITARI**

La seguente sostanza attiva è stata revocata, i formulati commerciali contenenti questa sostanza potranno essere impiegati entro la data riportata:

- **Acrinatrina:** utilizzo entro il 29 giugno 2023.

## DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

Si informa che con **Decreto** del Direttore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA **n. 265 del 3 maggio 2023** sono state adottate le modifiche dei Disciplinari di Produzione Integrata regionale 2023.

Tutti i documenti sono disponibili sul sito ERSA all' indirizzo:

[http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/difesa-produzione-integrata-fvg-anno-2023/0%20decreto%20265%20del%2003\\_05\\_2023%20adoz%20modif%20discipl%202023.pdf](http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/difesa-produzione-integrata-fvg-anno-2023/0%20decreto%20265%20del%2003_05_2023%20adoz%20modif%20discipl%202023.pdf)

### SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA - PESCO

| RILIEVI IN FRUTTETO   | STRATEGIA  |
|---|--|
| <p><b>Monilia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In raccolta le varietà precoci (es. Springbelle per le pesche e Big Haven per le nettarine)</li> </ul>   | <p>Intervenire sulle varietà sensibili che si approssimano alla raccolta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>IBE</b></li> <li><b>Tryfloxistrobin</b></li> <li><b>Tebuconazolo</b></li> <li><b>Pyraclostrobin</b></li> <li><b>Boscalid</b></li> <li><b>Fluopyram</b></li> <li><b>Cyprodinil</b></li> <li><b>Fludioxonil</b></li> <li><b>Mefentrifluconazolo</b></li> </ul> <p>Per ridurre il rischio di resistenza si consiglia di utilizzare in miscela principi attivi con diverso meccanismo d'azione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><i>Bacillus subtilis</i></b></li> <li><b><i>Bacillus amyloliquefaciens</i></b></li> </ul> <p><b>Verificare gli <u>intervalli di sicurezza</u> per le cultivar che si approssimano alla raccolta.</b></p> |
| <p><b>Cydia molesta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosegue il secondo volo.</li> <li>Verificare la presenza di germogli cidiati.</li> </ul> <p><b>Soglia d'intervento per la II generazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10 catture per trappola a settimana</li> </ul> | <p>Al superamento della soglia intervenire con insetticidi ad azione larvicida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Etofenprox</b> (efficacie anche nei confronti di cimice asiatica)</li> <li><b>Emamectina benzoato</b></li> <li><b>Spinetoram</b></li> </ul> <p><b>Verificare gli <u>intervalli di sicurezza</u> per le cultivar in maturazione.</b></p>  |
| <p><b>Anarsia lineatella</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosegue il volo.</li> </ul> <p><b>Soglia d'intervento:</b></p>   | <p>I prodotti utilizzati per <i>Cydia molesta</i> controllano anche questo fitofago.</p>   |

|   |   |
|---|---|
| 7 catture per trappola a settimana o 10 catture per trappola in due settimane   |   |
| <b>Forficule</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rilevate forti infestazioni in diversi frutteti che stanno creando danni sensibili alla produzione</li> </ul> | Si ricorda che alcune delle sostanze attive utilizzate contro <i>Cydia molesta</i> e/o <i>Halyomorpha halys</i> ( <b>Etofenprox, Deltametrina, Spinosad/Spinetoram</b> ), se applicati nelle ore notturne, possono contribuire al contenimento anche nei confronti delle forficule. |

### SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA CILIEGIO

| RILIEVI IN FRUTTETO  | STRATEGIA  |
|--|--|
| <b><i>Rhagoletis cerasi</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosegue il volo con catture in netto calo</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si sta approssimando la raccolta delle varietà più tardive (es. Regina). Al fine di rispettare l'intervallo di sicurezza dei prodotti non è più possibile effettuare trattamenti.</li> </ul>  |
| <b><i>Drosophila suzuki</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosegue il volo con catture in netto calo.</li> <li>Dove non si è seguita puntualmente la difesa contro il moscerino si stanno osservando danni sensibili.</li> <li>Terminata la raccolta delle ciliegie i moscerini si possono spostare su colture limitrofe di albicocco e di pesco in maturazione.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si sta approssimando la raccolta delle varietà più tardive (es. Regina). Al fine di rispettare l'intervallo di sicurezza dei prodotti non è più possibile effettuare trattamenti.</li> <li>Per ridurre l'inoculo eliminare tempestivamente i frutti colpiti e comunque tutti quelli presenti al suolo.</li> </ul> |
| <b>Infezioni fungine</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proseguire, dove necessario, con la difesa fungicida anche successivamente alla raccolta per mantenere un adeguato stato fitosanitario e funzionale della chioma</li> </ul>   |

### ALTRE INFORMAZIONI

| TIPOLOGIA   | DESCRIZIONE   |
|---|---|
| <b>Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Si segnalano generalmente catture di adulti in calo nelle trappole di monitoraggio mentre sono in ulteriore aumento le forme giovanili nelle trappole Rescue nella gran parte degli areali</li> </ul> | <b>Pesco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stabile la presenza di adulti di cimice asiatica nei frutteti, in aumento quella delle forme giovanili.</li> <li>Con la raccolta si può valutare il livello di danno causato da questo</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
| <p>monitorati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Oltre che nelle trappole di monitoraggio, osservate forme giovanili (1°-4° stadio) nei frutteti e nelle siepi e presenza di ovature.</li> <li>☞ Il monitoraggio, <u>sia visivo che con trappole appropriate</u>, permette di individuare la presenza dell'insetto nei propri appezzamenti e le fasi di sviluppo dello stesso. Questo consente di stabilire il momento più opportuno per effettuare un eventuale trattamento insetticida.</li> <li>☞ È possibile consultare i dati delle catture registrate nei siti di monitoraggio al link:<br/><a href="https://agrics.regione.fvg.it/agricsweb/fito">https://agrics.regione.fvg.it/agricsweb/fito</a></li> <li>☞ Per maggiori informazioni è possibile consultare il bollettino speciale H. halys presente nel sito dell'ERSA e trasmesso tramite canale telegram:<br/>link: <a href="https://t.me/ERSA_cimice_asiatric">https://t.me/ERSA_cimice_asiatric</a></li> </ul> | <p>insetto. Negli impianti monitorati si rilevano danni di entità variabile sui frutti.</p> <p>In caso di presenza di adulti e forme giovanili e di danni ai frutti programmare un intervento con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acetamiprid</b></li> <li>• <b>Etofenprox</b></li> <li>• <b>Deltametrina</b></li> </ul> <p><b><u>Nel rispetto degli intervalli di sicurezza.</u></b></p> |
| <p><b>Grandine:</b></p> <p>Dopo una grandinata effettuare entro 24 ore dall'evento un intervento fungicida al fine di cicatrizzare le ferite. Questi trattamenti non incidono sul numero massimo di interventi ammessi con le s.a. consigliate previsti dal DPI. Vanno comunque rispettati i vincoli di etichetta relativi al numero massimo complessivo di interventi eseguiti e all'intervallo tra gli stessi.</p>   | <p>I prodotti consigliati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Captano</b> (solo su pesco; I.S. 21 giorni)</li> <li>• <b>Propoli</b></li> </ul>   |

Da quest'anno gli andamenti dei voli degli insetti dannosi dei fruttiferi sono consultabili sulla piattaforma "AgriCS, Agricoltura, Conoscenza, Sviluppo" progetto realizzato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e finanziato dalla sottomisura 1.2 del Programma di Sviluppo Rurale FVG 2014-2020. Dal link diretto

<https://agrics.regione.fvg.it/agricsweb/fito>

si può accedere alle sezioni "Monitoraggio della cimice marmorata asiatica" e "Monitoraggio altri insetti dannosi". Nella sezione cimice saranno aggiornate in tempo reale le catture settimanali di adulti e giovani in ciascun sito di monitoraggio; nella sezione altri insetti dannosi, dopo aver effettuato la scelta della coltura e del metodo di conduzione, si rende visibile la mappa in cui sono evidenziati i Comuni dove viene effettuato il monitoraggio e cliccando all'interno del Comune prescelto si possono consultare i grafici delle catture settimanali.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI. PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.

## INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni date con il presente bollettino consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, indicazioni operative sulle principali colture relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III D.lgs. 150/2012).

Le indicazioni fornite nei bollettini fanno riferimento alle diverse aree produttive della regione e non esauriscono le possibili situazioni di dettaglio, che vanno monitorate e valutate a livello aziendale.

Quando espressamente precisato, forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della difesa integrata volontaria (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e misure agroclimatico ambientali del PSR FVG 2014-2020). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti" del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia.

## PAN: Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Il PAN prevede che per il controllo delle diverse avversità delle colture sia possibile l'utilizzo dei fitofarmaci. Questa possibilità è però condizionata al rispetto preventivo di alcune misure ed in particolare specifica che questi prodotti possano essere impiegati solo all'interno di strategie di difesa integrata (obbligatoria o volontaria) o di difesa biologica.

Uno dei punti fondamentali della difesa integrata prevede che l'operatore professionale possa utilizzare i prodotti fitosanitari solo quando necessario e cioè quando ci sono le condizioni per lo sviluppo dell'avversità e nel rispetto rigoroso **delle indicazioni riportate in etichetta**.

## CANALE TELEGRAM:

ERSA ha attivato un nuovo servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it) dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Per le drupacee il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram ERSa FVG Bollettini drupacee integrato  
Per iscriverti clicca qui: [https://t.me/ERSA\\_drupacee\\_IPM](https://t.me/ERSA_drupacee_IPM)

**Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili sulla home page del sito ERSa**  
[www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it)