



BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DEL PESCO n° 18 del 18 LUGLIO 2025

PREVISIONI METEOROLOGICHE

La regione nei prossimi giorni sarà all'interno di un contesto stabile e anticiclonico con afflusso prevalente di correnti secche. Tuttavia sabato sera un veloce fronte potrà portare a locale instabilità.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersa al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA

La tabella con le fasi fenologiche di Baggiolini è scaricabile al link:

<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/melo/fasi-fenologiche-pomacee-e-drupacee/Fenologia%20drupacee.pdf>

SPECIE	FASE FENOLOGICA (29ª settimana)	
	BAGGIOLINI	BBCH
Pesco	Da I (accrescimento frutto) a (maturazione di raccolta)	74/79 - 87

REVOCA PRODOTTI FITOSANITARI

Come da Comunicato del Ministero della Salute, reperibile al link <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderFitoPdf?codleg=86822&anno=2022&parte=1> le seguenti sostanze attive sono state revocate:

- **Spirotetramat:** i prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza attiva sono stati revocati dal **30 aprile 2024**; la commercializzazione era consentita fino al **30 ottobre 2024**; l'impiego da parte degli utilizzatori finali è consentito non oltre il **30 ottobre 2025**.

- **Spinetoram**: i prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza attiva sono stati revocati dal **30 giugno 2024**; la commercializzazione era consentita fino al **30 dicembre 2024**; l'impiego da parte degli utilizzatori finali è consentito non oltre il **30 dicembre 2025**
- **Acibenzolar-S-methyl**: i prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza attiva sono stati revocati dal **10 luglio 2024**; la commercializzazione era consentita fino al **10 gennaio 2025**; l'impiego da parte degli utilizzatori finali è consentito non oltre il **10 luglio 2025**. Come da Comunicato del Ministero della Salute, reperibile al link: file:///C:/Users/user/Downloads/161_Comunicato-di-revoca-dei-prodotti-fitosanitari-contenenti-la-sostanza-attiva-Acibenzolar-S-Methyl_2025-04-02_16-54-18.pdf

ADEGUAMENTO ETICHETTE CAPTANO, ACETAMIPRID E DELTAMETRINA

- Si ricorda che dal 1° febbraio 2025 è entrato in vigore un adeguamento dell'etichetta dei prodotti contenenti la sostanza attiva **Captano**. I lotti dei prodotti autorizzati fabbricati fino al **31 gennaio 2025** potranno essere commercializzati sino al **30 aprile 2025** e impiegati sino al **31 ottobre 2025**.
- Con Decreto Dirigenziale del 19 febbraio 2025 è stata autorizzata la modifica dell'etichetta ministeriale di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **Acetamiprid**, nel rispetto dei nuovi LMR previsti dal Reg. (UE) 2025/158, come verificabile al seguente link:
https://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet
- Modifiche alle etichette ministeriali sono state autorizzate anche per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **Deltametrina** verificabili sempre al link:
https://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet

CLOSER (S.A. SULFOXAFLORE): AUTORIZZAZIONE PER SITUAZIONE DI EMERGENZA

L'utilizzo per situazione di emergenza fitosanitaria del prodotto Closer (s.a.Sulfoxaflor) è autorizzato per l'impiego su pesco dal 9 aprile 2025 al 6 agosto 2025 (Decreto Ministero della Salute del 9 aprile 2025).

Al fine di ridurre il rischio per api e pronubi selvatici, si segnala l'importanza di prestare la massima attenzione alle prescrizioni supplementari (in particolare la fascia di rispetto quale misura di mitigazione a bordo campo) e alle avvertenze presenti in etichetta relativamente a modalità e i tempi per l'applicazione dell'insetticida.

AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIEGO DI PRODOTTI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA FITOSANITARIA E DEROGA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA

Nel caso di autorizzazioni all'impiego di prodotti ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, art. 53, per situazioni di emergenza fitosanitaria, non è necessario un provvedimento di deroga al disciplinare nei casi in cui l'autorizzazione riguardi estensioni di impiego di sostanze attive già previste nelle Linee Tecniche di difesa per altre colture o impieghi. In questi casi, come regola consolidata a livello nazionale, non è necessario aggiornare la lista delle sostanze attive presenti nelle schede di difesa delle relative colture per le quali il prodotto è stato autorizzato. La deroga deve

essere invece approvata nei casi in cui l'autorizzazione per situazioni di emergenza fitosanitaria riguardi: sostanze attive candidate alla sostituzione; sostanze attive revocate dall'UE; s.a. pericolose per le acque presenti nell'elenco delle tabelle 1/A e 1/B, Allegato I D.Lgs. 152/06; s.a. non ancora autorizzate; sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene, Teratogene - CMR.

SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA

RILIEVI IN FRUTTETO	STRATEGIA
Monilia: In raccolta le varietà a maturazione intermedia.	In caso di piogge intervenire preventivamente sulle varietà sensibili che si approssimano alla raccolta con: Fluopyram + Tebuconazolo Fenpyrazamine Tryfloxistrobin + Tebuconazolo Tebuconazolo Pyraclostrobin + Boscalid Verificare gli intervalli di sicurezza
Sharka - Si continuano ad osservare sintomi sia su foglia che su frutto. - Da gennaio 2022 questo virus non è più considerato un organismo di quarantena. Decreto n. 60 del 28/01/2022 Abrogazione lotta obbligatoria	In tutti i pescheti è comunque buona norma effettuare controlli periodici ed eliminare le piante con sintomi. <u>Altrettanto importante è monitorare e tenere sotto controllo gli afidi vettori.</u>
Cydia molesta - Prosegue il volo con catture elevate e spesso sopra soglia. Soglia d'intervento 10 catture per trappola per settimana	Al superamento della soglia intervenire con insetticidi ad azione larvicida: Etofenprox (efficacie anche nei confronti di cimice asiatica) Emamectina benzoato Verificare gli intervalli di sicurezza
Anarsia lineatella - Prosegue il volo Soglia d'intervento: 7 catture per trappola a settimana- 10 catture per trappola in due settimane	I trattamenti consigliati contro <i>Cydia molesta</i> sono efficaci anche contro <i>Anarsia Lineatella</i>

Forficule (<i>Forficula auricularia</i>) - Osservata la presenza si ricorda che: - questo insetto tende a colpire i frutti che si approssimano alla maturazione. - le alte temperature ne limitano la mobilità, mentre i temporali estivi che tendono ad abbassare le temperature ne favoriscono la mobilità ed i potenziali danni.	In caso di forti attacchi intervenire con: Lambda cialotrina Verificare gli intervalli di sicurezza
Ragnetto rosso dei Fruttiferi e della Vite (<i>Panonychus ulmi</i>) - Segnalata la presenza di focolai Soglia d'intervento: 60% di foglie occupate	Al superamento della soglia intervenire con: Tebufenpirad Fenpiroximate Cyflumetofen Beauveria bassiana Verificare gli intervalli di sicurezza
Cimice asiatica (Halyomorpha halys): - Nelle trappole di monitoraggio proseguono le catture sia di adulti che di giovani, sempre con numeri bassi. - In frutteto si osserva la presenza sia di giovani che di adulti e dei relativi danni, con intensità variabile a seconda della zona, in particolare sulle varietà in raccolta o che si approssimano alla raccolta.	Il monitoraggio, <u>sia visivo che con trappole appropriate</u>, permette di individuare la presenza dell'insetto nei propri appezzamenti e le fasi di sviluppo dello stesso. Questo consente di stabilire il momento più opportuno per effettuare un eventuale trattamento insetticida. In caso di presenza di adulti e forme giovanili e di danni ai frutti effettuare un intervento con: Acetamiprid Etofenprox Deltametrina <u>Nel rispetto degli intervalli di sicurezza.</u>

ALTRE INFORMAZIONI

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
Grandine: Dopo una grandinata effettuare entro 24 ore dall'evento un intervento fungicida al fine di cicatrizzare le ferite.	I prodotti consigliati sono: Captano Propoli Verificare gli intervalli di sicurezza

Irrigazione Anche nel post-raccolta non trascurare l'irrigazione	Per i fabbisogni vedere i dati riportati nella tabella sotto indicata:								
<table border="1" data-bbox="359 353 1225 539"> <tr> <th data-bbox="359 353 683 427">Mese</th><th data-bbox="683 353 1225 427">Restituzione idrica giornaliera con interfilare inerbito (*) mm/giorno</th></tr> <tr> <td data-bbox="359 427 683 465"></td><td data-bbox="683 427 1225 465">Pesco</td></tr> <tr> <td data-bbox="359 465 683 504">Luglio</td><td data-bbox="683 465 1225 504">4,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="359 504 683 539">Luglio post-raccolta</td><td data-bbox="683 504 1225 539">2,4</td></tr> </table> Fabbisogno idrico giornaliero del pesco con interfilare inerbito * Quantitativo di acqua da restituire alla coltura in base al suo fabbisogno idrico.		Mese	Restituzione idrica giornaliera con interfilare inerbito (*) mm/giorno		Pesco	Luglio	4,0	Luglio post-raccolta	2,4
Mese	Restituzione idrica giornaliera con interfilare inerbito (*) mm/giorno								
	Pesco								
Luglio	4,0								
Luglio post-raccolta	2,4								

TRATTAMENTI CON FIORITURE PRESENTI

Si richiama il Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA che dispone che *"... nel periodo della fioritura delle colture agrarie ed ornamentali (dall'apertura del primo fiore fino a completa caduta petali) è fatto divieto di intervenire con trattamenti di difesa insetticidi ed acaricidi nonché con trattamenti per il controllo delle infestanti con l'utilizzo di erbicidi..."*.

Le uniche sostanze attive per le quali è ammesso l'utilizzo in fioritura sono quelle ad attività fungicida o batteriostatica che non riportano in etichetta specifica indicazione di pericolosità per le api e di pronubi in genere.

Si ricorda inoltre che, indipendentemente dalla fase fenologica della coltura, prima dell'effettuazione di ogni intervento con prodotti insetticidi, acaricidi e diserbanti o altri prodotti tossici per le api, è obbligatorio procedere con lo sfalcio delle erbe in fiore presenti nell'appezzamento oggetto di intervento, al fine di evitare danni a tutti gli insetti impollinatori presenti in campo.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI. PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni date con il presente bollettino consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, indicazioni operative sulle principali colture relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III D.lgs. 150/2012).

Le indicazioni fornite nei bollettini fanno riferimento alle diverse aree produttive della regione e non esauriscono le possibili situazioni di dettaglio, che vanno monitorate e valutate a livello aziendale.

Quando espressamente precisato, forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della difesa integrata volontaria (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e gli interventi agro-climatico-ambientali del Complemento di Sviluppo Rurale - CSR FVG). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti" del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia.

I Disciplinari di Produzione Integrata 2025 sono consultabili al seguente link:

<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2025/>

PAN: Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Il PAN prevede che per il controllo delle diverse avversità delle colture sia possibile l'utilizzo dei fitofarmaci. Questa possibilità è però condizionata al rispetto preventivo di alcune misure ed in particolare specifica che questi prodotti possano essere impiegati solo all'interno di strategie di difesa integrata (obbligatoria o volontaria) o di difesa biologica.

Uno dei punti fondamentali della difesa integrata prevede che l'operatore professionale possa utilizzare i prodotti fitosanitari solo quando necessario e cioè quando ci sono le condizioni per lo sviluppo dell'avversità e nel rispetto rigoroso **delle indicazioni riportate in etichetta**.

CANALE TELEGRAM:

La Cooperativa Agricola Fiumicello ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Per il pesco il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram pesco integrato

Per iscriverti clicca qui: <https://t.me/pescoperofvg>

Vi invitiamo a seguire anche gli altri nostri canali di comunicazione:

Mailing list della cooperativa: richiedete iscrizione a agrifium2007@gmail.com

Pagina Facebook: "Cooperativa Agricola Fiumicello"

Per ulteriori informazioni: Cooperativa Agricola Fiumicello **tel. 353 4802895**