



BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DEL PESCO n° 20 del 5 SETTEMBRE 2025

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Per il fine settimana ed anche per l'inizio della prossima sulla regione prevarranno condizioni anticicloniche che porteranno bel tempo con temperature ancora estive. Soltanto oggi un rapido fronte lambirà le Alpi determinando un temporaneo aumento dell'instabilità sui monti.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA

La tabella con le fasi fenologiche di Baggiolini è scaricabile al link:
<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/melo/fasi-fenologiche-pomacee-e-drupacee/Fenologia%20drupacee.pdf>

SPECIE	FASE FENOLOGICA (36 ^a settimana)	
	BAGGIOLINI	BBCH
Pesco	Maturazione di raccolta Sta terminando la raccolta delle varietà tardive	87

SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA

RILIEVI IN FRUTTETO	STRATEGIA
Cydia molesta Prosegue il volo con catture in ulteriore calo.	In questa fase non sono necessari trattamenti specifici.
Anarsia lineatella Coda di volo.	In questa fase non sono necessari trattamenti specifici.

Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>): • Trappole: in aumento le catture di adulti ed in calo quelle delle forme giovanili. • Frutteto: alla raccolta si sono osservati danni di entità variabile a seconda della zona ma in genere più limitati rispetto alla scorsa stagione.	La <u>razionalizzazione degli interventi</u> insetticidi consente di favorire la diffusione dei parassitoidi presenti nei frutteti e nel territorio, per questo motivo: • <u>Va evitato l'utilizzo di trattamenti insetticidi estintivi in post-raccolta</u> <u>È assolutamente VIETATO trattare le SIEPI.</u>
---	---

INTERVENTI DI DIFESA POST RACCOLTA

RILIEVI IN FRUTTETO	STRATEGIA
Infezioni fungine/batteriosi: • In diversi impianti si sono osservati sintomi riferibili a infezioni fungine e batteriosi a carico delle foglie e in parte anche dei frutti del pesco.	Al fine di ridurre l'inoculo di batteri e funghi patogeni per la stagione successiva è opportuno eseguire trattamenti con • prodotti rameici con dosi crescenti di rame metallo, nelle seguenti fasi: • inizio caduta foglie • metà caduta foglie • fine caduta foglie

CONCIMAZIONE POST RACCOLTA

A fine estate, nel periodo compreso tra post raccolta e inizio caduta foglie, per sfruttare il secondo picco di assorbimento radicale è consigliabile eseguire una concimazione con macroelementi (N, P, K) favorendo così l'accumulo di riserve che saranno mobilizzate all'inizio della stagione vegetativa successiva. In questa fase si consiglia di distribuire circa 1/3 del fabbisogno complessivo di N, P, K.

Di seguito sono presentate le schede a dose standard (N, P, K) delle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata per il pesco.

I valori indicati si riferiscono ai quantitativi da utilizzare nell'arco di un'annata agraria in funzione del range di produzione previsto.

PESCO

Scheda a dose standard di fertilizzazione

CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni:	Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 20-30 t/ha: DOSE STANDARD: 100 kg/ha di N;	Note incrementi Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di: 50 kg/ha:
☐ ☐ 35 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 20 t/ha; ☐ ☐ 20 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica; ☐ ☐ 20 kg: nel caso di apporto di ammendante nell'anno precedente; ☐ ☐ 20 kg: in caso di eccessiva attività vegetativa.		☐ ☐ 35 kg: se si prevedono produzioni superiori a 30 t/ha; ☐ ☐ 20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica; ☐ ☐ 20 kg: in caso di scarsa attività vegetativa; ☐ ☐ 15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo ottobre-febbraio). ☐ ☐ 20 kg: in caso di cultivar medio-tardive e tardive.
Concimazione Azoto in allevamento: 1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.		

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-) alla dose standard:	Apporto di P2O5 standard in situazione normale per una produzione di: 20-30 t/ha: DOSE STANDARD	Note incrementi Quantitativo di P2O5 che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:
☐ ☐ 15 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 17 t/ha.	☐ ☐ 40 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; ☐ ☐ 60 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; ☐ ☐ 100 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsissima; ☐ ☐ 20 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ ☐ 15 kg: se si prevedono produzioni superiori a 32 t/ha; ☐ ☐ 10 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica; ☐ ☐ 20 kg: in caso di terreni ad elevato tenore di calcare attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.		

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi Quantitativo di K2O da sottrarre (-) alla dose standard:	Apporto di K2O standard in situazione normale per una produzione di: 20-30 t/ha: DOSE STANDARD	Note incrementi Quantitativo di K2O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:
☐ ☐ 40 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 17 t/ha; ☐ ☐ 30 kg: con apporto di ammendanti.	☐ ☐ 90 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; ☐ ☐ 120 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; ☐ ☐ 50 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ ☐ 40 kg: se si prevedono produzioni superiori a 32 t/ha.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.		

DISERBO AUTUNNALE

In questa fase nelle piante vi è un attivo flusso linfatico dalle parti verdi ai siti di stoccaggio degli elaborati (radici). Ne consegue che impiegando erbicidi sistemici (es. glifosate) in autunno con applicazioni a dosi ridotte si ottiene la più alta efficacia nei confronti di alcune specie infestanti (es. vilucchio, malva, gramigna) con vantaggi apprezzabili l'anno seguente. È però uno dei periodi più rischiosi per le piante da frutto. Prima del diserbo è quindi indispensabile procedere al taglio dei polloni radicali e delle branche troppo basse per evitare l'assorbimento del prodotto ed il conseguente manifestarsi di deperimento della pianta nella primavera successiva.

Per le s.a. ammesse e le modalità di utilizzo consultare quanto previsto dal DPI al seguente link:

http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2025/fvg-diserbo-2025/diserbo-frutticole-2025/Drupacee_25_V2.pdf

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI. PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni date con il presente bollettino consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, indicazioni operative sulle principali colture relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III D.lgs. 150/2012).

Le indicazioni fornite nei bollettini fanno riferimento alle diverse aree produttive della regione e non esauriscono le possibili situazioni di dettaglio, che vanno monitorate e valutate a livello aziendale.

Quando espressamente precisato, forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della difesa integrata volontaria (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e gli interventi agro-climatico-ambientali del Complemento di Sviluppo Rurale - CSR FVG). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti" del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia.

I Disciplinari di Produzione Integrata 2025 sono consultabili al seguente link:

<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2025/>

PAN: Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Il PAN prevede che per il controllo delle diverse avversità delle colture sia possibile l'utilizzo dei fitofarmaci. Questa possibilità è però condizionata al rispetto preventivo di alcune misure ed in particolare specifica che questi prodotti possano essere impiegati solo all'interno di strategie di difesa integrata (obbligatoria o volontaria) o di difesa biologica.

Uno dei punti fondamentali della difesa integrata prevede che l'operatore professionale possa utilizzare i prodotti fitosanitari solo quando necessario e cioè quando ci sono le condizioni per lo sviluppo dell'avversità e nel rispetto rigoroso **delle indicazioni riportate in etichetta**.

CANALE TELEGRAM:

La Cooperativa Agricola Fiumicello ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Per il pesco il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram pesco integrato
Per iscriverti clicca qui: <https://t.me/pescoperofvg>

Vi invitiamo a seguire anche gli altri nostri canali di comunicazione:

Mailing list della cooperativa: richiedete iscrizione a agrifium2007@gmail.com

Pagina Facebook: "Cooperativa Agricola Fiumicello"

Per ulteriori informazioni: Cooperativa Agricola Fiumicello **tel. 353 4802895**

I tecnici che hanno effettuato le attività di monitoraggio settimanale dei frutteti per raccogliere i dati (catture insetti, situazione fitosanitaria, ecc.), e la stesura del bollettino di difesa integrata del pesco ringraziano la Cooperativa Agricola Fiumicello e i frutticoltori per la preziosa collaborazione

Questo è l'ultimo bollettino di difesa integrata del pero per la stagione 2025.