

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI PRODUZIONE INTEGRATA MELO
N° 21 del 27 giugno 2025**

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni date con il presente bollettino consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, indicazioni operative sulle principali colture relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III D.lgs. 150/2012).

Le indicazioni fornite nei bollettini fanno riferimento alle diverse aree produttive della regione e non esauriscono le possibili situazioni di dettaglio, che vanno monitorate e valutate a livello aziendale.

I bollettini forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della difesa integrata volontaria (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI - Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e gli interventi agro-climatico-ambientali del Complemento di Sviluppo Rurale - CSR FVG) e sono coerenti con le indicazioni contenute nel Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia.

I Disciplinari di Produzione Integrata 2025 sono consultabili al seguente link:

<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2025/>

Al seguente link è possibile consultare l'aggiornamento del disciplinare (parte difesa e controllo delle infestanti) relativo alla finestra di aprile 2025:

<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2025/DDS%20n.%20199%20del%2016.04.2025.pdf/view>

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIEGO DI PRODOTTI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA FITOSANITARIA E DEROGA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA

Nel caso di autorizzazioni all'impiego di prodotti ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, art. 53, per situazioni di emergenza fitosanitaria, non è necessario un provvedimento di deroga al disciplinare nei casi in cui l'autorizzazione riguardi estensioni di impiego di sostanze attive già previste nelle Linee Tecniche di difesa per altre colture o impieghi. In questi casi, come regola consolidata a livello nazionale, non è necessario aggiornare la lista delle sostanze attive presenti nelle schede di difesa delle relative colture per le quali il prodotto è stato autorizzato. La deroga deve essere invece approvata nei casi in cui l'autorizzazione per situazioni di emergenza fitosanitaria riguardi: sostanze attive candidate alla sostituzione; sostanze attive revocate dall'UE; s.a. pericolose per le acque presenti nell'elenco delle tabelle 1/A e 1/B, Allegato I D.Lgs. 152/06; s.a. non ancora autorizzate; sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene, Teratogene - CMR.

CAPTANO: il Comunicato del Ministero della Salute del 29/10/2024 proroga il periodo di validità delle autorizzazioni per l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la s.a. Captano (ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2186 della Commissione che ne rinnova l'approvazione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 della Commissione), fino al 31/10/2039.

Questa proroga è condizionata da disposizioni attuative immediate per i titolari delle Imprese titolari delle autorizzazioni che hanno comportato l'adeguamento delle etichette alle nuove prescrizioni previste. **Pertanto, dal 01/02/2025 sono entrate in vigore le nuove etichette.**

I lotti dei prodotti autorizzati fabbricati fino al 31 gennaio 2025 potranno essere commercializzati sino al 30 aprile 2025 ed impiegati dagli utilizzatori finali fino al 31 ottobre 2025.

ACETAMIPRID: Con Decreto Dirigenziale del 19 febbraio 2025 è stata autorizzata la modifica delle etichette dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Acetamiprid al fine di rispettare i nuovi Limiti Massimi di Residui (LMR) previsti dal Reg. (UE) 2025/158 che, sebbene in vigore dal 19 febbraio 2025, saranno applicabili a decorrere dal 19 agosto 2025, data oltre la quale tutti i prodotti freschi e trasformati dovranno essere adeguati ai nuovi valori.

MEPTYLDINOCAP: con Comunicato del Ministero della Salute del 07/03/2025 sono stati revocati i prodotti fitosanitari contenenti tale s.a. con decorrenza 01/04/2025. La vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati è consentita fino al 30 settembre 2025, mentre l'impiego da parte degli utilizzatori finali è consentito fino al 30 settembre 2026.

CLOSER (S.A. SULFOXAFLOL): AUTORIZZAZIONE PER SITUAZIONE DI EMERGENZA

L'utilizzo per situazione di emergenza fitosanitaria del prodotto **Closer (s.a. SulfoxafloL)** è autorizzato per **l'impiego su melo dal 9 aprile 2025 al 6 agosto 2025** (Decreto Ministero della Salute del 9 aprile 2025).

Al fine di ridurre il rischio per api e pronubi selvatici, si segnala l'importanza di prestare la massima attenzione alle prescrizioni supplementari (in particolare la fascia di rispetto quale misura di mitigazione a bordo campo) e alle avvertenze presenti in etichetta relativamente a modalità e i tempi per l'applicazione dell'insetticida.

Per maggiori informazioni consultare i seguenti link:
https://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderFitoPdf?codleg=105494&anno=2025&parte=1>

SITUAZIONE METEOROLOGICA

L'anticiclone nord-africano si spinge verso nord, oltre le Alpi e fino all'Europa Centrale. La massa d'aria in quota è eccezionalmente calda, così che lo zero termico tra sabato e domenica salirà fino a circa 5500 m di quota, determinando stabilità e stabilendo un record per la regione.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito: www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersa al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA

Prosegue l'ingrossamento dei frutti.

La tabella completa con le fasi fenologiche di Fleckinger e BBCH è scaricabile al link: <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/melo/fasi-fenologiche-pomacee-e-drupacee/Fasi%20fenologiche.pdf>

SITUAZIONE FITOSANITARIA dei MELETI E STRATEGIE DI DIFESA

RILIEVI IN FRUTTETO	STRATEGIA
PATOGENI e FITOPLASMI	
Ticchiolatura • Fase fenologica recettiva per le possibili infezioni secondarie (a seguito anche delle irrigazioni soprachioma). • Consultare il modello RIMpro per verificare l'evoluzione dello sviluppo delle infezioni secondarie: http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrataobbligatoria/modelli-previsionali-emonitoraggio/melo/modellorimpro/rimpro/	Per le tempistiche di intervento in funzione dello stato fitosanitario del meleto consultare il precedente bollettino. Le sostanze attive impiegabili in questa fase ed in funzione degli intervalli di sicurezza sono: • Fluazinam (azione anche contro alternaria) • Captano (ad esclusione delle Red delicious in questa fase fenologica). • Dithianon • Dodina Per valutare eventuale dilavamento dei PF provocati dalle precipitazioni degli ultimi giorni, consultare il link: http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo
Alternaria e altri funghi patogeni secondari (Colletotrichum, Phoma, fumaggini, patina bianca ecc.) Da fine maggio si è cominciata ad osservare, in alcuni impianti, la presenza di foglie con macchie necrotiche. Tre campioni di foglie sono risultati positivi a Colletotrichum acutatum complex (<i>C. fiorinae</i> e <i>C. nymphaeae</i>). Tra gli ulteriori campioni di foglie prelevate la scorsa settimana solo alcuni sono risultati positivi ad Alternaria e Phoma. Parecchie analisi hanno avuto risultato negativo. Le condizioni meteorologiche, innalzamento delle temperature e prolungate bagnature fogliari (anche	• <u>Gestione agronomica:</u> per cercare di ridurre la diffusione di questi patogeni è opportuno adottare tecniche di gestione delle piante (es. potatura verde, evitando di lasciare i residui di potatura in pianta) che favoriscano l'arieggiamento della chioma per ridurre le ore di bagnatura fogliare. Anche un regolare sfalcio dell'interfila (anche a filari alterni per il rispetto del DPI) contribuisce ad abbassare il livello di umidità nell'impianto. Infine, qualora sia possibile, è opportuno

da irrigazioni per aspersione), possono essere favorevoli allo sviluppo di *Alternaria* e altri funghi secondari.

Nelle ultime due annate in questa regione, come anche in altri areali melicoli del nord Italia, il complesso dei funghi *Colletotrichum* spp. è risultato particolarmente aggressivo su alcune varietà (Gala, Golden Delicious, Pink Lady, Fuji, Inored Story). Le infezioni possono provocare danni all'apparato fogliare e anche alle mele.

Queste sintomatologie lo scorso anno sono state attribuite, a seguito di analisi di laboratorio, sia a Glomerella Leaf Spot (GLS) che Apple Bitter Rot (ABR) i cui agenti causali appartenevano a due complessi di funghi: gloesporoides complex (*Colletotrichum chrysophilum*) e acutatum complex (*Colletotrichum fioriniae*).

In questa stagione il Gruppo di lavoro nazionale continuerà le attività di studio in diverse regioni del nord Italia, compreso il Friuli Venezia Giulia, per acquisire maggiori conoscenze sia sulla biologia di questi complessi di funghi che per una ottimale gestione in frutteto.

“spezzare” i turni di irrigazione per aspersione in modo da favorire una rapida asciugatura della chioma. Anche chi irriga con la goccia deve prestare attenzione a non adottare turni irrigui troppo lunghi per limitare l'eccessiva umidità nell'impianto.

- Difesa chimica:

In questa fase della stagione si consiglia di alternare sostanze attive per il controllo di ticchiolatura sfruttando l'azione collaterale nei confronti di questi funghi. Dalle esperienze sperimentali della scorsa stagione, effettuate in diversi areali del nord Italia, compreso il Friuli Venezia Giulia, le sostanze attive risultate più efficaci sono:

- **Dithianon**
- **Captano** (non registrato per *Alternaria*)
- **Fluazinam**
- **Dodina**

che possono essere utilizzate in miscela con **Fosfonato di potassio**.

Prestare attenzione agli intervalli di sicurezza delle sostanze attive e alle limitazioni presenti in etichetta e nel Disciplinare di produzione integrata.

Un particolare accorgimento da tenere in considerazione riguarda il posizionamento dei trattamenti con prodotti di copertura che vanno eseguiti prima di eventi piovosi o di irrigazioni sopra chioma per cercare di prevenire l'insorgenza di queste patologie.

L'accurato **monitoraggio** dei propri meleti consente di verificare l'eventuale presenza di sintomi ascrivibili ad infezioni causate da *Colletotrichum* sp. I sintomi potrebbero

	essere confusi con altre patologie e per tale ragione può essere utile la segnalazione ai tecnici del Servizio fitosanitario dell'ERSA per un approfondimento, soprattutto in caso di situazioni di filloptosi anomale che iniziano dalla parte bassa della pianta.
Nectria	In caso di presenza di rametti con sintomi, procedere con l'asportazione dall'impianto.

FITOFAGI	
AFIDI Nonostante la parassitizzazione in corso di <i>Aphelinus mali</i> , questa settimana si nota un incremento delle colonie	In caso di scarsa presenza del parassitoide, sono utili i lavaggi con Sali di potassio degli acidi grassi per ridurre la lanugine delle colonie e favorire l'insediamento dell' <i>Aphelinus mali</i> . In caso di assenza del parassitoide intervenire con Pirimicarb , curando bene la bagnatura, compreso il colletto.
Eulia (<i>Argyrotaenia ljugiana</i>) Prosegue il volo con catture limitate.	non sono necessari trattamenti specifici in questa fase.
Cidia del pesco (<i>Cydia molesta</i>) Catture in aumento.	Trattamenti contro carpocapsa agiscono anche per il controllo di questo fitofago.
Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) Le catture di questa settimana confermano che ci troviamo tra il primo e il secondo volo. Verificare durante le operazioni di diradamento manuale la presenza di frutticini con fori per impostare adeguata difesa nei confronti del secondo volo. Soglia di intervento: 1 cattura/trappola a settimana per 2 settimane	Al superamento della soglia (catture/trappola/settimana) programmare un intervento con spinosad o emamectina benzoato .

consecutive o 2 catture/trappola/settimana. È possibile consultare le previsioni di sviluppo fenologico dell'insetto (voli, accoppiamenti e ovideposizioni) selezionando la zona d'interesse al seguente link: http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/modelli-previsionali-e-monitoraggio/melo/modello-rimpro	
Litocollete Volo in forte diminuzione. Soglia di intervento: 2 mine con larve vive per foglia giustificano il trattamento sulla generazione successiva.	Trattamenti specifici in questa fase possono essere programmati con spinosad se nella prima generazione è stata superata la soglia di intervento.
Cemiostoma Assenza di volo, in qualche caso sono state osservate mine su foglia. Soglia di intervento dalla seconda generazione: - 10 mine con larve vive/100 foglie	In caso superamento della soglia di intervento intervenire con spinosad
Archips podanus e Pandemis heparana Assenza di volo.	In questa fase non sono necessari trattamenti specifici.
Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>) Le catture di giovani nelle trappole stanno notevolmente aumentando. Presenza limitata di cimici nei meleti. Si continuano ad osservare danni su diverse varietà.	• Effettuare accuratamente monitoraggi visivi a partire dai filari di bordo. • Mantenere chiuse le reti anti insetto. • Trattamenti specifici con acetamiprid possono essere programmati da questa fase in funzione della presenza di forme giovanili all'interno dei meleti. <u>Prestare attenzione ai nuovi dosaggi e limitazioni indicate in etichetta dei formulati contenenti questa sostanza attiva.</u>

ALTRI INTERVENTI	
Prevenzione della butteratura amara.	Trattamenti con concimi fogliari contenenti calcio nelle ore più fresche della giornata.
Prevenzione filloptosi	Per la prevenzione di questa fisiopatia sono indicate concimazioni fogliari a base di Mg e Mn . Mantenere l'apparato fogliare il più integro possibile contribuisce a limitare l'insediamento di funghi secondari.
Irrigazione	Fabbisogno idrico in giugno: 5,1 mm/giorno (interfilare inerbito) e 4,0 mm/giorno (interfilare lavorato). Fabbisogno idrico in luglio: 4,2 mm/giorno (interfilare inerbito) e 3,1 mm/giorno (interfilare lavorato). Prestare molta attenzione a limitare le bagnature prolungate della vegetazione e cercare di evitare turni irrigui troppo lunghi, anche in presenza di irrigazione a goccia, per limitare l'eccessiva umidità nell'impianto e ridurre fattori predisponenti alle infezioni dei funghi secondari.
Grandine Dopo una grandinata effettuare entro 24 ore dall'evento un intervento fungicida al fine di cicatrizzare le ferite. Questi trattamenti non incidono sul numero massimo di interventi previsti dal DPI e deve essere rispettato il numero massimo di interventi previsti dalle etichette.	All'occorrenza intervenire con Ditianon oppure Captano prestando attenzione all'intervallo di sicurezza.

PRIMA DELL'UTILIZZO SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.


TRATTAMENTI CON FIORITURE PRESENTI

Si richiama il Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA che dispone che "... *nel periodo della fioritura delle colture agrarie ed ornamentali (dall'apertura del primo fiore fino a completa caduta petali) è fatto divieto di intervenire con trattamenti di difesa insetticidi ed acaricidi nonché con trattamenti per il controllo delle infestanti con l'utilizzo di erbicidi...*").

Le uniche sostanze attive per le quali è ammesso l'utilizzo in fioritura sono quelle ad attività fungicida o batteriostatica che non riportano in etichetta specifica indicazione di pericolosità per le api e di pronubi in genere. Si ricorda inoltre che, indipendentemente dalla fase fenologica della coltura, prima dell'effettuazione di ogni intervento con prodotti insetticidi, acaricidi e diserbanti o altri prodotti tossici per le api, è obbligatorio procedere con lo sfalcio delle erbe in fiore presenti nell'appezzamento oggetto di intervento, al fine di evitare danni a tutti gli insetti impollinatori presenti in campo.

CANALE TELEGRAM:

ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Per il **melo** il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram ERSa FVG Bollettini melo integrato

Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_melo_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili sulla home page del sito ERSa
www.ersa.fvg.it