



BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DEL PERO n° 13 del 30 MAGGIO 2025

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Un anticiclone interessa gran parte dell'Europa occidentale e da oggi a domenica porterà aria più calda e secca in quota anche sulla nostra regione. Il tempo sarà perciò, in genere, più stabile e caldo dei giorni scorsi.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersa al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA (Fleckinger e BBCH)

Per descrivere le fasi di sviluppo fenologico del pero, viene utilizzata la scala di Fleckinger e quella BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and Chemical industry).



| Fase fenologica | Fleckinger | BBCH |
|--------------------------|------------|-------|
| Accrescimento frutticini | J | 74-79 |

Attualmente (22^a settimana) continua la fase di ingrossamento dei frutticini, per tutte le varietà è stata superata la fase di frutto noce (diametro > 30 mm).

| VARIETÀ | FASE FENOLOGICA (22 ^a settimana) | |
|------------|---|-------|
| | Fleckinger | BBCH |
| William | J (accrescimento frutticini) | 74-79 |
| Abate | J (accrescimento frutticini) | 74-79 |
| Conference | J (accrescimento frutticini) | 74-79 |
| Carmen | J (accrescimento frutticini) | 74-79 |

REVOCA PRODOTTI FITOSANITARI

Come da Comunicato del Ministero della Salute, reperibile al link <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderFitoPdf?codleg=86822&anno=2022&parte=1> le seguenti sostanze attive sono state revocate:

- **Spirotetramat:** i prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza attiva sono stati revocati dal **30 aprile 2024**; la commercializzazione era consentita fino al **30 ottobre 2024**; l'impiego da parte degli utilizzatori finali è consentito non oltre il **30 ottobre 2025**.
- **Spinetoram:** i prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza attiva sono stati revocati dal **30 giugno 2024**; la commercializzazione era consentita fino al **30 dicembre 2024**; l'impiego da parte degli utilizzatori finali è consentito non oltre il **30 dicembre 2025**
- **Acibenzolar-S-methyl:** i prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza attiva sono stati revocati dal **10 luglio 2024**; la commercializzazione era consentita fino al **10 gennaio 2025**; l'impiego da parte degli utilizzatori finali è consentito non oltre il **10 luglio 2025**. Come da Comunicato del Ministero della Salute, reperibile al link: file:///C:/Users/user/Downloads/161_Comunicato-di-revo-ca-dei-prodotti-fitosanitari-contenenti-la-sostanza-attiva-Acibenzolar-S-Methyl_2025-04-02_16-54-18.pdf

ADEGUAMENTO ETICHETTE CAPTANO E ACETAMIPRID

- Si ricorda che dal 1° febbraio 2025 è entrato in vigore un adeguamento dell'etichetta dei prodotti contenenti la sostanza attiva **captano**. I lotti dei prodotti autorizzati fabbricati fino al **31 gennaio 2025** potranno essere commercializzati sino al **30 aprile 2025** e impiegati sino al **31 ottobre 2025**.
- Con Decreto Dirigenziale del 19 febbraio 2025 è stata autorizzata la modifica dell'etichetta ministeriale di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **Acetamiprid**, nel rispetto dei nuovi LMR previsti dal Reg. (UE) 2025/158, come verificabile al seguente link:

https://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet

CLOSER (S.A. SULFOXAFLO): AUTORIZZAZIONE PER SITUAZIONE DI EMERGENZA

L'utilizzo per situazione di emergenza fitosanitaria del prodotto Closer (s.a.Sulfoxaflor) è autorizzato per l'impiego su pero dal 9 aprile 2025 al 6 agosto 2025 (Decreto Ministero della Salute del 9 aprile 2025).

Al fine di ridurre il rischio per api e pronubi selvatici, si segnala l'importanza di prestare la massima attenzione alle prescrizioni supplementari (in particolare la fascia di rispetto quale misura di mitigazione a bordo campo) e alle avvertenze presenti in etichetta relativamente a modalità e i tempi per l'applicazione dell'insetticida.

AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIEGO DI PRODOTTI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA FITOSANITARIA E DEROGA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA

Nel caso di autorizzazioni all'impiego di prodotti ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, art. 53, per situazioni di emergenza fitosanitaria, non è necessario un provvedimento di deroga al disciplinare nei casi in cui l'autorizzazione riguardi estensioni di impiego di sostanze attive già previste nelle Linee Tecniche di difesa per altre colture o impieghi. In questi casi, come regola consolidata a livello nazionale, non è necessario aggiornare la lista delle sostanze attive presenti nelle schede di difesa delle relative colture per le quali il prodotto è stato autorizzato. La deroga deve essere invece approvata nei casi in cui l'autorizzazione per situazioni di emergenza fitosanitaria riguardi: sostanze attive candidate alla sostituzione; sostanze attive revocate dall'UE; s.a. pericolose per le acque presenti nell'elenco delle tabelle 1/A e 1/B, Allegato I D.Lgs. 152/06; s.a. non ancora autorizzate; sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene, Teratogene - CMR.

SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA

| RILIEVI IN FRUTTETO | STRATEGIA |
|--|---|
| <p>Colpo di fuoco batterico</p> <ul style="list-style-type: none"> Rilevato un caso di colpo di fuoco batterico in un'azienda monitorata. Prestare molta attenzione monitorando attentamente i propri appezzamenti. Condizioni favorevoli dovute alle piogge ripetute ed alle prolungate bagnature fogliari. | <ul style="list-style-type: none"> Monitorare soprattutto i giovani impianti (più suscettibili) e i pereti colpiti negli anni scorsi. In previsione di pioggia si consiglia di intervenire preventivamente con: <ul style="list-style-type: none"> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Aureobasidium pullulans</i> Acibenzolar – S – metile (prodotto revocato utilizzabile fino al 10/07/2025) In presenza di eventi grandinigeni si consiglia di intervenire entro le 24 ore |
| <p>Ticchiolatura/maculatura bruna</p> <ul style="list-style-type: none"> Vegetazione recettiva. Condizioni climatiche favorevoli a entrambi i patogeni In alcuni impianti si osservano sintomi di ticchiolatura su foglie e frutti. In queste condizioni, vi è un forte rischio di infezioni secondarie. Per <i>Stemphylium vesicarium</i> rischio infettivo alto a causa delle bagnature frequenti e prolungate. | <p>Mantenere la copertura prima degli eventi piovosi con:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fluazinam Ditianon Captano Ziram <p>In alternativa è possibile intervenire con:</p> <ul style="list-style-type: none"> SDHI Fluxapyroxad; Fluopyram con l'aggiunta di una s.a. con diverso meccanismo d'azione (se non già presente nel formulato). <p>L'efficacia dei trattamenti può essere migliorata aggiungendo in miscela alle sostanze attive di copertura fosfonato di potassio (non miscelare con rame, polisolfuro di calcio e boro).</p> |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Rilevati i primi lievi sintomi su foglia delle varietà sensibili (Conference e Abate) | |
| <p>Cydia molesta</p> <ul style="list-style-type: none"> L' aumento delle catture nella bassa pianura sta ad indicare la partenza del secondo volo. | <p>I trattamenti consigliati contro Carpocapsa con Chlorantraniliprole oppure con Spinetoram controllano anche la cydia molesta.</p> |
| <p>Eulia</p> <ul style="list-style-type: none"> Assenza di catture. Non è ancora iniziato il secondo volo | <p>In questa fase non sono necessari trattamenti specifici</p> |
| <p>Carpocapsa (Cydia pomonella): Anche questa settimana non sono state rilevate catture. Il volo è stato probabilmente disturbato dalle avverse condizioni meteorologiche dell'ultimo periodo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il modello RIMpro segnala che nella medio-bassa pianura proseguono le ovideposizioni e le nascite larvali. | <p>Affettarsi ad effettuare il secondo intervento con Chlorantraniliprole **.</p> <p>In alternativa è possibile effettuare un trattamento ad azione larvicida con una delle seguenti s.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Virus della granulosi Spinetoram * (efficacie anche nei confronti delle neanidi di psilla e delle larve di <i>Cydia molesta</i>) <p>*(Prodotto revocato utilizzabile fino al 30/10/2025. Non ammesso in pre fioritura). ** efficace anche nei confronti di <i>Cydia molesta</i></p> |
| <p>Cacecia dei fruttiferi (Archips podanus)</p> <ul style="list-style-type: none"> Si continuano a rilevare sporadiche catture | <p>In questa fase non sono necessari trattamenti specifici</p> |
| <p>Psilla</p> <ul style="list-style-type: none"> Si rileva la presenza di adulti, uova bianche e gialle e di neanidi <p>Soglia d'intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> Prevalente presenza di uova gialle | <p>Al superamento della soglia intervenire con:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spirotetramat (Prodotto revocato utilizzabile fino al 30/10/2025. Non ammesso in pre fioritura). <p>Per le aziende che intendono effettuare i lanci con antocoridi contattare i tecnici di riferimento</p> |
| <p>Cimice asiatica (Halyomorpha halys):</p> <ul style="list-style-type: none"> Limitate catture di adulti nelle trappole per il monitoraggio. Non si | <p>Effettuare monitoraggi visivi a partire dai filari di bordo.</p> <p>Si ricorda che il caolino e la zeolite hanno dimostrato di avere un effetto repellente nei confronti di <i>H. halys</i>, contribuendo ad</p> |

| | |
|--|--|
| <p>rilevano ancora catture di forme giovanili.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In aumento la presenza di adulti all'interno dei frutteti. • Segnalata la presenza di ovature su pesco, ciliegio, nocciolo e piante ornamentali. | <p>allontanare o sfavorire la presenza di cimici dagli impianti.</p> <p>Per le aziende che intendono effettuare i lanci con Anastatus bifasciatus contattare i tecnici di riferimento</p> <p>Se si rendesse necessario intervenire, in questa fase trattare con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acetamiprid (efficace nei confronti delle forme giovanili di <i>H. halys</i>) |
|--|--|

È possibile consultare i dati delle catture degli insetti dannosi, registrate nei siti di monitoraggio, al link:

<https://agrics.regione.fvg.it/agricsweb/fito>

ALTRE INFORMAZIONI

| TIPOLOGIA | DESCRIZIONE |
|---|--|
| <p>Grandine:</p> <p>Dopo una grandinata, effettuare entro 24 ore dall'evento un intervento fungicida al fine di cicatrizzare le ferite. Questi trattamenti non incidono sul numero massimo di interventi ammessi con le s.a. consigliate previsti dal DPI. Vanno comunque rispettati i vincoli di etichetta relativi al numero massimo complessivo di interventi eseguiti e all'intervallo tra gli stessi.</p> | <p>I prodotti consigliati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Captano • Dithianon |

TRATTAMENTI CON FIORITURE PRESENTI

Si richiama il Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA che dispone che "... nel periodo della fioritura delle colture agrarie ed ornamentali (dall'apertura del primo fiore fino a completa caduta petali) è fatto divieto di intervenire con trattamenti di difesa insetticidi ed acaricidi nonché con trattamenti per il controllo delle infestanti con l'utilizzo di erbicidi...".

Le uniche sostanze attive per le quali è ammesso l'utilizzo in fioritura sono quelle ad attività fungicida o batteriostatica che non riportano in etichetta specifica indicazione di pericolosità per le api e di pronubi in genere.

Si ricorda inoltre che, indipendentemente dalla fase fenologica della coltura, prima dell'effettuazione di ogni intervento con prodotti insetticidi, acaricidi e diserbanti o altri prodotti tossici per le api, è obbligatorio procedere con lo sfalcio delle erbe in fiore presenti nell'appezzamento oggetto di intervento, al fine di evitare danni a tutti gli insetti impollinatori presenti in campo.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI. PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni date con il presente bollettino consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, indicazioni operative sulle principali colture relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III D.lgs. 150/2012).

Le indicazioni fornite nei bollettini fanno riferimento alle diverse aree produttive della regione e non esauriscono le possibili situazioni di dettaglio, che vanno monitorate e valutate a livello aziendale.

Quando espressamente precisato, forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della difesa integrata volontaria (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e gli interventi agro-climatico-ambientali del Complemento di Sviluppo Rurale - CSR FVG). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti" del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia.

I Disciplinari di Produzione Integrata 2025 sono consultabili al seguente link:

<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2025/>

PAN: Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari


Il PAN prevede che per il controllo delle diverse avversità delle colture sia possibile l'utilizzo dei fitofarmaci. Questa possibilità è però condizionata al rispetto preventivo di alcune misure ed in particolare specifica che questi prodotti possano essere impiegati solo all'interno di strategie di difesa integrata (obbligatoria o volontaria) o di difesa biologica.

Uno dei punti fondamentali della difesa integrata prevede che l'operatore professionale possa utilizzare i prodotti fitosanitari solo quando necessario e cioè quando ci sono le condizioni per lo sviluppo dell'avversità e nel rispetto rigoroso **delle indicazioni riportate in etichetta**.

CANALE TELEGRAM:

La Cooperativa Agricola Fiumicello ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su

PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Per il pero il canale dedicato è il seguente:



Vi invitiamo a seguire anche gli altri nostri canali di comunicazione:

Mailing list della cooperativa: richiedete iscrizione a agrifium2007@gmail.com

Pagina Facebook: "Cooperativa Agricola Fiumicello"

Per ulteriori informazioni: Cooperativa Agricola Fiumicello **tel. 353 4802895**