

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO
SERVIZIO RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

AVVERTIMENTO DIFESA OLIVO n° 1 del 27 aprile 2013

INFORMAZIONI GENERALI





Il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Friuli Venezia Giulia da applicarsi nell'annata agraria 2012-2013 ha ottenuto i pareri di conformità dei gruppi tecnici "Difesa" e "Tecnica agronomica" operanti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nel corso delle prossime settimane il Disciplinare sarà anche approvato con delibera della Giunta Regionale e successivamente pubblicato sul sito dell' ERSA.

SITUAZIONE CLIMATICA

L'andamento climatico di fine inverno - inizio primavera è stato caratterizzato da intensa piovosità e alta umidità, in particolare nel mese di marzo, e temperature medie inferiori ai valori stagionali dalla 2° decade di marzo alla 1° decade di aprile.

Le temperature medie mensili hanno superato le medie stagionali con la 2° decade di aprile per poi con la 3° decade riportarsi verso valori normali.

Le previsioni meteorologiche sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>



SITUAZIONE FENOLOGICA



L'andamento climatico di fine inverno – inizio primavera umido-piovoso con temperature medie inferiori alle medie stagionali ha condizionato lo sviluppo fenologico nei comprensori ritardando lo sviluppo vegetativo delle piante.

A seguito degli incrementi delle temperature del mese di aprile, le fasi fenologiche rilevate attualmente si manifestano prevalentemente nelle sub-fasi di accrescimento dei germogli apicali-laterali e di inizio-mignolatura, in relazione alle specifiche condizioni climatiche delle diverse zone e della composizione varietale degli impianti.

Non si sono riscontrate notevoli differenze degli stadi di sviluppo fenologico tra le diverse varietà.

DIFESA CRITTOGAME

Le condizioni climatiche dell'autunno – inverno e dell'inizio primavera, particolarmente piovose e umide, hanno contribuito al mantenimento dell'inoculo di determinate patologie fungine che possono riprendere a svilupparsi in condizioni microclimatiche favorevoli e sulle varietà suscettibili.

In particolare è stata segnalata la presenza di patologie fungine in determinate località alla base dei pendii e/o nelle zone ove si verificano ristagni di aria umida soprattutto se non sono stati effettuati i trattamenti anticrittogamici di fine autunno.

Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*)

Le infezioni fungine maggiormente segnalate sono quelle dell'Occhio di pavone che hanno causato defogliazioni più o meno consistenti nelle zone notoriamente favorevoli al patogeno e sulle varietà suscettibili alla malattia (es. Bianchera).



Piombatura (*Pseudocercospora cladosporioides*)

In molte varietà sono stati riscontrati ingiallimenti e defogliazioni provocate da infezioni del fungo *Pseudocercospora cladosporioides* (Piombatura).

Considerata la biologia del fungo che manifesta picchi d'infezione da giugno-luglio a fine agosto, sfasati rispetto a quelli dell'Occhio di pavone, è probabile che le infezioni risalgano all'annata precedente.



Difesa

Nel caso di infezioni fungine accertate di Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*) si consiglia un intervento urgente con sali di rame o con dodina soprattutto nelle zone notoriamente favorevoli al patogeno e sulle varietà suscettibili alla malattia (es. Bianchera).

Nella maggior parte dei casi di infezioni di Piombatura (*Pseudocercospora cladosporioides*) il trattamento con Sali di rame può essere sufficiente a contenere la malattia quando la pressione delle infezioni risultano medio-basse. Negli eventuali casi di alta pressione della malattia, con successivi danni evidenti ai frutti, sarà necessario integrare ulteriori trattamenti di rame nel periodo metà luglio – novembre.

GESTIONE AGRONOMICA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica durante la fase di fioritura ed allegagione.

Per informazioni contattare i tecnici di zona:

- Gorizia, Pordenone, Udine cell. 3346564270 – 0432 529206
- Trieste cell. 3357543021

Gli Avvertimenti di difesa dell'olivo sono consultabili sul sito dell'ERSA <http://www.ersa.fvg.it>