

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO SERVIZIO RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

AVVERTIMENTO DIFESA OLIVO n° 5 del luglio 2013

INFORMAZIONI GENERALI

Il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Friuli Venezia Giulia da applicarsi nell'annata agraria 2012-2013 ha ottenuto i pareri di conformità dei gruppi tecnici "Difesa" e "Tecnica agronomica" operanti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed è stato approvato con Delibera n. 981 dalla Giunta regionale il 7 giugno 2013. Il Disciplinare di Produzione Integrata può essere scaricato dalla home page del sito dell'ERSA.

SITUAZIONE CLIMATICA

Le previsioni meteorologiche sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>

SITUAZIONE FENOLOGICA



In tutti i comprensori lo sviluppo fenologico si manifesta nella fase fenologica di 1° ingrossamento del frutto in tutte le varietà secondo uno stadio di avanzamento della sub-fase che dipende dalla variabilità microclimatica delle zone/località, dall'esposizione degli impianti e in misura minore dalle cultivar.

Nelle zone litoranee costiere è stato osservato un accrescimento maggiore delle olivine rispetto alle zone interne più fresche.

L'allegagione si manifesta soddisfacente in molte zone mentre in altre è risultata modesta o molto scarsa.



INSETTI

Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Le catture settimanali della tignola sono risultate in sensibile diminuzione in alcune località o in leggero incremento in altre, a seconda delle zone e delle condizioni climatiche, come evidenziato nella tabella 1.

Dai dati rilevati, in molti casi il picco delle catture risulta essersi verificato dopo c.a. 7-10 giorni dall'inizio dei voli; negli altri invece il picco verrà raggiunto la settimana prossima.

Le infestazioni di tignola non sono omogenee nei comprensori e nelle zone per cui si consiglia di contattare i tecnici di zona per verificare il superamento o meno della soglia d'intervento.

Strategia di difesa integrata – Al superamento della soglia d'intervento, dopo il picco delle catture e nella fase discendente della curva di volo si consiglia di effettuare un trattamento larvicida con formulati sistemici o citotropici (es. Fosmet o Dimetoato) orientativamente entro la prima decade di luglio nelle zone costiere o fino alla metà di luglio nelle zone più interne.

Strategia di difesa in agricoltura biologica – Nei casi in cui il picco delle catture sia già passato si consigliano trattamenti con *Bacillus thuringensis* o Azadiractina, prima possibile o entro lunedì 8 luglio.

Nei casi in cui le catture siano ancora in aumento è consigliabile effettuare il trattamento subito dopo il raggiungimento del picco la settimana prossima.

Si consiglia di contattare i tecnici di zona per valutare il posizionamento più idoneo del trattamento in relazione alle località e alle strategie di difesa adottate.

DIFESA CRITTOGAME

Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*)

Nelle località in cui si siano accertate infezioni di occhio di pavone sulla nuova vegetazione si consiglia di intervenire con Dodina, eventualmente anche miscelata con il prodotto larvicida per il controllo della tignola nelle località in cui sia stata superata la soglia d'intervento del fitofago.

GESTIONE AGRONOMICA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica con le piante.

TABELLA 1 - Catture Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Prov.	Comune	Località	Servizio tecnico controllo	20° sett.	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
				13-19 mag	20 -26 mag	27mag-2giu	03 - 09 giu	10 -16 giu	17 - 23 giu	24 - 30giu	01 - 07 lug	08 -14 lug
PN	Caneva	Caneva	ERSA	1	1	0	0	/	2	21	13	
PN	Caneva	Fiaschetti	ERSA	152	85	12	9	0	0	122	51	
PN	Aviano	Aviano	ERSA	0	0	1	/	/	0	60	26	
UD	Faedis	Campeglio	ERSA								95	
UD	Rive d'Arcano	Rivotta	ERSA	8	6	6	/	3	1	27	31	
UD	Tarcento	Coja	ERSA	40	10	3	/	0	0	2	43	
UD	Moimacco	Bottenicco	ERSA	620	293	176	18	3	0	206	284	
UD	Osoppo	Osoppo	ERSA								7	
UD	Ragogna	Villuzza di Ragogna	ERSA								70	
GO	Mossa	Mossa	ERSA								23	
GO	San Floriano	San Floriano	ERSA	> 200	65	27	2	2	15	/	/	
GO	Sagrado	Sagrado – Castelv.	ERSA	> 200	70	22	9	9	3	42	102	
TS	Duino Aurisina	Medeazza	DOPTS	1	1	40	12	8	14	64	32	
TS	Duino Aurisina	S.Croce	DOPTS	1	1	26	10	17	23	84	54	
TS	Trieste	Costalunga	DOPTS	0	1	57	15	2	26	90	48	
TS	San Dorligo	Moccò	DOPTS	30	280	580	35	70	47	120	74	
TS	San Dorligo	Bagnoli	DOPTS	0	> 200	> 200	39	10	17	153	48	
TS	San Dorligo	Domio	DOPTS	0	73	147	27	2	40	110	123	
TS	San Dorligo	Caresana	DOPTS	1	27	84	16	2	57	125	131	
TS	Muggia	S.Barbara	DOPTS	1	47	70	34	42	31	100	94	
TS	Muggia	Darsella	DOPTS	18	24	57	20	37	44	92	82	
TS	Muggia	Chiampore	DOPTS	10	70	126	33	21	25	87	90	

Per informazioni contattare i tecnici di zona:

- Gorizia, Pordenone, Udine cell. 3346564270 – 0432 529206

- Trieste cell. 3357543021

Gli Avvertimenti di difesa dell'olivo sono consultabili sul sito dell'ERSA <http://www.ersa.fvg.it>