

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO
SERVIZIO RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

AVVERTIMENTO DIFESA OLIVO n° 6 del 31 maggio 2013

INFORMAZIONI GENERALI

Il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Friuli Venezia Giulia da applicarsi nell'annata agraria 2012-2013 ha ottenuto i pareri di conformità dei gruppi tecnici "Difesa" e "Tecnica agronomica" operanti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nel corso delle prossime settimane il Disciplinare sarà anche approvato con delibera della Giunta Regionale e successivamente pubblicato sul sito dell' ERSA.

SITUAZIONE FENOLOGICA



Anche questa settimana i persistenti abbassamenti termici in tutti i comprensori hanno contribuito al rallentamento dello sviluppo fenologico dell'olivo rispetto alle annate "normali". I rilievi settimanali hanno evidenziato il raggiungimento delle fasi prevalenti di mignolatura piena e inizio fioritura (solo nelle zone costiere) secondo uno stato di avanzamento delle sub-fasi, comprese tra gli intervalli 57 – 60 della scala BBCH, in relazione alle specifiche condizioni microclimatiche delle diverse zone e della composizione varietale degli impianti.

In particolare sono state rilevate:

- a) nelle zone interne le sub-fasi di mignolatura piena con le sub-fasi di rigonfiamento dei bottoni fiorali;
- b) nelle zone costiere la fase di mignolatura piena con le sub-fasi di rigonfiamento dei bottoni fiorali e la fase di inizio-fioritura negli impianti meglio esposti in prossimità del mare.

INSETTI



Tracce sericee di larve

Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

I rilievi settimanali hanno confermato una prevalente riduzione delle catture, ad eccezione delle zone costiere (vedi tabella 1).

Le infestazioni della tignola rilevate sulle infiorescenze campionate sono basse o trascurabili.

In casi eccezionali, al superamento della soglia di intervento di 45% dei fiori infestati è possibile intervenire con *Bacillus thuringensis*.



Erosioni sui bocci fiorali

DIFESA CRITTOGAME

Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*)

Difesa - Nel caso di infezioni fungine accertate di Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), qualora non già provveduto, si consiglia un intervento urgente con sali di rame o con dodina (non in fioritura) soprattutto nelle zone notoriamente favorevoli al patogeno e sulle varietà suscettibili alla malattia (es. Bianchera).

Il trattamento con Sali di rame in questo periodo è utile a contenere anche le infezioni di Piombatura (*Pseudocercospora cladosporioides*) segnalata in singoli oliveti.



GESTIONE AGRONOMICA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica durante la fase di fioritura ed allegagione.

Concimazione fogliare – Nel periodo di pre-fioritura (fase di mignolatura) è possibile effettuare un trattamento fogliare con prodotti a base di boro, microelemento importante per favorire l'allegagione, da ripetere eventualmente anche in post-fioritura.

Si consiglia di non miscelare il prodotto con altri antiparassitari ed attenersi sempre alle indicazioni riportate in etichetta.

N.B. IN FIORITURA È VIETATO EFFETTUARE TRATTAMENTI FITOSANITARI

TABELLA 1 - Catture Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Prov.	Comune	Località	20° sett.	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
			13-19 mag	20 -26mag	27mag-02giu	03- 09 giu	10-16 giu	17-23 giu	24 - 30giu	01-07 lug	08-14 lug
PN	Caneva	Caneva	1	1	0						
PN	Caneva	Fiaschetti	152	85	12						
PN	Aviano	Aviano	0	0	1						
UD	Rive d'Arcano	Rivotta	8	6	6						
UD	Tarcento	Coja	40	10	3						
UD	Moimacco	Bottenicco	620	293	176						
GO	San Floriano	San Floriano	> 200	65	27						
GO	Sagrado	Sagrado	> 200	70	22						
TS	Duino Aurisina	Medeazza	1	1	40						
TS	Duino Aurisina	S.Croce	1	1	26						
TS	Trieste	Costalunga	0	1	57						
TS	San Dorligo	Moccò	30	280	580						
TS	San Dorligo	Bagnoli	0	> 200	> 200						
TS	San Dorligo	Domio	0	73	147						
TS	San Dorligo	Caresana	1	27	84						
TS	Muggia	S.Barbara	1	47	70						
TS	Muggia	Darsella	18	24	57						
TS	Muggia	Chiampore	10	70	126						

Per informazioni contattare i tecnici di zona:

- Gorizia, Pordenone, Udine cell. 3346564270 – 0432 529206

- Trieste cell. 3357543021

Gli Avvertimenti di difesa dell'olivo sono consultabili sul sito dell'ERSA <http://www.ersa.fvg.it>