

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 15 del 8 agosto 2014

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni fornite nel presente bollettino relative alla difesa dalle avversità e al controllo delle infestanti, nonché all'uso di fitoregolatori, sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale, e risultano vincolanti solo per le aziende che aderiscono a programmi di difesa integrata volontaria al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità (Global gap, marchio regionale AQUA, ...), o alla conduzione biologica (quando specificato), mentre per tutte le altre aziende le indicazioni devono essere considerate consigliati dati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 relativo alla difesa integrata obbligatoria.



Pendolino – Moimacco (UD)

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Dal fine settimana si prevedono afflussi di aria caldo-umida e instabile da sud-ovest che potrà originare locali temporali, la cui previsione è piuttosto incerta. Le previsioni meteorologiche giornaliere dettagliate sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

FENOLOGIA

Continua in tutti i comprensori la fase fenologica di 2° ingrossamento del frutto.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Il monitoraggio del volo degli adulti è riportato in tabella 1.

Dal monitoraggio delle drupe risulta la presenza di pupe e fori di uscita in molte località, segno che la 1ª generazione sta volgendo al termine, nonché di un incremento della presenza di uova e larve di I età, appartenenti alla 2ª generazione. Negli oliveti climaticamente più svantaggiati si riscontrano ancora larve giovani della 1ª generazione. (vedi tabella 2).

L'infestazione attiva è alta negli oliveti meglio esposti dove non sono presenti trappole anti-mosca e dove non sono stati fatti interventi con spinosad, né con larvicidi.



Doppia
infestazione
su Bianchera

Le condizioni climatiche permangono favorevoli allo sviluppo delle popolazioni della mosca olearia.

STRATEGIE DI DIFESA

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Chi ha scelto di adottare strategie di contenimento di tipo adulticida-preventivo (come le aziende biologiche ad esempio), e si trova in presenza di pupe e primi fori nelle proprie drupe, deve procedere all'infittimento nel proprio oliveto delle trappole di cattura massale o dei dispositivi Attract&kill. Per questi ultimi, la cui densità consigliata in oliveto varia da 100 a 150 dispositivi/ha a seconda delle dimensioni delle piante, si consiglia di aggiungere in questa fase il 30% circa del numero finale dei dispositivi.

In considerazione del fatto che il 2° volo di adulti è già iniziato in molte località, si consiglia di intervenire con esche proteiche insetticide a base di spinosad, se il tempo meteorologico lo consente. Si ricorda infatti che forti piogge hanno il potere di dilavare il prodotto dalla vegetazione. È anche possibile intervenire con Sali di rame ai fini di rendere meno frequenti le ovideposizioni.

Per gli olivicoltori che applicano invece una strategia di tipo curativo, si ricorda che il trattamento è possibile solo in caso di superamento della soglia d'intervento, ovvero se sono presenti uova o larve giovani (di 1° e 2° età) nel 10-15% delle drupe. Al momento, negli oliveti in cui è stata rilevata un'infestazione attiva sotto-soglia, è necessario aspettare che l'infestazione attiva della 2ª generazione superi tale soglia prima di effettuare interventi larvicidi. Il numero di trattamenti con prodotti larvicidi è fissato dai Disciplinari di produzione integrata a max 2 nel corso della stagione.

STRATEGIE DI DIFESA APPLICABILI SU OLIVI DA OLIO:

Difesa adulticida - preventiva:

Può essere attuata mediante esche proteiche, trappole "Attract and kill" e trappole per la cattura massale.

I criteri di intervento si basano sull'applicazione di esche proteiche avvelenate con spinosad su una porzione della chioma o sull'installazione sulle piante di dispositivi attrattivi-insetticidi (es. Ecotrap, Magnet Oli) o di trappole per la cattura massale, come Omeotrap, Tap-trap, ecc.

Il fine è la riduzione delle popolazioni della mosca (di ogni generazione) prima delle ovideposizioni sulle olive e del conseguente sviluppo di larve giovani.

Sono strategie di difesa a basso impatto ambientale e biologiche territoriali che, considerata la specifica metodologia di intervento, devono essere supportate dalla collaborazione dei tecnici di zona dei diversi servizi tecnici di difesa dell'olivo operanti sul territorio.

Difesa larvicida - curativa:

I criteri d'intervento si basano su interventi chimici larvicidi al superamento della soglia di intervento del 10-15% di infestazione attiva. È necessaria la determinazione dell'infestazione attiva nelle drupe (sommatoria di uova e larve giovani vive di 1° e 2° età presenti al loro interno) per verificare il superamento o meno della soglia di intervento.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

TABELLA 1 – Catture Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*)

Punti di monitoraggio			27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.	31° sett.	32° sett.	33° sett.	34° sett.	35° sett.
Prov.	Comune	Località	30 giu - 6 lug	7 - 13 lug	14 - 20 lug	21 - 27 lug	28 lug - 3 ago	4 - 10 ago			
PN	Caneva	Caneva	5	3	7	6	3	12			
PN	Caneva	Stevenà	/	3	7	1	4	6			
PN	Caneva	Fiaschetti	0	0	/	1	0	1			
PN	Polcenigo	Coltura	/	0	1	1	0	0			
PN	Aviano	Aviano	/	1	1	1	1	0			
PN	Aviano	Somprado	2	1	4	4	2	3			
UD	Ragogna	Villuzza	/	0	3	2	2	1			
UD	Ragogna	S.Pietro	/	0	3	2	1	4			
UD	Osoppo	Osoppo	/	1	3	4	1	3			
UD	Gemona	Gemona	/	1	4	1	0	1			
UD	Tarcento	Coja	/	8	15	7	10	3			
UD	Tarcento	Sedilis	/	0	3	1	1	0			
UD	Faedis	Campeglio	/	2	2	1	2	3			
UD	Cividale	Rubignacco	/	1	1	1	1	4			
UD	Cividale	Galiano	/	17	10	11	15	4			
UD	Moimacco	Bottenicco	3	9	7	5	5	5			
UD	Buttrio	Buttrio	/	0	0	1	4	4			
UD	Castions di strada	Castions di S.	/	2	1	1	1	1			
UD	Pozzuolo	Pozzuolo	9	7	14	8	18	12			
GO	Dolegna del Collio	Ruttars	/	1	7	8	12	4			
GO	Cormons	Quarin	/	/	17	11	9	7			
GO	San Floriano	San Floriano	/	/	8	9	12	4			
GO	Gorizia	Oslavia	/	/	11	10	7	2			
TS	Duino Aurisina	Slivia	/	2	7	8	11	1			
TS	Duino Aurisina	S.Croce	/	/	19	27	18	3			
TS	Trieste	Costalunga	/	10	13	24	29	15			
TS	San Dorligo	Moccò	/	/	18	16	21	13			
TS	San Dorligo	Bagnoli	/	/	14	12	11	8			
TS	San Dorligo	Domio	/	/	10	11	8	7			
TS	San Dorligo	Caresana	/	/	22	21	9	7			
TS	Muggia	S.Barbara	/	/	19	27	17	9			
TS	Muggia	Darsella	/	/	24	29	33	10			
TS	Muggia	Chiampore	/	12	33	37	34	13			

TABELLA 2 – Infestazioni Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)
32° settimana

Prov.	Comune	Località	Monitoraggio	No. frutti	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% MORTALITA' % Lm 1 + Lm 2
PN	Caneva	Caneva	ERSA	100	1	1	10	40	1	3	0	0	0	1	1	12	2	43
PN	Caneva	Fiaschetti	ERSA	50	2	0	6	14	2	0	2	0	2	0	1	16	10	28
PN	Aviano	Somprado	ERSA	100	1	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5
UD	Pozzuolo del F.	Pozzuolo*	ERSA	100	3	0	20	6	4	0	6	0	20	0	3	24	29	6
UD	Moimacco	Moimacco	ERSA	100	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
UD	Gemona	Gemona	ERSA	100	2	0	13	7	2	0	1	0	0	0	0	15	1	7

Prov.	Comune	Località	Monitoraggio	No. frutti	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% MORTALITA' % Lm 1 + Lm 2
GO	Cormons	Quarin	DOP T.	100	17	1	1	0	0	0	0	0	3	0	1	2	4	0
GO	San Floriano	San Floriano	DOP T.	100	23	1	1	1	0	0	0	0	4	0	1	2	5	1
GO	Gorizia	Oslavia	DOP T.	100	21	2	1	1	0	0	0	0	2	0	2	3	4	1
TS	Duino Aurisina	Slivia	DOP T.	100	11	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	0
TS	Duino Aurisina	S.Croce	DOP T.	100	37	2	1	0	1	1	0	0	2	0	3	4	5	1
TS	Trieste	Costalunga	DOP T.	100	42	2	1	2	0	2	0	0	3	2	4	3	9	4
TS	San Dorligo	Moccò	DOP T.	100	43	3	2	1	1	0	0	0	4	1	5	6	10	1
TS	San Dorligo	Bagnoli	DOP T.	100	39	2	1	1	1	0	0	0	5	1	4	4	10	1
TS	San Dorligo	Domio	DOP T.	100	37	3	1	1	0	0	0	0	3	1	5	4	9	1
TS	San Dorligo	Caresana	DOP T.	100	44	4	1	1	1	1	0	0	2	2	6	6	10	2
TS	Muggia	S.Barbara	DOP T.	100	61	3	1	2	1	0	0	0	1	1	11	5	13	2
TS	Muggia	Darsella	DOP T.	100	46	4	2	0	3	0	0	0	3	0	13	9	16	0
TS	Muggia	Chiampore	DOP T.	100	61	5	3	0	4	0	0	0	4	0	17	12	21	0
TS	Muggia	Lazzaretto**	ERSA	100	3	0	0	8	2	17	9	7	25	0	15	2	56	25

* testimone

** dopo un trattamento larvicida

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN tel. 0432 529270

cell. 3346564270

mossenta@ersa.fvg.it

ennio.scarbolo@ersa.fvg.it

TS

tel. 040 3775852

cell. 3357543021 massimo.babici@ersa.fvg.it