

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 21 del 18 settembre 2015

INFORMAZIONI GENERALI

- ∞ Le indicazioni fornite nel presente bollettino relative alla difesa dalle avversità e al controllo delle infestanti, nonché all'uso di fitoregolatori, sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale, e risultano vincolanti solo per le aziende che aderiscono a programmi di difesa integrata volontaria al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità, mentre per tutte le altre aziende le indicazioni devono essere considerate consigli dati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 relativo alla difesa integrata obbligatoria.
- ∞ Il disciplinare di produzione integrata per l'anno 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, comprensivo dell'aggiornamento delle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti" del 22 aprile 2015, è consultabile e scaricabile sul sito dell' ERSA:
<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/disciplinare-di-produzione-integrata-fvg-per-lanno-2015/>

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Sabato si prevede variabilità, che non esclude qualche breve pioggia sparsa, che lascerà il posto nei giorni successivi a condizioni di cielo sereno durante la settimana. Un peggioramento è previsto nella giornata di mercoledì con qualche temporale dal pomeriggio ma il maltempo dovrebbe essere di breve durata.

Le previsioni meteorologiche dettagliate sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.



FENOLOGIA

In tutte le località della Regione prosegue il 2° ingrossamento del frutto ed è in avanzamento l'invaiatura delle varietà precoci (maurino, leccino, pendolino, frantoio).



SITUAZIONE FITOSANITARIA

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Il monitoraggio dei voli degli adulti ha registrato questa settimana un ulteriore aumento delle catture nelle zone interne della regione, mentre in provincia di Trieste e in particolare nella fascia costiera il volo degli adulti è in fase discendente (vedi tabella 1).

Le ovideposizioni e conseguentemente la presenza di giovani larve è in aumento in Friuli a seguito dell'intensificarsi del volo degli adulti. Le infestazioni attive permangono sotto la soglia di intervento dove sono stati effettuati trattamenti contro gli adulti dall'inizio del volo, mentre si supera la soglia negli oliveti privi di trappole per il contenimento degli adulti e dove il trattamento larvicida è stato effettuato 3-4 settimane fa. Nel Triestino le infestazioni attive

permangono basse, anche come conseguenza di trattamenti adulticidi o larvicidi effettuati in precedenza (tabella 2).

DISSECCAMENTI DELLA CHIOMA

Chi notasse sui propri olivi dei disseccamenti fogliari anomali o di interi rametti o branche, soprattutto a carico di giovani piante, può rivolgersi ai numeri sottostanti per un sopralluogo dei tecnici ERSA e un eventuale prelievo di materiale da sottoporre ad analisi.

STRATEGIE DI DIFESA

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Difesa adulticida

Vista la presenza di catture in tutti i comprensori regionali e le condizioni climatiche favorevoli alle ovideposizioni, si consiglia un trattamento adulticida con esche proteiche attivate con spinosad o con prodotti a base di dimetoato che prevedano in etichetta questo tipo di uso.

Difesa larvicida

Si consiglia un trattamento larvicida nei prossimi giorni negli oliveti che superano la soglia di intervento, ovvero alla presenza di uova e larve giovani all'interno dell'8-10% delle drupe. Questa è la situazione in cui si trovano gli oliveti dove il trattamento larvicida è stato effettuato 3-4 settimane fa, soprattutto se non sono stati eseguiti trattamenti contro gli adulti negli ultimi 15 giorni e dove non sono state collocate trappole per il contenimento degli adulti.

Si consiglia di valutare comunque la presenza di punture fresche su un campione di olive per valutare il superamento della soglia di intervento nel proprio oliveto.

Si ricorda il tempo di carenza dei prodotti larvicidi autorizzati su olivo, che varia dai 28 ai 30 gg, ed è quindi necessario valutare che tale tempo sia rispettato in funzione della data prevista per la raccolta.

OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleaginea*)

In presenza di cultivars suscettibili all'occhio di pavone si consiglia un intervento con prodotti rameici ai fini di proteggere le piante da questo patogeno, in quanto con l'abbassarsi delle temperature e la maggior umidità esso diventa più aggressivo.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

TABELLA 1- Catture Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*)

Prov.	Comune	Località	27° sett. 29 giu – 5 lug	28° sett. 6 -12 lug	29° sett. 13-19 lug	30° sett. 20-26 lug	31° sett. 27 lug – 2 ago	32° sett. 3 – 9 ago	33° sett. 10 – 15 ago	34° sett. 16 – 23 ago	35° sett. 24 – 30 ago	36° sett. 31 ago - 6 set	37° sett. 7 – 13 set	38° sett. 14 - 20 set
PN	Aviano	Somprado	/	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
PN	Caneva	Caneva	/	3	3	3	4	4	1	3	0	0	12	25
PN	Caneva	Stevenà	5	1	2	1	4	3	0	1	0	4	2	4
PN	Polcenigo	Coltura	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
PN	Pinzano	Pinzano	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1
UD	Ragogna	Villuzza	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1

UD	Gemona	Gemona	100	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	5	1	5	4
UD	Codroipo	Codroipo	52	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	2
GO	Sagrado	Castelnuovo	52	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	2	0	4	25
GO	Cormons *	Quarin *	100	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	2	0	3	3
GO	San Floriano	San Floriano	100	1	1	1	2	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2
GO	Gorizia *	Oslavia *	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0
TS	Duino Aurisina	Slivia	100	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
TS	Duino Aurisina	S.Croce	100	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1
TS	Trieste	Costalunga	100	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	4	1	6	1
TS	San Dorligo *	Moccò *	100	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
TS	San Dorligo	Bagnoli	100	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	5	3	5	1
TS	San Dorligo	Domio	100	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1
TS	San Dorligo	Caresana	100	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1
TS	Muggia	S.Barbara	100	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
TS	Muggia *	Darsella *	100	2	0	0	1	1	0	0	0	3	0	3	1	6	1
TS	Muggia	Chiampore	100	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2

* dopo intervento larvicida

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN tel. 0432 529270 cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021