

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 5 del 27 maggio 2016

INFORMAZIONI GENERALI

- Le indicazioni fornite nel presente bollettino relative alla difesa dalle avversità e al controllo delle infestanti, nonché all'uso di fitoregolatori, sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale, e risultano vincolanti solo per le aziende che aderiscono a programmi di difesa integrata volontaria al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità, mentre per tutte le altre aziende le indicazioni devono essere considerate consigli dati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 relativo alla difesa integrata obbligatoria.
- Il disciplinare di produzione integrata per l'anno 2016 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è consultabile e scaricabile sul sito dell' ERSA:
<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2016-1/>

SITUAZIONE METEOROLOGICA

A partire da domenica la Regione sarà interessata da forti temporali fino a mercoledì, quando le piogge caleranno di intensità.

Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

FENOLOGIA

Lo sviluppo fenologico prevalente in tutti i comprensori olivicoli è la fase di mignolatura che si manifesta in stadi di avanzamento differenziati nelle diverse località a seconda dei rispettivi areali climatici di appartenenza.

All'interno della Regione siamo alla fase BBCH 57 (la corolla ancora verde è più lunga del calice) sulle varietà Bianchera ed Ascolana, al culmine del distanziamento dei fiori nelle altre varietà.

In provincia di Trieste gli stadi fenologici rilevati si differenziano tra la fioritura piena degli oliveti meglio esposti prospicienti al mare e quello dell'inizio fioritura e di rigonfiamento dei bottoni fiorali delle zone gradualmente più interne della provincia.



Bianchera - Pozzuolo del F.

Leccino - Pozzuolo del F.



SITUAZIONE FITOSANITARIA

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Le catture rilevate questa settimana nelle località della Regione monitorate (vedi tabella 1) hanno evidenziato una marcata riduzione delle popolazioni in tutti i comprensori olivicoli regionali.

In particolare questa settimana si è notato un calo significativo nelle catture sia nelle zone interne del Friuli centrale che nelle zone costiere della provincia di Trieste, segno che ci troviamo nella fase discendente del volo della generazione fillofaga. Le uova della generazione antofaga sono già state deposte e in alcune località potrebbero comparire a breve i primi danni sui fiori.

STRATEGIE DI DIFESA

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Sono sconsigliati trattamenti chimici contro questa generazione. Se dovesse essere necessario, la strategia di difesa verrà impostata sulla generazione carpofaga a carico delle olivine.

Negli oliveti dove si presentano regolarmente negli anni infestazioni della tignola, è possibile effettuare trattamenti a base di *Bacillus thuringiensis* contro le larve in nutrizione sui fiori. Il momento migliore per l'intervento è nella fase discendente del volo degli adulti, dopo il picco delle catture.

GESTIONE DELLA COLTURA

CONCIMAZIONE FOGLIARE – Si consiglia di effettuare il trattamento fogliare di pre-fioritura con prodotti a base di boro, microelemento importante per favorire l'allegagione, nel momento più prossimo alla fioritura. Si consiglia di non miscelare il prodotto con fitofarmaci.

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica durante la fase di fioritura ed allegagione.

N.B. in fioritura è vietato effettuare trattamenti fitosanitari con insetticidi, acaricidi, erbicidi. Sono utilizzabili i fungicidi solo se non presentano tossicità per gli impollinatori (riportata in etichetta).

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

TABELLA 1 - Catture Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Prov.	Comune	Località	20° sett.	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
UD	Caneva	Stevenà	/	9							
UD	Tarcento	Sottoriviera	/	5							
UD	Cividale del Friuli	Rubignacco	/	56							
UD	Faedis	Campeglio	/	3							
UD	Castions di Strada	Castions di Strada	/	16							
UD	Pozzuolo del Friuli	Pozzuolo del Friuli	123	5							

Prov.	Comune	Località	20° sett.	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
GO	Cormons	Monte Quarin	/	12							
GO	Sagrado	Sagrado	/	/							
GO	Ronchi dei L.	Selz	/	9							
TS	Duino Aurisina	Medeazza	/	87							
TS	Duino Aurisina	S.Croce	/	0							
TS	Trieste	Costalunga	/	16							
TS	San Dorligo	Moccò	/	37							
TS	San Dorligo	Bagnoli	94	41							
TS	San Dorligo	Domio	64	7							
TS	San Dorligo	Caresana	15	23							
TS	Muggia	S.Barbara	7	6							
TS	Muggia	Darsella S.B.	197	47							
TS	Muggia	Chiampore	154	34							

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 335754302