

## **BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 11 del 8 luglio 2016**

### **INFORMAZIONI GENERALI**

- ∞ Le indicazioni fornite nel presente bollettino relative alla difesa dalle avversità e al controllo delle infestanti, nonché all'uso di fitoregolatori, sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale, e risultano vincolanti solo per le aziende che aderiscono a programmi di difesa integrata volontaria al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità, mentre per tutte le altre aziende le indicazioni devono essere considerate consigli dati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 relativo alla difesa integrata obbligatoria.
- ∞ Il disciplinare di produzione integrata per l'anno 2016 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è consultabile e scaricabile sul sito dell' ERSA:  
<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2016-1/>

### **SITUAZIONE METEOROLOGICA**

Nei prossimi giorni anche sulla Regione si estenderà l'anticiclone delle Azzorre che favorirà generali condizioni di stabilità atmosferica. Sulle Alpi in quota, tuttavia, affluiranno a tratti correnti un po' più umide da nord-ovest che determineranno possibili locali temporali e rovesci..

Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

### **FENOLOGIA**

In tutti i comprensori olivicoli regionali la fase fenologica rilevata è quella del 1° ingrossamento del frutto, secondo stadi di crescita più marcati nelle zone litoranee e costiere.



## SITUAZIONE FITOSANITARIA

Insetti:

### TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Le catture rilevate questa settimana risultano in consistente diminuzione in tutte le località di monitoraggio regionali (vedi tabella 1), segno che la generazione della tignola va esaurendosi.

### MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

E' iniziato il monitoraggio della mosca delle olive in tutti i comprensori. Le catture hanno evidenziato la presenza della mosca in alcune località che si mantiene ancora di bassa o trascurabile entità (vedi tabella 2).



In considerazione del rapido ingrossamento delle olive di tutte le cv., più marcato in provincia di Trieste rispetto le altre zone, e delle condizioni climatiche favorevoli al fitofago (temp. max. 28-30 °C e umidità elevata) al fine di prevedere eventuali anticipi di infestazioni della mosca si consiglia di effettuare, oltre al monitoraggio dei voli, anche il controllo le drupe delle cv. da mensa (es.: Ascolana, Bella di Spagna ecc.) per rilevare l'eventuale presenza di punture, ovideposizioni e stadi larvali giovanili della mosca.

Il monitoraggio del volo degli adulti è importante soprattutto per chi attua una difesa di tipo adulticida (preventiva) con esche proteiche al fine di posizionare il trattamento nei momenti di maggiore presenza degli adulti di mosca, rendendolo più efficace.

## STRATEGIE DI DIFESA

### TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Qualora non ancora effettuato, in caso di superamento della soglia di intervento, che per le olive da olio è di 10 - 15% di uova e/o di larvette in fase di penetrazione nelle olivine, è possibile effettuare un tempestivo trattamento con un prodotto larvicida fosfororganico (es., fosmet, da non miscelare con altri prodotti fitosanitari).

### DISSECCAMENTI DELLA CHIOMA

Qualora si riscontrassero disseccamenti fogliari anomali o di interi rametti o branche, anche di singole piante e soprattutto a carico di giovani piante, si consiglia di rivolgersi ai numeri sottostanti per un sopralluogo dei tecnici ERSA e un eventuale prelievo di materiale da sottoporre ad analisi.

## GESTIONE DELLA COLTURA

Negli impianti dei comprensori/zone in cui si riscontra una notevole carica di frutti sulle piante è possibile effettuare una concimazione fogliare con concimi che contengono Azoto, Fosforo, Potassio e micro elementi (per non più di tre volte). Per chi coltiva con metodi biologici è possibile utilizzare concimi fogliari ammessi nell'agricoltura biologica (riportano l'indicazione "ammesso in coltura biologica").

In questo periodo evitare di somministrare concimi al terreno.

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.



Prov.	Comune	Località	27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.	31° sett.	32° sett.	33° sett.	34° sett.	35° sett.
GO	Sagrado	Sagrado	/								
GO	Ronchi	Selz	/								
TS	Duino Aurisina	Slivia	/								
TS	Duino Aurisina	S.Croce	/								
TS	Trieste	Costalunga	/								
TS	San Dorligo	Moccò	/								
TS	San Dorligo	Bagnoli	/								
TS	San Dorligo	Domio	/								
TS	San Dorligo	Caresana	/								
TS	Muggia	S.Barbara	/								
TS	Muggia	Darsella	0								
TS	Muggia	Chiampore	/								

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021