

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 2 del 12 maggio 2017

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Con la settimana entrante si prevede l'arrivo di un'alta pressione che si estenderà gradualmente determinando tempo più stabile, soleggiato e caldo.

Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

FENOLOGIA

La fase fenologica prevalente nei comprensori è la mignolatura le cui sub-fasi si differenziano in relazione alle varietà e alle diverse condizioni climatiche delle zone e località.

Negli areali costieri più caldi le infiorescenze sono allungate con i bocci fiorali verdi ben distanziati, mentre nelle zone interne più fresche si rileva la crescita dell'infiorescenza con distensione delle mignole.



SITUAZIONE FITOSANITARIA

OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleaginea*)

Sono state segnalate infezioni di Occhio di Pavone diffuse nei comprensori, in taluni casi molto consistenti, in particolare su varietà Bianchera, favorite dalle condizioni climatiche umide e piovose primaverili.

Nelle zone dove esistono condizioni predisponenti allo sviluppo del patogeno, sulle varietà più suscettibili (es.: Bianchera, ecc.), si osservano defogliazioni dovute alle infezioni dell'annata precedente, soprattutto nelle parti più basse della chioma e sulle foglie sono visibili ancora le infezioni dell'anno scorso.

Si consiglia di effettuare un trattamento fitosanitario urgente, soprattutto per proteggere la nuova vegetazione, con dodina (oppure con prodotti a base di rame quale trattamento preventivo nelle zone a basso rischio).



GESTIONE DELLA COLTURA

Il trattamento fogliare con prodotti a base di boro, microelemento importante per favorire l'allegagione, nel periodo di pre-fioritura deve essere effettuato nel momento più prossimo alla fioritura.

Non miscelare il prodotto con altri antiparassitari.

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021