

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 10 del 7 luglio 2017

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

FENOLOGIA

La fase fenologica rilevata negli areali costieri e nelle zone più calde con impianti meglio esposti della pedemontana pordenonese e delle zone collinari (UD) è quella di inizio dell'indurimento del nocciolo con la graduale lignificazione dei tessuti mentre nelle zone interne più fresche le piante si trovano nella fase di primo ingrossamento del frutto.



SITUAZIONE FITOSANITARIA

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Le catture di tignola riscontrate, in tendenziale riduzione molto consistente in alcune zone, evidenziano l'esaurimento della generazione carpofaga in tutti i comprensori.

Tabella 1 - Catture Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Prov.	Comune	Località	20° sett.	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
<i>Pedemontana Pordenonese</i>											
PN	Caneva bio	Fiaschetti		2	0	0	22	30	3	0	
<i>Colline del Friuli</i>											
PN	Pinzano	Perisinotto		0	0	1	1	4	0	3	
UD	Tricesimo	Adorgnano		12	10	3	3	43	31	0	
UD	Gemona bio	Facchin		1	1	1	5	30	20	0	
<i>Alta Pianura Friulana</i>											
UD	Cividale	Ducale		115	20	0	5	62	22	0	
UD	Codroipo	Beano		5	1	1	7	22	0	0	
<i>Bassa Pianura Friulana</i>											
UD	Castions di S.	Ellis		0	0	1	0	0	0	0	
<i>Collio goriziano e isontino</i>											
GO	Cormons	Monte Quarin		1	0	1	7	4	1	0	
GO	Ronchi	Selz		6	0	0	19	10	2	0	
GO	Monfalcone	San Canzian D'Isonzo		0	0	2	6	9	5	1	
<i>Trieste provincia</i>											
TS	Duino Aurisina	Sgonico		7	2	1	6	9	1	0	
TS	Trieste	Contovello		7	3	0	23	23	14	6	
TS	Trieste	Costalunga		12	0	24	98	94	92	25	
TS	San Dorligo	Moccò		40	3	70	130	90	45	2	
TS	San Dorligo	Bagnoli		34	6	20	155	135	88	10	
TS	San Dorligo	Domio		55	3	75	101	101	130	1	
TS	San Dorligo	Caresana		23	0	15	49	45	52	35	
TS	Muggia	S.Barbara		5	0	1	60	21	15	2	
TS	Muggia	Darsella		6	7	32	76	70	42	38	
TS	Muggia	Chiampore		11	10	18	83	75	48	35	

MOSCA DELLE OLIVE (*Bactrocera oleae*)

Il monitoraggio settimanale ha evidenziato catture crescenti in tutti i comprensori e di significativa entità in alcune località.

Nella fase di primo ingrossamento del frutto normalmente le drupe non sono ancora recettive alle ovideposizioni della mosca poiché di solito lo diventano nella sub-fase di indurimento del nocciolo, tuttavia in alcuni casi su cv. a drupa grossa (es. Bianchera) si sono riscontrate le prime punture, con presenza di uova e larve di prima età.

STRATEGIE DI DIFESA

Agli olivicoltori che applicano la strategia di difesa adulticida, nelle località in cui si rilevano catture crescenti di significativa entità si consiglia di contattare i tecnici di zona per posizionare tempestivamente un intervento adulticida specifico con esche proteiche, o con l'installazione di trappole Attract and kill, o con trappole di cattura massale nei momenti di maggiore presenza degli adulti della mosca.

Tabella 2 – Catture di mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

Punti di monitoraggio			25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.
Prov.	Comune	Località	19 - 25 giu	26 giu - 2 lug	3 lug - 9 lug			
<i>Pedemontana Pordenonese</i>								
PN	Caneva		0	2	7			
PN	Caneva		0	7	1			
PN	Polcenigo		0	0	1			
PN	Aviano		0	0	8			
PN	Caneva		0	3	16 3			
<i>Colline Friulane</i>								
PN	Pinzano		0	1	4			
UD	Ragogna		0	0	1			
UD	Osoppo		0	0	2			
UD	Tarcento		0	0	2			
UD	Tricesimo		0	0	2			
UD	Faedis		0	1	2			
UD	Gemona		1	0	2			
<i>Alta Pianura Friulana</i>								
UD	Rodeano		0	0	2			
UD	Martignacco		0	0	2			
UD	Cividale		0	0	2			
UD	Cividale		0	4	7			
UD	Buttrio		0	4	2			
UD	Codroipo		0	0	0			
<i>Bassa Pianura Friulana</i>								
UD	Castions di St		0	0	0			
UD	Pertegada		0	0	2			
<i>Collio goriziano e isontino</i>								
GO	Cormons	Monte Quarin		0	0			
GO	Ronchi	Selz		0	0			
GO	Monfalcone	San Canzian D' isonzo		0	0			
<i>Trieste provincia</i>								
TS	Sgonico	Sgonico		1	1			
TS	Duino Aurisina	Contovello		0	5			
TS	Trieste	Costalunga		0	3			
TS	San Dorligo	Moccò		0	0			
TS	San Dorligo	Bagnoli		1	6			
TS	San Dorligo	Domio		0	0			
TS	San Dorligo	Caresana		0	0			
TS	Muggia	S.Barbara		0	6			
TS	Muggia	Darsella		0	4			
TS	Muggia	Chiampore		0	1			

Aziende biologiche								
UD	Cividale	Spessa			1			
GO	Sagrado	Sagrado			0			
TS	Duino Aurisina	Medeazza			0			
TS	San Dorligo della	San Giuseppe			0			
TS	San Dorligo della	Dolga Krona			1			



OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleagina*)

Nelle zone in cui si riscontrano nuove infezioni fungine sulla vegetazione in particolare sulle cv. suscettibili alle infezioni, si consiglia di effettuare un trattamento con Dodina oppure con prodotti rameici (preferibilmente in forma di ossicloruro o idrossido).

GESTIONE DELLA COLTURA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica.

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021