

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 24 del 13 ottobre 2017

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito <http://www.osmer.fvg.it>.

FENOLOGIA

Prosegue la fase fenologica di graduale maturazione dei frutti.

Per le varietà toscane che hanno raggiunto la maturazione di raccolta nelle zone più calde si consiglia di iniziare la raccolta, mentre per la varietà Bianchera si consiglia di attendere i prossimi rilievi della maturazione ai fini di programmare la raccolta (orientativamente dall'ultima settimana di ottobre).



SITUAZIONE FITOSANITARIA

MOSCA DELLE OLIVE (*Bactrocera oleae*)

Negli areali interni è stata rilevata mediamente una tendenziale riduzione delle catture (vedi tabelle 2 e 3), mentre in alcune località più calde delle zone costiere si confermano ancora catture di significativa entità.

La graduale riduzione delle temperature minime stagionali determina un tendenziale rallentamento dello sviluppo larvale all'interno delle drupe.

L'infestazione attiva si è mantenuta su valori di modesta/trascurabile entità ad eccezione di alcune località costiere più calde (vedi tab. 4 e 5).

STRATEGIE DI DIFESA

NON si possono più effettuare trattamenti fitosanitari contro la mosca olegaria.

Si consiglia la raccolta anticipata nel caso in cui su varietà a maturazione tardiva (es.: Bianchera) si raggiungesse della soglia d'intervento dell'infestazione attiva.

Tabella 1 - Catture di mosca delle olive (*Bactrocera oleae*) - DIFESA INTEGRATA

PUNTI DI MONITORAGGIO			25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.	31° sett.	32° sett.	33° sett.	34° sett.	35° sett.	36° sett.	37° sett.	38° sett.	39° sett.	40° sett.	41° sett.
Prov.	Comune	Località	19 - 25 giu	26 giu-2 lug	3 - 9 lug	10 - 16 lug	17 - 23 lug	24 - 30 lug.	31 lug-6 ago	7 - 13 ago	14 - 20 ago	21 - 27 ago	28 ago-3 set	4 -10- set	11 - 17 set	18 - 24 set	25 set - 1 ott	2 - 8 ott	9 - 15 ott
Pedemontana Pordenonese																			
PN	Caneva	Stevenà	0	2	7	4	2	1	4	0	13	1	1	8	4	5	5	2	0
PN	Caneva	Demarco camp.	0	7	1	2	2	4	4	2	26	10	10	11	8	10	4	3	0
PN	Polcenigo	Coltura	0	0	1	5	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
PN	Aviano	Basaldella	0	0	8	0	1	2	1	2	1	0	0	3	0	3	0	1	0
Colline del Friuli																			
PN	Pinzano	Perisinotto	0	1	4	2	0	0	1	1	6	1	1	6	2	1	1	0	0
UD	Ragogna	Villuzza	0	0	1	1	1	1	0	0	3	1	1	18	6	1	1	1	0
UD	Osoppo	Venturini camp.O	0	0	2	0	0	0	1	0	3	1	1	0	5	1	1	1	0
UD	Tarcento	Sottoriviera	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2	7	1	2
UD	Tricesimo	Adorgnano	0	0	2	0	1	0	0	1	0	3	3	7	2	2	2	0	0
UD	Faedis	Campeggio	0	1	2	0	0	1	2	1	0	4	4	5	3	2	3	2	1
Alta Pianura Friulana																			
UD	Rodeano	Coseanetto camp	0	0	2	0	0	0	2	1	0	1	1	1	5	10	1	2	1
UD	Martignacco	Delendi	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
UD	Cividale	Ducale camp.	0	0	2	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	2	2	0	4
UD	Cividale	Gagliano camp.	0	4	7	0	0	0	0	2	5	1	1	1	2	2	0	1	1
UD	Buttrio	Caminetto	0	4	2	0	0	1	2	1	0	1	1	2	2	2	0	0	0
UD	Codroipo	Beano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bassa Pianura Friulana																			
UD	Castions di St	Ellis camp.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
UD	Pertegada	Lorenzonetto	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
Collio goriziano e isontino																			
GO	Cormons	Monte Quarin		0	0	0	1	2	0	3	4	5	0	0	0	1	0	0	1
GO	Ronchi	Selz		0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2
GO	Monfalcone	San Canzian D' isonzo		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trieste provincia																			
TS	Sgonico	Sgonico		1	1	5	3	1	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0
TS	Duino Aurisina	Contovello		0	5	4	1	5	0	0	4	6	1	1	7	18	23	22	13
TS	Trieste	Costalunga		0	3	2	3	0	5	0	3	20	5	2	4	11	9	11	18
TS	San Dorligo	Moccò		0	0	0	1	1	1	0	2	2	0	0	1	2	0	2	
TS	San Dorligo	Bagnoli		1	6	11	5	13	8	10	7	18	1	3	4	4	15	14	12
TS	San Dorligo	Domio		0	0	3	6	3	0	1	15	11	1	0	8	2	1	11	7
TS	San Dorligo	Caresana		0	0	2	2	5	0	0	4	6	0	1	3	4	6	2	24
TS	Muggia	S.Barbara		0	6	2	10	6	8	5	30	16	35	6	15	38	25	25	24
TS	Muggia	Darsella di Chiampore		0	4	1	2	10	13	7	42	14	3	12	4	24	3	12	12
TS	Muggia	Chiampore		0	1	5	2	0	1	0	8	7	1	6	5	9	17	2	2

Tabella 3 – Catture di mosca delle olive (*Bactrocera oleae*) - DIFESA BIOLOGICA

PUNTI DI MONITORAGGIO			25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.	31° sett.	32° sett.	33° sett.	34° sett.	35° sett.	36° sett.	37° sett.	38° sett.	39° sett.	40° sett.	41° sett.
Prov.	Comune	Località	19 - 25 giu	26 giu-2 lug	3 - 9 lug	10 - 16 lug	17 - 23 lug	24 - 30 lug.	31 lug-6 ago	7 - 13 ago	14 - 20 ago	21 - 27 ago	28 ago-3 set	4 -10- set	11 - 17 set	18 - 24 set	25 set - 1 ott	2 - 8 ott	9 - 15 ott
Pedemontana Pordenonese																			
PN	Caneva	Casagrande - bio.	0	3	16 3	4 1	3 1	2 3	8 3	4 0	7	1	1	11 7	3 5	3 3	2 5	1 0	0
Colline del Friuli																			
UD	Gemona bio	Facchin - bio.	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	2	1	1	1
UD	Cividale	Spessa - bio.			1	0	2	3	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1
Collio goriziano e isontino																			
GO	Sagrado	Sagrado			0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Trieste provincia																			
TS	Duino Aurisina	Medeazza			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
TS	San Dorligo	San Giuseppe			0	0	1	0	1	0	2	2	1	2	1	0	1	0	14
TS	San Dorligo	Dolga Krona			1	1	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	2	0	7

Tabella 4-DIFESA INTEGRATA: Infestazioni *Bactrocera oleae* alla 41° settimana

Comune	Località	No. frutti	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. Età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% INFESTAZIONE TOTALE	% MORTALITA' I e II età
UD	Martignacco	50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	4	0
UD	Tarcento	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Tricesimo	50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Campeglio	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0
UD	Torreano	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GO	Cormons	Monte Quarin	100	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
GO	Ronchi	Selz	100	2	0	0	2	0	5	0	0	0	2	0	2	2	7
GO	Monfalcone	San Canzian D' isonzo	100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TS	Sgonico	Sgonico	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0
TS	Duino Aurisina	Contovello	100	3	1	2	0	3	0	4	1	0	1	6	6	12	0
TS	Trieste	Costalunga	100	4	1	2	0	4	0	4	0	7	9	7	20	27	0
TS	San Dorligo	Moccò	100	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
TS	San Dorligo	Bagnoli	100	3	1	2	0	3	0	6	0	7	8	6	21	27	0
TS	San Dorligo	Domio	100	1	0	2	0	1	0	0	2	0	1	3	3	6	0
TS	San Dorligo	Caresana	100	4	0	2	1	4	4	0	0	0	0	6	0	6	5
TS	Muggia	S.Barbara	100	4	0	1	2	1	5	0	0	0	1	2	1	3	7
TS	Muggia	Darsella di Chiampore	100	3	1	1	0	6	3	3	0	6	11	8	20	28	3
TS	Muggia	Chiampore	100	1	0	0	1	0	4	0	0	0	5	0	5	5	5

Tabella 5–DIFESA BIOLOGICA: Infestazioni *Bactrocera oleae* alla 41° settimana

Provincia	Comune	Località	No. Frutti	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. Età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% INFESTAZIONE TOTALE	% MORTALITA' I e II età
UD	Cividale	Spessa	100	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	0
GO	Sagrado	Sagrado	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TS	Duino Aurisina	Medeazza	100	0	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	3	6	9	0
TS	San Dorligo d. V.	San Giuseppe	100	1	1	2	0	1	0	2	0	2	0	1	4	5	9	0
TS	San Dorligo d. V.	Dolga Krona	100	2	0	3	0	2	0	2	0	2	0	2	5	6	11	0

GESTIONE DELLA COLTURA E RACCOLTA

Si consiglia di mantenere falciato il manto erboso sotto-chioma in preparazione della raccolta.

Si raccomanda di programmare la raccolta rispettando rigorosamente il tempo di carenza del prodotto utilizzato per l'ultimo trattamento larvicida/adulticida o fungicida effettuato.

Ai fini dell'ottenimento di una migliore qualità dell'olio si consiglia di raccogliere le olive direttamente dalle piante eliminando quelle danneggiate dalle infestazioni della mosca o quelle cadute a terra.

La conservazione delle olive, in attesa della frangitura, deve avvenire in cassette forate in strati sottili in un locale fresco ben areato. La frangitura delle olive deve avvenire entro le 24-48 ore dalla raccolta.

Località	Varietà	Dinamometro gr.	Penetrometro gr/mm2	inviatura %
Sagrado	Leccino	420	240	80,00%
BIO	Grignano	430	300	80,00%
	Bianchera	700	420	0,00%
Selz	Leccino	460	290	70,00%
	Bianchera	580	420	0,00%
Medeazza	Leccino	460	320	40,00%
BIO	Grignano	600	300	30,00%
	Bianchera	700	430	0,00%
Sgonico	Leccino	520	370	40,00%
	Bianchera	630	440	0,00%
Contovello	Leccino	360	220	80,00%
	Maurino	330	270	70,00%
	Bianchera	600	410	0,00%
Caresana	Leccino	460	320	40,00%
	Bianchera	590	400	0,00%
Bagnoli	Leccino	430	300	90,00%
	Bianchera	650	400	5,00%
Domio	Leccino	420	330	60,00%
	Bianchera	600	400	5,00%
Dolga Krona	Leccino	470	340	60,00%
BIO	Bianchera	560	390	5,00%
Mocco	Leccino	470	330	70,00%
	Bianchera	500	420	5,00%
S. Barbara	Leccino	450	350	70,00%
	Bianchera	550	390	0,00%
Chiampore	Leccino	360	260	90,00%
	Bianchera	500	420	5,00%

APERTURA FRANTOI

In considerazione dell'apertura dei frantoi programmata in ottobre si consiglia di prenotare per tempo la molitura della produzione.

Elenco dei frantoi in Regione e zone limitrofe

- CIVIDALE – ITAS - Via dell'Istituto Tecnico Agrario 42; tel. 333 1064912
- RAGOGNA loc. Pignano – Frantoio Lizzi - Via Pellegrino da S. Daniele 3; tel.333 2069947
- PALAZZOLO DELLO STELLA - Frantoio Olistella - via casali Moretton 30/b; tel. 339 7826173
- TRIESTE - Agricola di Trieste Soc. Coop. - Via Travnik 10; tel. 040 8990111
- TRIESTE - Parovel Group. S.r.l. - Zona Artigianale Dolina 546; tel. 040 227050 040 8326364
- DOBROVO (SLO); tel. 386 31523894; 386 53044053
- CAPPELLA MAGGIORE (Tv) - Cooperativa REITIA - Via Cal Alta 57; tel. 0438 930221; cell. 3774143149
- LISJAK – Slovenia Šalara 28b, 6000 Koper, Slovenija t: +386 40 294 248/+386 31 893 378

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 335-7543021 cell. 340-5563626