

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO n° 14 del 26 luglio 2019

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni date con il presente bollettino consentono agli operatori di attuare la **difesa integrata obbligatoria** ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, indicazioni operative sulle principali colture relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III D.lgs. 150/2012).

Le indicazioni fornite nei bollettini fanno riferimento alle diverse aree produttive della regione e non esauriscono le possibili situazioni di dettaglio, che vanno monitorate e valutate a livello aziendale.

Quando espressamente precisato, forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della **difesa integrata volontaria** (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e misure agroclimatico ambientali del PSR FVG 2014-2020). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti" del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia, pubblicate sul sito dell' ERSA al seguente link: <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2019/>

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

REVISIONE EUROPEA DEL RAME

Con Reg. (UE) n. 2018/1981 le s.a. contenenti rame sono state rinnovate per 7 anni fino al 31 dicembre 2025 e sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a **28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni** (mediamente **4 kg all'anno/ettaro**).

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Nel fine settimana si prevede la formazione sull'Alto Adriatico di una depressione che favorirà condizioni di marcata instabilità con temporali e piogge abbondanti e intense nei primi giorni della prossima settimana.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul www.osmer.fvg.it

FENOLOGIA

La fase fenologica prevalente in tutti gli areali è quella di indurimento del nocciolo. Solo in alcune zone interne più fresche è stata rilevata ancora la fase di pre-indurimento del nocciolo. Dopo le prossime poggie inizierà la fase di accrescimento del frutto.



SITUAZIONE FITOSANITARIA

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)

Tabella: Stazioni per monitoraggio e catture Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)

Provincia	Comune	Località	19° sett.	20° sett.	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.
PN	Caneva	Fiaschetti		3	4	16	107	152	205	82	201A5G	47A67G	A14	A77 G20
UD	Ragogna	Molinaro		1	6	157	52	17	41	22	3A31G	NP	A7	A112 G8
UD	Gemona bio	Facchin		1	2	9	80	40	79	37	5A642G	1A224G	A4G12	A20 G31
UD	Cividale	Galiano		2	1	0	6	58	151	35	10A15G	0A71G	A2	A109 G0

I dati del monitoraggio regionale della cimice asiatica possono essere consultabili al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/cimice-marmorata-asiatica-halyomorpha-halis-stagione-2019/>

Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

I voli della generazione carpo-faga della tignola si stanno concludendo come evidenziato dalle catture settimanali ormai di trascurabile entità in tutti gli areali (vedi tabella 1).

Tabella 1: catture tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Provincia	Comune	Località	19° sett.	20° sett.	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.
<i>Pedemontana Pordenonese</i>														
PN	Caneva bio	Fiaschetti		13	8	8	8	15	20	98	52	0	0	-
PN	Caneva	Demarco		3	0	1	0	0	8	7	5	0	0	-
<i>Colline del Friuli</i>														
UD	Tarcento	Riviera		33	34	1	12	4	8	21	24	6	0	-
UD	Ragogna	Molinaro		8	2	1	1	0	4	2	14	5	0	-
UD	Gemona bio	Facchin		1	0	0	0	0	0	4	19	0	0	-
<i>Alta Pianura Friulana</i>														
UD	Cividale	Galiano		45	28	23	14	0	10	147	35	5	0	-
UD	Udine	Servadei		-	-	-	-	-	-					
UD	Cividale	Spessa		-	0	71	-	-	55	29	8	2	0	6
<i>Bassa Pianura Friulana</i>														
UD	Castions di Strada	Ellis		-	120	14	0	0	27	150	75	40	0	-
UD	Latisana	Lorenzonetto		0	0	0	0	0	0	107	55	0	0	-
<i>Collio goriziano e isontino</i>														
GO	San Floriano	Giasbana			0	28	15	2	73	45	18	2	1	4
GO	Cormons	Monte Quarin			0	41	1	0	49	38	11	1	3	7
GO	Ronchi	Selz			100	20	0	0	40	35	6	0	2	1
GO	Sagrado	Sagrado			4	128	0	2	80	16	9	1	2	4
<i>Trieste provincia</i>														
TS	Duino Aurisina	Sgonico			5	20	0	1	1	0	6	0	1	0
TS	Trieste	S.Croce			37	47	12	3	2	20	21	2	0	2
TS	Trieste	Campanelle			0	62	8	2	45	13	11	1	2	3
TS	San Dorligo	Moccò			100	63	40	2	110	210	77	0	4	14
TS	San Dorligo	Bagnoli			103	22	9	5	103	132	41	1	2	5
TS	San Dorligo	Domio			97	15	15	4	66	134	49	0	1	2
TS	San Dorligo	Caresana			45	3	15	0	31	32	10	0	3	10
TS	Muggia	S.Barbara			18	10	15	0	47	86	18	1	2	4
TS	Muggia	Darsella			136	3	15	0	123	156	60	5	1	6
TS	Muggia	Pisciolon			37	3	15	0	58	88	22	3	0	4
TS	Muggia	Darsella 2			205	19	-	-	260	0	51			
TS	Duino Aurisina	Medeazza			55	54	30	0	7	71	29	0	1	5
TS	San Dorligo	San Giuseppe			103	18	2	1	101	70	22	0	2	4
TS	San Dorligo	Dolga Krona			157	3	0	4	102	143	46	3	11	2

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

Le elevate temperature dei giorni scorsi con picchi superiori ai valori normali hanno contribuito a limitare i voli del dittero e le infestazioni nelle drupe.

Negli oliveti in cui sono stati effettuati trattamenti adulticidi con esche proteiche (Spinosad) è stata riscontrata una riduzione significativa dei voli della mosca olearia (vedi tabella 2).

Le infestazioni nelle drupe si stanno diffondendo negli areali costieri mantenendosi sotto la soglia d'intervento (vedi tabella 3).

Tabella 2: catture mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

Provincia	Comune	Località	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.	29° sett.	30° sett.
Pedemontana Pordenonese								
PN	Caneva	Stevenà		0	0	4	9	5
PN	Caneva	Demarco camp.O		0	0	3	2	0
PN	Polcenigo	Coltura		0	0	8	11	3
PN	Aviano	Basaldella		0	0	3	13	6
PN	Caneva	Casagrande bio		0	0	3	13	13
Colline Friulane								
PN	Pinzano	Perisinotto		0	0	1	6	1
UD	Ragogna	Villuzza		0	0	3	6	3
UD	Osoppo	Venturini camp.O		0	1	1	9	7
UD	Tarcento	Sottoriviera		0	0	2	6	11
UD	Tricesimo	Adorgnano		0	0	1	9	7
UD	Faedis	Campeggio		0	0	1	3	6
UD	Gemona	Facchin bio		0	3	4	10	5
Alta Pianura Friulana								
UD	Rodeano	Coseanetto camp		0	0	1	11	4
UD	Martignacco	Delendi		0	0	0	1	1
UD	Cividale	Ducale camp.		0	0	2	3	3
UD	Cividale	Gagliano camp.		0	0	3	7	5
UD	Buttrio	Caminetto		0	0	0	0	3
UD	Dignano	Vale						
UD	Cividale	Spessa bio				0	4	0
Bassa Pianura Friulana								
UD	Castions di St	Ellis camp.		0	0	0	0	0
UD	Pertegada	Lorenzonetto		0	0	0	7	2
Collio goriziano e Isontino								
GO	San Floriano	Giasbana				0	4	1
GO	Cormons	Monte Quarin				0	2	1
GO	Ronchi	Selz				0	3	1
GO	Sagrado	Sagrado				0	2	2
Trieste provincia								
TS	Sgonico	Sgonico				0	3	0
TS	Duino Aurisina	Contovello				0	5	0
TS	Trieste	Campanelle				2	11	6
TS	San Dorligo	Moccò				0	5	5
TS	San Dorligo	Bagnoli				3	6	11
TS	San Dorligo	Domio				5	5	1
TS	San Dorligo	Caresana				0	2	5
TS	Muggia	S.Barbara				0	3	0
TS	Muggia	Darsella				1	8	1
TS	Muggia	Pisciolon				1	2	3
TS	Duino Aurisina	Medeazza				0	13	6
TS	San Dorligo	San Giuseppe				0	8	3
TS	San Dorligo	Dolga Krona				0	7	0

Tabella 3–DIFESA INTEGRATA: Infestazioni *Bactrocera oleae* alla 30° settimana

Provincia	Comune	Località	No. frutti	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. Età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. Età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% INFESTAZIONE TOTALE	% MORTALITA' I e II età
Alta Pianura Friulana																		
UD	Cividale	Spessa bio	100	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Collio goriziano e isontino																		
GO	San Floriano	Giasbana	100	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GO	Cormons	Monte Quarin	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GO	Ronchi	Selz	100	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GO	Sagrado		100	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Trieste provincia																		
TS	Sgonico	Sgonico	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TS	Duino Aurisina	Contovello	100	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0
TS	Trieste	Campanelle	100	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
TS	San Dorligo	Moccò	100	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
TS	San Dorligo	Bagnoli	100	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1
TS	San Dorligo	Domio	100	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
TS	San Dorligo	Caresana	100	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
TS	Muggia	S.Barbara	100	2	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1
TS	Muggia	Darsella	100	1	1	0	4	4	1	0	0	0	0	0	5	0	5	5
TS	Muggia	Pisciolon	100	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	6	0	6	1
TS	Duino Aurisina	Medeazza	100	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1
TS	San Dorligo	San Giuseppe	100	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
TS	San Dorligo	Dolga Krona	100	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0

Disseccamenti della chioma

Qualora si riscontrassero disseccamenti fogliari anomali o di interi rametti o branche, anche di singole piante e soprattutto a carico di giovani piante, si consiglia di rivolgersi ai numeri sottostanti per un sopralluogo dei tecnici ERSA e un eventuale prelievo di materiale da sottoporre ad analisi di laboratorio.

DIFESA FITOSANITARIA

Occhio di Pavone (*Spilocaea oleagina*)

In questo periodo non sono necessari trattamenti fitosanitari contro questa patologia.

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

DIFESA ADULTICIDA – Nelle località in cui, dopo le piogge previste dei prossimi giorni, si rileveranno catture di adulti soprattutto se crescenti rispetto la settimana precedente si consiglia di proseguire con un intervento adulticida specifico (con esche proteiche oppure con l'installazione di trappole Attract and kill o con trappole di cattura massale).

Si consiglia di contattare il tecnico di zona per informazioni più dettagliate sulle modalità e i criteri degli specifici interventi nelle rispettive località.

DIFESA LARVICIDA – Non si consigliano trattamenti larvicidi.

GESTIONE DELLA CULTURA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270-262

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021