

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO n° 3 del 10 maggio 2019

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni date con il presente bollettino forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della **difesa integrata obbligatoria** ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012.

Vengono fornite anche le indicazioni in merito alle strategie di **difesa integrata volontaria** che sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale (DPI) e vincolanti al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e misure agroclimatico ambientali del PSR FVG 2014-2020.

Il Disciplinare di Produzione Integrata – norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia a cui fare riferimento per la stagione produttiva 2019, con i relativi aggiornamenti normativi è stato pubblicato sul sito dell' ERSA al seguente link: <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2019/>

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

REVISIONE EUROPEA DEL RAME

Con Reg. (UE) n. 2018/1981 le s.a. contenenti rame sono state rinnovate per 7 anni fino al 31 dicembre 2025 e sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a **28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni** (mediamente **4 kg all'anno/ettaro**).

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Per i prossimi giorni è previsto tempo instabile con possibili piogge sparse ed intermittenti; Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

FENOLOGIA

Negli areali regionali si rilevano fasi fenologiche differenziate in relazione alle varietà e alle temperature delle zone diverse. Nei comprensori interni le piante si trovano prevalentemente nello stadio di accrescimento dei germogli e di inizio mignolatura mentre nei comprensori costieri più caldi si rileva lo crescita dell'infiorescenza con distensione/allungamento delle mignole. In generale si osserva un ritardo vegetativo rispetto all'anno precedente.



SITUAZIONE FITOSANITARIA

Occhio di Pavone

Dai rilievi effettuati la patologia si riscontra in tutti gli oliveti ove persistono condizioni favorevoli allo sviluppo del micete, ad esempio negli areali di pianura, e in particolar modo sulle varietà sensibili (es. bianchera). La difesa dal fungo viene eseguita in maniera preventiva.

CIMICE ASIATICA

L'insetto sta uscendo dai ricoveri invernali tuttavia le basse temperature ne limitano la mobilità. Sono stati osservati i primi accoppiamenti. Nei prossimi bollettini verranno date specifiche indicazioni. Il giorno 7 maggio sono state posizionate le trappole di monitoraggio per *Halyomorpha halys*.

Stazioni per monitoraggio Cimice Asiatica			7 mag.
PROV.	Comune	Località	
PN	Caneva bio	FiaschettiUD	
UD	Ragogna	Molinaro	
UD	Gemona bio	Facchin	
UD	Cividale	Galiano	
GO	Ronchi dei Legionari		
TS	San Dorligo della valle	Montedoro	
TS	San Dorligo della valle	Monte Celo	
TS	Muggia		
TS	Muggia	D. S. Bartolomeo	
TS	Duino-Aurisina	Aurisina	

TIGNOLA DELL'OLIVO

Il giorno 7 maggio sono state posizionate le trappole di monitoraggio per Prays oleae

Pedemontana Pordenonese			7 mag.
PROV.	Comune	Località	
PN	Caneva bio	Fiaschetti	
PN	Caneva	Demarco	
Colline del Friuli			7 mag.
UD	Tarcento	Riviera	
UD	Ragogna	Molinaro	
UD	Gemona bio	Facchin	
Alta Pianura Friulana			7 mag.
UD	Cividale	Galiano	
Bassa Pianura Friulana			7 mag.
UD	Castions di S.	Ellis	
UD	Latisana	Lorenzonetto	

DIFESA FITOSANITARIA

OCCHIO DI PAVONE: Il perdurare di condizioni meteo perturbate favoriscono l'insorgere e lo sviluppo delle infezioni fungine. Effettuare un trattamento preventivo preferibilmente con prodotti a base di rame o dodina.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.
PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.

GESTIONE DELLA COLTURA

Il trattamento fogliare con prodotti a base di boro, microelemento importante per favorire l'allegagione, nel periodo di pre-fioritura deve essere effettuato nel momento più prossimo alla fioritura.

Non miscelare il prodotto con altri antiparassitari.

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270-262

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021