

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO n° 2 del 19 aprile 2019

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni date con il presente bollettino forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della **difesa integrata obbligatoria** ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012.

Vengono fornite anche le indicazioni in merito alle strategie di **difesa integrata volontaria** che sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale (DPI) e vincolanti al fine della certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e misure agroclimatico ambientali del PSR FVG 2014-2020.

Il Disciplinare di Produzione Integrata – norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia a cui fare riferimento per la stagione produttiva 2019, con i relativi aggiornamenti normativi è stato pubblicato sul sito dell' ERSA al seguente link: <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2019/>

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

REVISIONE EUROPEA DEL RAME

Con Reg. (UE) n. 2018/1981 le s.a. contenenti rame sono state rinnovate per 7 anni fino al 31 dicembre 2025 e sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a **28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni** (mediamente **4 kg all'anno/ettaro**).

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

FENOLOGIA

Le fasi fenologiche riscontrate prevalentemente nei comprensori sono disomogenee e si differenziano in relazione alle varietà e alle diverse condizioni climatiche delle zone e località. Negli areali costieri più caldi si rileva la comparsa delle infiorescenze e l'inizio mignolatura, mentre nelle zone interne più fresche prosegue lo sviluppo vegetativo dei germogli apicali e laterali delle piante.



SITUAZIONE FITOSANITARIA

OCCHIO DI PAVONE (*Spillocaea oleaginea*)

Nelle zone dove esistono condizioni predisponenti allo sviluppo del patogeno e si possono osservare defogliazioni dovute alle infezioni dell'annata precedente, soprattutto nelle parti più basse della chioma oppure sulle foglie sono visibili ancora le infezioni dell'anno scorso, sulle varietà più suscettibili (es.: Bianchera, ecc.), si consiglia di effettuare un trattamento fitosanitario con prodotti a base di rame oppure con dodina per proteggere la nuova vegetazione.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura
UD-GO-PN cell. 3346564270-262
TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021