


## BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA/BIOLOGICA OLIVO n° 2 del 31 marzo 2020

### Speciale Potatura

La potatura dell'olivo, oltre ad accrescere la produzione, migliorare sensibilmente la qualità e la distribuzione dei trattamenti fitosanitari, mira anche a migliorare la forma della pianta che naturalmente tende a crescere in maniera eccessiva e disordinata con una chioma che tende verso l'esterno diventando simile a un cespuglio. Questa irregolarità sottrae anche la luce ai rami più produttivi danneggiandone la resa in termine di fruttificazione.

La forma di allevamento caldeggiata per in nostri areali è quella a **vaso policonico** in quanto, alle nostre latitudini, permette il miglior irraggiamento della chioma ed inoltre:

- rispetta la fisiologia della pianta garantendo un buon equilibrio vegeto-produttivo
- la potatura negli anni successivi è facilitata
- la raccolta e i trattamenti sono facilitati



Per una corretta potatura è importante ricordare alcune regole fondamentali:

- individuare le 3 – 4 branche principali con una inclinazione di 45 gradi circa;
- eliminare a raso i rami dorsali delle branche principali svuotando la parte centrale della chioma;
- individuare l'apice vegetativo della branca alleggerendolo nella parte interna ed eliminando i competitori.

Mantenendo i principi sopra elencati dovremo interpretare la potatura in base alle esigenze delle singole piante tenendo in considerazione in particolare la varietà, la vigoria, il portamento e la densità della chioma.



## **AGGIORNAMENTI NORMATIVI**

### **REVISIONE EUROPEA DEL RAME**

Con Reg. (UE) n. 2018/1981 le s.a. contenenti rame sono state rinnovate per 7 anni fino al 31 dicembre 2025 e sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a **28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni** (mediamente **4 kg all'anno/ettaro**).

## **SITUAZIONE METEOROLOGICA**

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito [www.osmer.fvg.it](http://www.osmer.fvg.it)

## **SITUAZIONE FITOSANITARIA**

### **Occhio di Pavone**

Dai monitoraggi effettuati non appaiono attualmente nuove infezioni di occhio di pavone. La cascola di foglie presente specialmente sulla varietà bianchera è da attribuire alle persistenti piogge autunnali che hanno creato un ambiente molto favorevole al fungo.

### **Cimice asiatica**

Le temperature di metà marzo hanno riattivato gli adulti svernanti di *Halyomorpha halys* e in questi giorni si è iniziata la posa delle trappole di monitoraggio.

### **STRATEGIE DI DIFESA**

Al termine delle operazioni di potatura è consigliabile effettuare un trattamento a base di rame prediligendo formulati a maggiore resistenza al dilavamento. Il rame in questa fase oltre ad esplicare un efficace azione fungicida favorisce la disinfezione e la cicatrizzazione dei tagli di potatura.

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura  
UD-GO-PN cell. 3346564262; 3389385559  
TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021