

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 11 del 16 agosto 2022

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Mercoledì la regione sarà interessata dalla presenza di un temporaneo promontorio di alta pressione. Giovedì e venerdì una saccatura atlantica associata a correnti umide sud-occidentali determinerà un generale aumento dell'instabilità.. Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA

In tutte le zone e per tutte le varietà siamo alla fase di secondo accrescimento del frutto.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Le piogge si sono verificate a macchia di leopardo sul territorio pertanto ove non si sono verificate, se possibile, intervenire con un'adeguata irrigazione.

Mosca delle olive (*Dacus oleae*)

Nelle località monitorate si registrano le prime infestazioni vitali sulle drupe. Nel mugugano inoltre si riscontrano le prime pupe vitali. Tabella 1 catture di mosca

PROV.	Comune	Località	26	27	28	29	30	31	32
PN	Caneva	Stevenà	0	0	9	0	5	0	1
PN	Caneva	Demarco	1	1	4	0	3	3	0
PN	Caneva	Fiaschetti Bio	0	0	0	0	0	0	0
PN	Pinzano		0	3	1	1	0	1	0
UD	Ragogna	Viluzza	0	0	0	1	0	0	0
UD	Osoppo		1	0	0	0	5	1	0
UD	Tricesimo	Adornano	9	2	0	2	1	6	0
UD	Povoletto	Salt	-	0	1	0	1	0	0
UD	Gemona	Taboga Bio	-	-	3	3	0	0	0
UD	Rodeano	Coseanetto	0	1	1	1	1	1	1
UD	Cividale	Spessa Bio	-	0	0	0	0	0	0
UD	Cividale		-	0	0	1	0	0	0
UD	Castions di Strada		-	0	1	0	0	2	0

UD	Gonars	Fauglis	-	0	0	0	0	0	0
GO	Sagrado	Sagrado Bio	-	0	1	-	0	0	-
GO	Ronchi	Selz	-	0	0	0	1	1	1
TS	Duino Aurisina	Medeazza Bio	-	0	3	-	5	0	0
TS	Duino Aurisina	Sgonico	-	1	1	0	0	0	0
TS	Trieste	Contovello	-	0	0	1	0	0	0
TS	Trieste	Campanelle	-	0	1	2	1	0	1
TS	San Dorligo	Bagnoli	-	0	2	2	0	0	1
TS	San Dorligo della Valle	San Giuseppe Bio	-	0	1	1	0	1	0
TS	San Dorligo della Valle	Dolga Krona Bio	-	0	0	0	0	0	0
TS	San Dorligo	Montedoro	-	1	11	11	5	2	2
TS	San Dorligo	Caresana	-	0	0	0	0	0	2
TS	Muggia	S.Barbara	-	0	2	1	1	0	0
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	-	4	5	2	0	1	1



STRATEGIE DI DIFESA

Mosca dell'olivo

Gli abbassamenti termici favoriscono le ovideposizioni di mosca. Si consiglia l'installazione delle trappole di cattura massale per abbassare le popolazioni degli adulti soprattutto negli oliveti che presentano storicamente catture elevate. In alternativa è consigliabile effettuare una copertura con caolino/zeolite con l'aggiunta di adesivanti per aumentare la durata della copertura; tale trattamento funge da repellente alla mosca olearia e aiuta allo stesso tempo la pianta a combattere lo stress

da eccessi di calore e mancanza idrica. È possibile utilizzare anche l'esca adulticida a base di Spinosad o Cyantraniliprole (molecola non presente nel disciplinare di lotta integrata volontaria) nei comprensori con presenza di mosca (vedi tabella 1). Non vi sono le condizioni per eseguire un intervento larvicida.

Occhio di pavone

Si consiglia di verificare la pioggia cumulata dopo l'ultimo trattamento rameico eseguito. Se supera i 50 mm si consiglia di ripristinare la copertura in special modo in varietà sensibili alla malattia es. bianchera.

Eventi grandigeni

Qualora i temporali fossero accompagnati da grandine si consiglia di intervenire entro 24-48 ore dall'evento grandigeno con prodotti rameici al fine di favorirne la cicatrizzazione delle ferite.

Gestione agronomica

Si consiglia di iniziare le operazioni di gestione del verde eliminando i succhioni dorsali presenti sulle branche principali e quelli presenti alla base del fusto.

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura
cell. 3346564262; 3389385559