

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 13 del 29 agosto 2022

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Fino a martedì prevarrà una fase anticiclonica ma con aria ancora relativamente calda e umida che favorirà una certa instabilità pomeridiana. Tra mercoledì e giovedì il passaggio di un fronte sul nord Italia porterà fenomeni più diffusi.. Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersa al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA

Continua la fase di secondo accrescimento del frutto, nelle zone più anticipate è iniziata l'invaiaitura delle varietà precoci

Mosca delle olive (*Dacus oleae*)

Nelle località monitorate si registrano le prime infestazioni vitali sulle drupe. Nella zona di Montedoro e di Muggia si registrano diverse ovideposizioni e larve di mosca.
Tabella 1 catture di mosca

PROV.	Comune	Località	26	27	28	29	30	31	32	33	34
PN	Caneva	Stevenà	0	0	9	0	5	0	1	1	1
PN	Caneva	Demarco	1	1	4	0	3	3	0	0	1
PN	Caneva	Fiaschetti Bio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PN	Pinzano		0	3	1	1	0	1	0	0	3
UD	Ragogna	Viluzza	0	0	0	1	0	0	0	0	0
UD	Osoppo		1	0	0	0	5	1	0	0	0
UD	Tricesimo	Adornano	9	2	0	2	1	6	0	1	0
UD	Povoletto	Salt	-	0	1	0	1	0	0	0	0
UD	Gemona	Taboga Bio	-	-	3	3	0	0	0	4	0
UD	Rodeano	Coseanetto	0	1	1	1	1	1	1	0	0
UD	Cividale	Spessa Bio	-	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Cividale		-	0	0	1	0	0	0	0	0
UD	Castions di Strada		-	0	1	0	0	2	0	0	0
UD	Gonars	Fauglis	-	0	0	0	0	0	0	0	0
GO	Sagrado	Sagrado Bio	-	0	1	-	0	0	-	-	0
GO	Ronchi	Selz	-	0	0	0	1	1	1	0	1

TS	Duino Aurisina	Medeazza Bio	-	0	3	-	5	0	0	0	0
TS	Duino Aurisina	Sgonico	-	1	1	0	0	0	0	0	0
TS	Trieste	Contovello	-	0	0	1	0	0	0	0	1
TS	Trieste	Campanelle	-	0	1	2	1	0	1	2	1
TS	San Dorligo	Bagnoli	-	0	2	2	0	0	1	0	1
TS	San Dorligo della Valle	San Giuseppe Bio	-	0	1	1	0	1	0	0	1
TS	San Dorligo della Valle	Dolga Krona Bio	-	0	0	0	0	0	0	1	3
TS	San Dorligo	Montedoro	-	1	11	11	5	2	2	9	26
TS	San Dorligo	Caresana	-	0	0	0	0	0	2	0	0
TS	Muggia	S.Barbara	-	0	2	1	1	0	0	2	1
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	-	4	5	2	0	1	1	3	6

Le catture sono da riferirsi ad aziende che hanno effettuato la lotta secondo quanto indicato dai bollettini

STRATEGIE DI DIFESA

Mosca dell'olivo

In crescita le catture dell'adulto di Mosca dell'olivo, ma non in tutti gli areali. Gli abbassamenti termici favoriscono le ovideposizioni di mosca. Si consiglia l'installazione delle trappole di cattura massale per abbassare le popolazioni degli adulti soprattutto negli oliveti che presentano storicamente catture elevate o in alternativa l'utilizzo di esca adulticida. Inoltre è consigliabile effettuare o ripristinare la copertura qualora dilavata di caolino/zeolite con l'aggiunta di adesivanti per aumentare la durata della copertura. Attualmente non vi sono le condizioni per effettuare trattamenti larvicidi. Tabella 2 disciplinare produzione integrata volontaria

Mosca delle olive (<i>Bactrocera oleae</i>)	Soglia di intervento: - Per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture.	<i>Opis concolor</i> (1) <i>Beauveria bassiana</i>	(1) 1 lanci di questo parassitoide vanno programmati con i centri di assistenza tecnica regionali o zonali.
	- Per le olive da olio: in funzione delle varietà 5 - 10 % di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve). Interventi chimici: Nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa, pertanto l'intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture. Nelle olive da olio effettuare interventi: - <u>preventivi (adulticidi)</u> : con esche proteiche avvelenate con Acetamiprid o Spinosad intervenendo alle primissime infestazioni o applicando il metodo "Attract and Kill" utilizzando trappole innescate con feromone o attrattivi alimentari e impregnate con Deltametrina o Lambdacialotrina - <u>curativi (nei confronti delle larve)</u> : al superamento della soglia intervenire, nelle prime fasi di sviluppo della mosca (uovo e larva di prima età).	Pannelli attrattivi, esche proteiche e sistemi tipo "Attract and kill" Spinosad (2) Trattamenti a tutta chioma con: (3) Fosmet (4) Acetamiprid (5)(6)	(2) Applicazioni con specifica esca pronta all'uso. Al massimo 8 interventi all'anno. (3) Sono autorizzati al massimo 2 interventi per la difesa curativa (controllo delle larve) indipendentemente dalla s.a. utilizzata. (4) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (6) Impiegabile solo in post fioritura.

Occhio di pavone

Si consiglia di verificare la pioggia cumulata dopo l'ultimo trattamento rameico eseguito. Se supera i 50 mm si consiglia di ripristinare la copertura in special modo in varietà sensibili alla malattia es. bianchera.

Gestione agronomica

Si consiglia di ultimare le operazioni di gestione del verde eliminando i succhioni dorsali presenti sulle branche principali e quelli presenti alla base del fusto.

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura
cell. 3346564262; 3389385559