

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO n° 9 del 01 agosto 2022

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Sulla regione affluiscono in quota correnti da nord-ovest che favoriscono la stabilità, ma che tra lunedì sera e martedì faranno passare anche un modesto fronte atlantico con aumento dell'instabilità. Da mercoledì si affermerà ancora l'anticiclone caldo nord-africano.. Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersa al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA

In quasi tutte le zone e per tutte le varietà siamo alla fase di secondo accrescimento del frutto.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Per contenere gli stress termici causati dalle temperature elevate e l'assenza di acqua nel suolo intervenire con un'adeguata irrigazione. Chi non avesse la possibilità di irrigare può effettuare un trattamento con polveri di roccia (caolino) in quanto riducono l'evapotraspirazione e la temperatura della chioma.

Mosca delle olive (*Dacus oleae*)

Sono state rilevate le prime catture in alcune stazioni di monitoraggio (vedi Tabella 1)

PROV.	Comune	Località	26	27	28	29	30
PN	Caneva	Stevenà	0	0	9	0	5
PN	Caneva	Demarco	1	1	4	0	3
PN	Caneva	Fiaschetti Bio	0	0	0	0	0
PN	Pinzano		0	3	1	1	0
UD	Ragogna	Viluzza	0	0	0	1	0
UD	Osoppo		1	0	0	0	5
UD	Tricesimo	Adorgnano	9	2	0	2	1
UD	Povoletto	Salt	-	0	1	0	1
UD	Gemona	Taboga Bio	-	-	3	3	0
UD	Rodeano	Coseanetto	0	1	1	1	1

UD	Cividale	Spessa Bio	-	0	0	0	0
UD	Cividale		-	0	0	1	0
UD	Castions di Strada		-	0	1	0	0
UD	Gonars	Fauglis	-	0	0	0	0
GO	Sagrado	Sagrado Bio	-	0	1	-	0
GO	Ronchi	Selz	-	0	0	0	1
TS	Duino Aurisina	Medeazza Bio	-	0	3	-	5
TS	Duino Aurisina	Sgonico	-	1	1	0	0
TS	Trieste	Contovello	-	0	0	1	0
TS	Trieste	Campanelle	-	0	1	2	1
TS	San Dorligo	Bagnoli	-	0	2	2	0
TS	San Dorligo della Valle	San Giuseppe Bio	-	0	1	1	0
TS	San Dorligo della Valle	Dolga Krona Bio	-	0	0	0	0
TS	San Dorligo	Montedoro	-	1	11	11	5
TS	San Dorligo	Caresana	-	0	0	0	0
TS	Muggia	S.Barbara	-	0	2	1	1
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	-	4	5	2	0



STRATEGIE DI DIFESA

Cimice Asiatica (*Halyomorpha halis*)

Con l'indurimento del nocciolo la sensibilità alla cascola precoce data dalla puntura trofica della cimice cala drasticamente pertanto generalmente non sono richiesti trattamenti specifici

Mosca dell'olivo

Le temperature superiori ai 30 gradi aumentano la mortalità delle uova di mosca. Si consiglia l'installazione delle trappole di cattura massale per abbassare le popolazioni degli adulti soprattutto negli oliveti che presentano storicamente catture elevate. In alternativa è consigliabile effettuare una copertura con caolino/zeolite con l'aggiunta di adesivanti per aumentare la durata della copertura; tale trattamento funge da repellente alle ovideposizioni della mosca olearia e aiuta allo stesso tempo la pianta a combattere lo stress da eccessi di calore e mancanza idrica. È possibile utilizzare anche l'esca adulticida a base di Spinosad o Cyantraniliprole (molecola non presente nel disciplinare di lotta integrata volontaria) nei comprensori con presenza di mosca (vedi tabella 1).

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura
cell. 3346564262; 3389385559