



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Bollettino Difesa Integrata n° 18 del 14/09/2023

Andamento meteo

Nei prossimi giorni non sono previste precipitazioni di rilievo, le temperature subiranno un lieve calo rispetto alla media.

Fenologia

In tutti gli areali la fenologia per la varietà Bianchera e Leccino è di secondo accrescimento del frutto. Nella zona di Muggia e nelle piante con poche olive è iniziata la maturazione della varietà Maurino e Leccino.



Foto: Maurino zona Muggia



Foto: Leccino: zona San Dorligo della Valle

Insetti:

- *Mosca dell'olivo (B. oleae)*

In questa settimana in diverse località sono state rilevate catture in flessione del fitofago.



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
 c/o Camera di commercio di Trieste
 Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
 Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
 San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
 FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale



Foto: Larva di mosca olearia di 1° età



Foto: Larva di Mosca olearia di 3° età

Difesa: Visto il continuo aumento di adulti di mosca olearia, viene consigliato l' utilizzo di prodotti adulticidi per ridurre la presenza di adulti e rallentare l' infestazione, qualora si utilizzi il caolino/zeolite come repellente e le recenti piogge abbiano dilavato la copertura è consigliato il ripetersi dell' intervento.

Dall' analisi delle olive per calcolare l' infestazione è emerso che le olive trattate con caolino presentano una bassa o nulla infestazione rispetto a quelle trattate con prodotti adulticidi e soprattutto verso il campione non trattato.

Dov' è stato utilizzato il prodotto larvicida si rileva una totale mortalità di larve di prima età che si nutrono del primo strato di polpa dell' oliva, mentre si ha una lieve o nulla mortalità delle larve di seconda o terza età che tendono a nutrirsi della polpa della drupa, verso il nocciolo.

Monitorare attentamente lo stato di infestazione del proprio oliveto

Prov.	Comune	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% INFESTAZIONE TOTALE
PN	Caneva	24	28	52
UD	Coseanetto	2	16	18
UD	Osoppo	0	0	0
UD	Gemona	10	48	58
UD	Polovetto	0	4	4
UD	Cividale	11	25	36
UD	Cividale	2	20	22
UD	Gonars	11	33	44
UD	Latisana	0	0	0
GO	Sagrado	5	21	26
GO	Ronchi	6	23	29
TS	Duino Aurisina	3	13	16
TS	Duino Aurisina	0	7	7
TS	Trieste	9	21	30
TS	Trieste	10	13	23
TS	San Dorligo	8	26	34
TS	San Dorligo della Valle	6	24	30
TS	San Dorligo della Valle	9	29	38
TS	San Dorligo	2	21	23
TS	San Dorligo	7	22	29
TS	Muggia	9	23	32
TS	Muggia	1	17	18

Tabella: Infestazione settimanale



Prov.	Comune	Località	n° catture mosca
PN	Caneva	Casagrande	16
PN	Caneva	Del marco	52
PN	Caneva	Stevenà	47
PN	Aviano	Aviano	0
UD	Coseanetto	Rive d' arcano	14
UD	Osoppo	Osoppo	12
UD	Gemona	Gemona	19
UD	Tricesimo	Tricesimo	0
UD	Ragogna	Ragogna	45
UD	Polovetto	Povoletto	14
UD	Pinzano	Pinzano	29
UD	Cividale	Spessa	7
UD	Cividale	Cividale	12
UD	Castions di Strada	Castions di Strada	12
UD	Gonars	Fauglis	24
UD	Carlino	Carlino	0
UD	Latisana	Latisana	0
GO	Sagrado	Sagrado	1
GO	Ronchi	Selz	26
TS	Duino Aurisina	Slivia	4
TS	Duino Aurisina	Sgonico	21
TS	Trieste	Contovello	16
TS	Trieste	Campanelle	19
TS	San Dorligo	Bagnoli	3
TS	San Dorligo della Valle	Moccò	18
TS	San Dorligo della Valle	Dolga Krona	61
TS	San Dorligo	Montedoro	31
TS	San Dorligo	Caresana	8
TS	Muggia	S.Barbara	13
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	6

Tabella:
 catture settimanali
 mosca dell' olivo

- **Cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)**

Dalla lettura delle trappole si evidenzia un calo generale della presenza dell' insetto.

Difesa: Non sono consigliati trattamenti.

PUNTI MONITORAGGIO		Catture settimana
Comune	Località	11 set – 17 set
PN	Caneva	29 adulti + 7 neanidi
UD	Gemona	11 adulti
UD	Ragogna	16 adulti + 1 neanidi
UD	Cividale del Friuli	0
GO	Ronchi dei Legionari	1 neanide
TS	Sgonico	2 adulti e 11 neanidi
TS	Montedoro - San Dorligo della Valle	1 adulti + 3 neanidi
TS	Montecelo - San Dorligo della Valle	4 adulti + 40 neanidi
TS	Muggia	4 neanidi

Tabella: Catture settimanali Cimice marmorata asiatica

- **Margaronia (Palpita unionalis Hb)**

In parecchi areali è stata rilevata un'infestazione abbastanza importante di Margaronia, questo



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

lepidottero colpisce gli apici fogliari creando defogliatura più o meno marcata, talvolta colpisce anche le drupe asportandone una parte di polpa favorendo l'ingresso di altri patogeni secondari come funghi ed altri insetti.



Foto: azione trofica di Margaronia

Difesa: Si consiglia in caso di forte infestazione di ripetere il trattamento con bacillus Thuringensis, tale intervento si dovrà effettuare verso le ore serali per evitare che il batterio si devitalizzi.

Gestione agronomica

Effettuare sfalci e trinciature del manto erboso per ridurre il ristagno di umidità e per limitare lo sviluppo di patologie funginee (Occhio di Pavone o Piombatura).