



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa  REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Bollettino Difesa Integrata n° 11 del 04/07/2024

Andamento meteo

Tempo sereno con temperature in aumento.

Fenologia

Gli olivi presentano la fase fenologica di:

Bianchera : 1° ingrossamento del frutto

Leccino: 1° ingrossamento del frutto

Negli areali di Muggia, Montedoro e Trieste la Bianchera inizia la fase di pre indurimento del nocciolo.



Foto: pre indurimento nocciolo

Bianchera Zona s. Barbara

Malattie funginee

- *Piombatura (Pseudocercospora cladosporioides)*

Questa settimana sono stati osservate, in molte locations, parecchie infezioni funginee da Piombatura con evidenti segni di ingiallimenti fogliari e conseguente filloptosi (caduta delle foglie), a differenza dall'occhio di pavone (il quale presenta sulla parte superiore della foglia dei cerchi più o meno grandi), il fungo si presenta con una velatura grigia sulla pagina inferiore della foglia.



consorzio olio – konzorcij olja

tergeste d.o.p.

c/o Camera di commercio di Trieste

Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324

Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018

San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale



Foto: Foglie colpite da Piombatura

Difesa: l' intervento con prodotti a base di rame aiutano a contenere il fungo .

Insetti:

- **Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)**

Basse catture.

Difesa: non sono necessari trattamenti.

- **Margaronia (*Palpita Unionalis*)**

Viene rilevata la presenza nell' areale di San Dorligo della Valle, nell' udinese e nel goriziano.

Difesa: i trattamenti per la Tignola riducono la popolazione dell' insetto.



Foto: Margaronia



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa  REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

★ *Mosca dell'olivo (B. oleae)*

Si consiglia l'installazione della trappole di cattura massale (con durata 6 mesi) per contrastare in maniera preventiva il parassita.



Tabella: catture mosca dell'olivo nelle trappole di cattura massale

Difesa: si consiglia di utilizzare prodotti repellenti quali Caolino o Zeolite per evitare le ovideposizioni, si raccomanda l'utilizzo di un'adesivante per evitare che il prodotto venga dilavato.



Foto: trattamento con Caolino



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

- **Cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*)**

Dalle trappole installate e dall' analisi visiva sulle piante si rileva un aumento di neanidi di cimice in tutte le zone monitorate.



Foto: Cimice al quarto stadio

Difesa: In questa fase è fortemente consigliato l' utilizzo del caolino/zeolite con adesivante come repellente alle ovideposizioni, va ricordato che basta un ovatura di cimice presente sull' albero per azzerare la quantità di olive in 7/10 giorni.

Da questo anno è possibile utilizzare il piretro naturale come abbattente nei confronti delle neanidi di cimice asiatica; ovviamente deve esser applicato verso sera per massimizzare l' effetto.

In caso di infestazione elevata di neanidi di Cimice Asiatica si consiglia di contattare il tecnico di riferimento per valutare l' utilizzo di prodotti insetticidi abbattenti.



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa  REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

• *Cocciniglia mezzo grano pepe (Saissetia oleae)*



Foto: adulti di cocciniglia mezzo grano pepe

In diversi comprensori monitorati è stata rilevata la presenza della forma adulta della cocciniglia mezzo grano pepe.

Questo insetto per nutrirsi punge le varie parti della pianta, sottraendo linfa e causando un indebolimento della pianta.

Se non viene trattato adeguatamente, aumenta di numero negli anni e causa una progressiva riduzione della produzione, inoltre secerne una melata che se presente in grande quantità fa sviluppare la fumaggine, tale patologia funginea in casi gravi provoca il deperimento della pianta.

Difesa: Si consiglia di intervenire dopo che ha ovideposto (quando sono schiuse il 70/80% delle uova) con olio bianco o con olio minerale (**importante che ci sia una buona umidità relativa perché sia efficace**), con Sali potassici di acidi grassi così da ridurre la presenza dell' insetto, ripetendo il trattamento dopo altri 15 gg.

I prodotti vanno dati verso le ore serali per evitare l'effetto "lente" dovuto al sole.

Altri prodotti contro Saissetia Oleae sono

- pyraflufen (regolatore di crescita), utilizzabile in casi gravi
- deltametrina, lambda cialotrina (piretroidi), attenzione hanno anche effetti secondari negativi
- flupyradifurone (sistemico) utilizzabile solo 1 volta/anno non importa il target

Viene osservato che l' utilizzo del caolino/zeolite per la difesa contro altri insetti aiuta a contrastare anche la Cocciniglia.

Gestione agronomica

Effettuare sfalci e del sotto-chioma per ridurre il ristagno di umidità ed agevolare la crescita del frutto.

Servizio tecnico 3389176435 - 3405563626