



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Bollettino Difesa Integrata n° 15 del 01/08/2024

Andamento meteo

E prevista per la il tardo pomeriggio/serata di giovedì un rapido afflusso di correnti umide a carattere temporalesco, questa instabilità tenderà a ridurre la temperatura nei giorni seguenti.



Foto: olivi Zona Dolga Krona

Fenologia

Gli olivi presentano la fase fenologica di:

Bianchera : 2° accrescimento del frutto

Leccino: 2° accrescimento del frutto

Insetti:

➤ ***Margaronia (Palpita Unionalis)***

Continuano a verificarsi diverse catture del lepidottero nella zona di Palmanova tuttavia basse da non giustificare un trattamento.

Difesa: non sono necessari trattamenti.



Foto: Margaronia



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

➤ *Mosca dell'olivo (B. oleae)*



Foto: larva di 2^a età di mosca zona Bagnoli



Foto: larva di 1^a età viva zona Muggia

Le temperature elevate continuano ad ostacolare l'infestazione e la proliferazione del parassita, in quasi tutte le zone e su varietà a drupa grossa vengono rilevate parecchie punture sterili, tuttavia viene rilevato un aumento delle catture di esemplari adulti sulle trappole di monitoraggio.

Dall'analisi al microscopio e in campo si rilevano diverse larve di prima età morte, in alcuni casi negli areali di Montedoro, Muggia e Bagnoli si è osservato lo sviluppo larvale fino alla larva di 3^a età viva.



Foto: larva di 3^a età zona Montedoro



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
 c/o Camera di commercio di Trieste
 Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
 Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
 San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
 FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Difesa: si consiglia di utilizzare prodotti repellenti quali Caolino o Zeolite per evitare le ovideposizioni, si raccomanda l' utilizzo di un' adesivante per evitare che il prodotto venga dilavato da eventuali precipitazioni e di un bagnante affinché il prodotto venga distribuito omogeneamente sulla drupa. Nel caso il prodotto risultasse ancora ben presente sulle olive dopo le precipitazioni, non servirà ripetere il trattamento.

Per chi non optasse per l' intervento repellente si consiglia l' utilizzo di prodotti adulticidi subito dopo la pioggia, per abbassare la presenza di esemplari adulti presenti nell' oliveto, va ricordato che l' utilizzo di questi prodotti ottiene un buon risultato se fatto in prevenzione in assenza di pioggia dilavante.

Qualora si volesse intervenire con prodotti larvicidi si consiglia di contattare il tecnico di riferimento per posizionare il trattamento subito dopo la schiusura delle ovature, dato che i prodotti disponibili utilizzabili colpiscono solo larve giovani, quindi ai primi stati di sviluppo.

| Prov. | Comune | Località | n° catture mosca |
|-------|-------------------------|------------------------|------------------|
| PN | Aviano | Aviano | 0 |
| UD | Osoppo | Osoppo | 4 |
| UD | Gemona | Gemona | 7 |
| UD | Cividale | Cividale | 0 |
| UD | Castions di Strada | Castions di Strada | 0 |
| UD | Carlino | Carlino | 2 |
| UD | Lestizza | Lestizza | 2 |
| UD | Latisana | Latisana | 1 |
| GO | Sagrado | Sagrado | 0 |
| GO | Ronchi | Selz | 1 |
| TS | Duino Aurisina | Slivia | 1 |
| TS | Duino Aurisina | Sgonico | 4 |
| TS | Trieste | Campanelle | 5 |
| TS | San Dorligo | Bagnoli | 2 |
| TS | San Dorligo della Valle | Dolga Krona | 2 |
| TS | San Dorligo | Montedoro | 0 |
| TS | San Dorligo | Caresana | 6 |
| TS | Muggia | S.Barbara | 5 |
| TS | Muggia | Darsella S. Bartolomeo | 7 |

Tabella: catture mosca dell' olivo

| Prov. | Comune | Località | Punture sterili | Uova | Larve vive 1. età | Larve morte 1. età | Larve vive 2. età | Larve morte 2. età | Larve vive 3. età | Larve morte 3. età | Pupe vive | Pupe morte | Fori uscita | % INFESTAZIONE ATTIVA | % INFESTAZIONE DANNOSA | % INFESTAZIONE TOTALE | % MORTALITA' 1 e II età |
|-------|-------------------------|------------------------|-----------------|------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| UD | Cividale | Cividale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GO | Sagrado | Sagrado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GO | Ronchi | Selz | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| TS | Duino Aurisina | Slivia | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TS | Duino Aurisina | Sgonico | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TS | Trieste | Campanelle | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| TS | San Dorligo | Bagnoli | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| TS | San Dorligo della Valle | Dolga Krona | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TS | San Dorligo | Montedoro | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| TS | San Dorligo | Caresana | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TS | Muggia | S.Barbara | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| TS | Muggia | Darsella S. Bartolomeo | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |

Foto: tabella infestazione mosca



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

➤ *Cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)*



Foto: ovatura di cimice zona Maniago

La fase fenologica di indurimento del nocciolo rilevata in tutti i comprensori monitorati ci da l' indicazione che l' attività trofica della cimice marmorata asiatica a danno del seme venga meno, ora l' insetto continuerà a colpire le olive in fase di crescita ma causerà danni quantitativi di lieve/nulla entità.

Difesa: non sono consigliati interventi

Servizio tecnico N. Riggi 3389176435 -A. Mechi 3405563626