



CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE n. 13 del 31 luglio 2026

Sommario

ANDAMENTO METEO.....	1
FENOLOGIA	1
SITUAZIONE FITOSANITARIA	3
<i>CIMICE MARMORATA ASIATICA (Halyomorpha halys)</i>	3
<i>MOSCA DELL'OLIVO (Bactrocera oleae)</i>	3
<i>OCCHIO DI PAVONE (Spilocaea oleagina)</i>	5
<i>PIOMBATURA (Pseudocercospora cladosporioides)</i>	5
GESTIONE AGRONOMICA	6
IRRIGAZIONE	6

ANDAMENTO METEO

Il prolungato dominio dell'anticiclone africano determinerà condizioni di stabilità assoluta e caldo intenso sul territorio. Nelle aree di pianura e nella fascia collinare di Udine e di Pordenone i cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime diffusamente attestate tra i 36°C e i 38°C (con punte di 39-40°C) e tassi di umidità in aumento, responsabili di una marcata afa diurna e notturna.

Le temperature costantemente superiori ai 32-33°C per molte ore consecutive indurranno un blocco fisiologico nell'ovideposizione della mosca dell'olivo, provocando un'elevata mortalità naturale di uova e larve di prima età nei frutti esposti. Di contro, l'assenza di precipitazioni e i tassi di evapotraspirazione estremamente elevati richiederanno un attento monitoraggio dello stress idrico delle piante, rendendo consigliabili interventi mirati di irrigazione di soccorso, in particolare nei terreni sciolti, in oliveti giovani e in oliveti in produzione carichi di frutti.

FENOLOGIA

La maggior parte delle cultivar stanno entrando verso il secondo stadio di ingrossamento dei frutti. Questa fase fenologia rende l'oliva maggiormente suscettibile all'attacco di Mosca dell'olivo.



Foto 1 e 2. Varietà Bianchera a Polcenigo (PN) e a Cividale (UD)



Foto 3 e 4. Varietà Leccino a Gemona (UD) e a Nimis (UD)



Foto 5. Varietà Lecciana a Moruzzo (UD)

SITUAZIONE FITOSANITARIA

CIMICE MARMORATA ASIATICA (*Halyomorpha halys*)

Di seguito si riportano i dati relativi alle catture campionate nell'ultima settimana:

Provincia	Comune	27/07/2026
UD	Cividale	40 adulti + 5 neanidi
UD	Moruzzo	46 adulti
PN	Caneva	13 adulti

La necessità di intervenire va valutata caso per caso, concentrando l'attenzione prevalentemente sulle varietà più tardive o laddove si riscontrino ancora attacchi attivi.

Si raccomanda di valutare l'applicazione di eventuali trattamenti con il supporto di un tecnico.

La pressione del fitofago sulle colture sta progressivamente cambiando dinamica grazie allo sviluppo dei frutti. Man mano che la drupa completa la fase di indurimento del nocciolo, la suscettibilità dell'oliva diminuisce. Sebbene la cimice, se ancora presente in oliveto, continuerà a pungere le olive, i danni non saranno così rilevanti, poiché la successiva fase di ingrossamento dell'oliva è decisamente meno sensibile rispetto a quella iniziale di post-allegagione.

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Di seguito si riportano le tabelle delle catture settimanali di adulti di mosca dell'olivo e il monitoraggio settimanale delle olive per l'infestazione attiva e dannosa:

Prov.	Comune	29 ^a settimana	30 ^a settimana	31 ^a settimana
UD	Cividale	0	0	3 m
UD	Gemona	3 f + 10 m	2 f + 4 m	0
UD	Majano	0	1 m	1 m
UD	Moruzzo	0	2 m	1 m
UD	Nespolo	2 m	1 m	4 f + 4 m
UD	Nimis	0	5 m	2 m
UD	Caneva	1 m	0	1 f + 1 m
PN	Montereale V.	0	1 m	2 f + 6 m

PN	Polcenigo	0	0	1 f + 1 m
PN	S. Quirino	2 f + 6 m	1 f + 4 m	4 f + 7 m
UD	Osoppo	2 f + 1 m	0	1 m
UD	Pozzuolo	1 m	1 f	1 m
UD	Faedis	0	2 f + 1 m	1 f + 1 m
UD	Povoletto	2 f	0	1 f
UD	Rive d'Arcano	0	2 m	1 f + 1 m
UD	Latisana	1 f + 1 m	1 m	0
UD	Castions di S.	0	1 m	0
UD	Premariacco	0	0	0

Pro v.	Comune	n° catture mosca	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% MORTALITA' I e II età
UD	Cividale	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Moruzzo	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Majano	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Nespolo	8	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
UD	Gemona	0	4	0	0	1	0	2	2	0	2	0	1	0	5	3
UD	Nimis	2	1	3	0	3	0	1	3	1	0	0	0	3	4	4
PN	Caneva	2	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
PN	Polcenigo	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
PN	S. Quirino	11	6	0	1	1	2	1	5	1	0	1	0	3	7	2
PN	Mont. V.	8	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
UD	Rive D'Arc.	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
UD	Osoppo	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Povoletto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Faedis	2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	2
UD	Premariacco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Pozzuolo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Castions di S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Latisana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


A causa dell'abbassamento delle temperature riscontrato la scorsa settimana, in alcuni siti di monitoraggio si è riscontrato un aumento delle catture di individui adulti e, in alcuni casi, l'aumento dell'infestazione attiva (presenza di uova e larve di 1° età vive). Generalmente la soglia di intervento



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

in cui è giustificato un trattamento con principi attivi sistemici è quando la percentuale di infestazione attiva è pari almeno al 5-6%: al momento i valori riscontrati sono ancora bassi in tutti i siti di monitoraggio e le temperature alte previste per i prossimi giorni scoraggiano la crescita degli stadi giovanili su olive già colpite; invitiamo perciò gli olivicoltori a monitorare i bollettini della prossima settimana con le indicazioni eventuali di intervento, oltre ad eseguire un proprio monitoraggio aziendale.

In questa fase è raccomandato focalizzarsi sulla lotta adulticida: laddove si riscontrano più di cinque catture di individui adulti, si consiglia un tempestivo intervento con **esche a base di Spinosad (max. 8 interventi/anno)** e/o predisporre in oliveto le **trappole per la cattura massale**.

*OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleagina*)*

Viste le alte temperature si consiglia di sospendere i trattamenti a base di rame.

*PIOMBATURA (*Pseudocercospora cladosporioides*)*

In alcune zone di monitoraggio e soprattutto su cultivar come Frantoio e Leccino si è riscontrata la presenza di ingiallimenti fogliari riconducibili alla sintomatologia della piombatura dell'olivo (classiche macchie grigio piombo nella pagina inferiore delle foglie ingiallite).

Valutare con il proprio tecnico di riferimento un intervento a base di rame quando le temperature saranno più miti. È consigliato monitorare il proprio oliveto se si rileva la presenza di questi sintomi: questa patologia si è riscontrata maggiormente in questa annata, anche se generalmente risulta meno impattante rispetto all'occhio di pavone.



Foto 6. Sintomi di piombatura su cultivar Frantoio.

GESTIONE AGRONOMICA

IRRIGAZIONE

In questo momento della stagione gli oliveti hanno superato la fase critica di cascola fisiologica ma per gli impianti giovani e quelli già in produzione che hanno carica di drupe è consigliato programmare degli interventi irrigui di soccorso, per aiutare a superare lo stress termico e garantire una buona produzione.

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi

Servizio tecnico SISSAR 327-6574870

Per ERS 338-9385559