



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**
Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE n. 14 del 7 agosto 2026

Sommario

ANDAMENTO METEO.....	1
FENOLOGIA	2
SITUAZIONE FITOSANITARIA	3
<i>CIMICE MARMORATA ASIATICA (Halyomorpha halys)</i>	3
<i>MOSCA DELL'OLIVO (Bactrocera oleae)</i>	3
<i>OCCHIO DI PAVONE (Spilocaea oleagina)</i>	5
<i>PIOMBATURA (Pseudocercospora cladosporioides)</i>	5
IRRIGAZIONE	6
POTATURA ESTIVA	6

ANDAMENTO METEO

Per questo fine settimana è previsto il passaggio di un fronte instabile con rovesci, temporali sparsi e un calo delle temperature. Invece, da lunedì della prossima settimana tornerà il caldo stabile con il ripristino dell'anticiclone, sole prevalente e temperature in forte rialzo.

Consigli utili:

- verificare ed eventualmente ripristinare i trattamenti protettivi (caolino) se dilavati dalle piogge;
- Le temperature sopra i 32-33 °C limiteranno l'attività degli individui adulti e la sopravvivenza dei primi stadi giovanili della Mosca dell'olivo, ma è necessario proseguire il monitoraggio delle trappole e delle drupe;
- Valutare irrigazioni di soccorso per evitare stress idrici durante i picchi di calore.

FENOLOGIA

La maggior parte delle cultivar stanno entrando verso il secondo stadio di ingrossamento dei frutti. Questa fase fenologia rende l'oliva maggiormente suscettibile all'attacco di Mosca dell'olivo.



Foto 1 e 2. Varietà Bianchera a Cividale (UD) e a Nespoledo (UD)




Foto 3 e 4. Varietà Leccino a Nespoledo (UD) e Grignani a Montereale V. (PN)

SITUAZIONE FITOSANITARIA

CIMICE MARMORATA ASIATICA (*Halyomorpha halys*)

Di seguito si riportano i dati relativi alle catture campionate nell'ultima settimana:

Provincia	Comune	03/08/2026
UD	Cividale	4 adulti
UD	Moruzzo	84 adulti
PN	Caneva	9 adulti

Con il completamento dell'indurimento del nocciolo e l'ingrossamento della drupa, la suscettibilità dell'oliva diminuisce, rendendo i danni da puntura della cimice decisamente meno rilevanti rispetto alle prime fasi di sviluppo. Non sono consigliati trattamenti.

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Di seguito si riportano le tabelle delle catture settimanali di adulti di mosca dell'olivo e il monitoraggio settimanale delle olive per l'infestazione attiva e dannosa:

Prov.	Comune	29 ^a settimana	30 ^a settimana	31 ^a settimana	32 ^a settimana
UD	Cividale	0	0	3 m	0
UD	Gemona	3 f + 10 m	2 f + 4 m	0	0
UD	Majano	0	1 m	1 m	1 f
UD	Moruzzo	0	2 m	1 m	0
UD	Nespolo	2 m	1 m	4 f + 4 m	0
UD	Nimis	0	5 m	2 m	1 m
UD	Caneva	1 m	0	1 f + 1 m	0
PN	Montereale V.	0	1 m	2 f + 6 m	0
PN	Polcenigo	0	0	1 f + 1 m	2 m
PN	S. Quirino	2 f + 6 m	1 f + 4 m	4 f + 7 m	0
UD	Osoppo	2 f + 1 m	0	1 m	0
UD	Pozzuolo	1 m	1 f	1 m	0
UD	Faedis	0	2 f + 1 m	1 f + 1 m	0
UD	Povoletto	2 f	0	1 f	0

UD	Rive d'Arcano	0	2 m	1 f + 1 m	0
UD	Latisana	1 f + 1 m	1 m	0	0
UD	Castions di S.	0	1 m	0	1 m
UD	Premariacco	0	0	0	0

Pro v.	Comune	n° catt ure mos ca	Punt ure sterili	Uo va	Lar ve viv e 1. età	Larv e mor te 1. età	Lar ve viv e 2. età	Larv e mor te 2. età	Lar ve viv e 3. età	Larv e mor te 3. età	Pu pe viv e	Pup e mor te	Fori usci ta	% INFESTAZI ONE ATTIVA	% INFESTAZI ONE DANNOS A	% MORTAL ITA' I e II età
UD	Cividale	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Moruzzo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Majano	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Nespolo	0	5	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2
UD	Gemona	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
UD	Nimis	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PN	Caneva	0	4	0	1	4	1	2	0	0	1	3	0	2	4	6
PN	Polcenigo	2	3	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	3	0	4
PN	S. Quirino	0	5	0	0	4	1	3	0	2	0	2	2	1	6	7
PN	Mont. V.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
UD	Rive D'Arcano	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
UD	Osoppo	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
UD	Polovetto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Faedis	0	1	0	1	0	0	2	1	1	0	5	1	1	9	9
UD	Premariacco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Pozzuolo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Castions di Strada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Latisana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A causa del caldo afoso registrato in questi giorni, nelle stazioni di monitoraggio si rileva una **presenza di individui adulti molto bassa o del tutto nulla**. Anche l'infestazione attiva (presenza di uova e larve di 1° età vive) si mantiene su valori ampiamente inferiori alla soglia di intervento (**almeno il 5-6% di infestazione attiva per trattamenti con prodotti sistemici**), e le elevate temperature previste continueranno a scoraggiare lo sviluppo degli stadi giovanili. Invitiamo comunque gli olivicoltori a proseguire con il costante monitoraggio aziendale e a seguire i prossimi bollettini.

In questa fase si raccomanda di mantenere l'attenzione sulla prevenzione e sulla lotta adalticida: in caso di presenza di catture di adulti sarà opportuno intervenire con **esche attivate a base di Spinosad (max. 8 interventi/anno)** e/o predisporre le **trappole per la cattura massale**.

Si consiglia di provvedere in ottica preventiva con trattamenti protettivi a base di **polveri di roccia**: il caolino svolge un'azione meccanica deterrente, oltre a ridurre la temperatura superficiale delle drupe e a proteggere le drupe dalle alte temperature.

Si consiglia di effettuare i trattamenti dopo le piogge previste per il fine settimana.

OCCHIO DI PAVONE (Spilocaea oleagina)

Viste le alte temperature si consiglia di sospendere i trattamenti a base di rame.

PIOMBATURA (Pseudocercospora cladosporioides)

In alcune zone di monitoraggio e soprattutto su cultivar come Frantoio e Leccino si è riscontrata la presenza di ingiallimenti fogliari riconducibili alla sintomatologia della piombatura dell'olivo (classiche macchie grigio piombo nella pagina inferiore delle foglie ingiallite).

Valutare con il proprio tecnico di riferimento un intervento a base di rame quando le temperature saranno più miti. È consigliato monitorare il proprio oliveto se si rileva la presenza di questi sintomi: questa patologia si è riscontrata maggiormente in questa annata, anche se generalmente risulta meno impattante rispetto all'occhio di pavone.



Foto 5. Sintomi di piombatura su cultivar Frantoio.



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

GESTIONE AGRONOMICA

IRRIGAZIONE

In questo momento della stagione gli oliveti hanno superato la fase critica di cascola fisiologica ma per gli impianti giovani e quelli già in produzione che hanno una buona carica di drupe è consigliato programmare degli interventi irrigui di soccorso e/o l'utilizzo di polveri di roccia per aiutare a superare lo stress termico e garantire una buona produzione.

POTATURA ESTIVA

Si consiglia di effettuare l'eliminazione dei polloni e succhioni superflui.

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi

Servizio tecnico SISSAR 327-6574870

Per ERSA 338-9385559