



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO
PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE
n. 17 del 28 agosto 2026**

Sommario

ANDAMENTO METEO	1
FENOLOGIA	2
SITUAZIONE FITOSANITARIA	2
<i>CIMICE MARMORATA ASIATICA (Halyomorpha halys)</i>	2
<i>MARGARONIA (Palpita unionalis)</i>	3
<i>MOSCA DELL'OLIVO (Bactrocera oleae)</i>	3
<i>PATOGENI FUNGINI (Occhio di pavone, Piombatura e Lebbra)</i>	5

ANDAMENTO METEO

La settimana sarà caratterizzata da una spiccata variabilità, determinata dall'alternanza tra rapidi passaggi perturbati e temporanee rimonte anticicloniche, con una generale flessione delle temperature nella seconda parte del periodo. Tra venerdì sera e sabato mattina il transito di un fronte instabile determinerà rovesci e temporali sparsi, mentre a partire da domenica l'espansione dell'alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato, con temperature massime che si attesteranno sui 30-31°C. Da martedì l'afflusso di correnti orientali più fresche causerà un sensibile calo termico (massime in contrazione fino a 24°C) e una nuova fase di instabilità diffusa, con precipitazioni sparse e un deciso aumento del tasso di umidità relativa. Da giovedì è atteso un rapido miglioramento, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e temperature massime in graduale risalita verso i 27-28°C.

In relazione alle dinamiche meteorologiche attese, si richiamano le seguenti indicazioni per la difesa dell'oliveto:

- Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): la flessione termica prevista dal fine settimana (con massime ottimali intorno ai 24°C) e il contemporaneo incremento dell'umidità post-pioggia configureranno uno scenario estremamente favorevole all'attività trofica e all'ovideposizioni degli adulti. Si raccomanda di intensificare i controlli visivi sulle drupe e il monitoraggio dei campionamenti tramite trappole.
- Patologie fungine (Occhio di pavone, Piombatura e Lebbra): i prolungati periodi di bagnatura fogliare previsti nelle ore notturne costituiscono potenziali eventi infettivi per la germinazione delle spore. L'attenzione deve essere massima negli oliveti che storicamente

presentano infezioni elevate, caratterizzati da sesti d'impianto fitti o situati in zone di fondovalle scarsamente aerate.

FENOLOGIA

Per la maggior parte delle cultivar, le drupe stanno raggiungendo il 100% delle dimensioni finali.



Foto 1 e 2. Varietà Bianchera a Nespolo (UD) e Leccino a Polcenigo (PN)

SITUAZIONE FITOSANITARIA

CIMICE MARMORATA ASIATICA (*Halyomorpha halys*)

Di seguito si riportano i dati relativi alle catture campionate nell'ultima settimana:

Provincia	Comune	24/08/2026
UD	Cividale	25
UD	Moruzzo	24
PN	Caneva	5

Con il completamento dell'indurimento del nocciolo e l'ingrossamento della drupa, la suscettibilità dell'oliva diminuisce, rendendo i danni da puntura della cimice decisamente meno rilevanti rispetto alle prime fasi di sviluppo. Non sono consigliati trattamenti.

MARGARONIA (Palpita unionalis)

Dal monitoraggio sul territorio sono stati riscontrati danni da erosione su olive situate in prossimità dei germogli giovani colpiti da Margaronia.

Nelle prime fasi, le larve si nutrono delle foglie apicali più giovani, compromettendo lo sviluppo dei rametti. Questo danno ha ripercussioni dirette sul raccolto dell'anno successivo, poiché l'olivo fruttifica sui rami dell'anno precedente: la perdita dei germogli riduce quindi la potenziale capacità produttiva futura.

Le larve, inoltre, attaccano le olive in accrescimento rosicchiandone la polpa fino al nocciolo. Le erosioni sui frutti, oltre a ostacolarne la crescita, espongono i tessuti all'ossidazione e all'ingresso di funghi e batteri patogeni. Tutto ciò compromette seriamente la qualità delle drupe e dell'olio estratto, provocando un innalzamento dei perossidi e dell'acidità, con un conseguente declassamento del valore commerciale del prodotto.

Valutare con il tecnico di riferimento un trattamento con olio bianco oppure con *Bacillus thuringiensis*. Interventi con principi attivi come Spinosad impiegato per la gestione della mosca dell'olivo possono agire indirettamente anche su margaronia.

MOSCA DELL'OLIVO (Bactrocera oleae)

Di seguito si riportano le tabelle delle catture settimanali di adulti di mosca dell'olivo e il monitoraggio settimanale delle olive per l'infestazione attiva e dannosa:

Prov.	Comune	29 ^a settimana	30 ^a settimana	31 ^a settimana	32 ^a settimana	33 ^a settimana	34 ^a settimana	35 ^a settimana
UD	Cividale	0	0	3 m	0	0	0	0
UD	Gemona	3 f + 10 m	2 f + 4 m	0	0		1 m	0
UD	Majano	0	1 m	1 m	1 f	0	0	0
UD	Moruzzo	0	2 m	1 m	0	1m	0	0
UD	Nespolo	2 m	1 m	4 f + 4 m	0	0	1 m	1 f

UD	Nimis	0	5 m	2 m	1 m	2f+3m	0	6
UD	Caneva	1 m	0	1 f + 1 m	0	0	0	0
PN	Mont. Valc.	0	1 m	2 f + 6 m	0	0	0	1 f
PN	Polcenigo	0	0	1 f + 1 m	2 m	0	0	1 m
PN	S. Quirino	2 f + 6 m	1 f + 4 m	4 f + 7 m	0	1f	0	0
UD	Osoppo	2 f + 1 m	0	1 m	0	0	0	2 m
UD	Pozzuolo	1 m	1 f	1 m	0	0	0	0
UD	Faedis	0	2 f + 1 m	1 f + 1 m	0	0	0	2 m + 1 f
UD	Povoletto	2 f	0	1 f	0	0	1	0
UD	Rive d'Arc.	0	2 m	1 f + 1 m	0	0	0	0
UD	Latisana	1 f + 1 m	1 m	0	0	0	0	0
UD	Castions di S.	0	1 m	0	1 m	1 m	0	0
UD	Premariacco	0	0	0	0	0	0	0


Pro v.	Comune	n° catt ure mos ca	Punt ure sterili	Uo va	Lar ve viv e 1. età	Larv e mor te 1. età	Lar ve viv e 2. età	Larv e mor te 2. età	Lar ve viv e 3. età	Larv e mor te 3. età	Pu pe viv e	Pup e mor te	Fori usci ta	% INFESTAZI ONE ATTIVA	% INFESTAZI ONE DANNOS A	% MORTAL ITA' I e II età
UD	Cividale	0	1	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6
UD	Moruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Majano	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
UD	Nespolo	0	1	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8
UD	Gemona	1	2	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	4	2
UD	Nimis	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PN	Caneva	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PN	Polcenigo	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	3	2
PN	S. Quirino	1	3	0	1	4	0	8	0	3	0	6	0	1	9	12
PN	Mont. V.	1	6	0	1	0	0	0	1	1	1	0	2	1	5	0
UD	Rive D'Arcano	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
UD	Osoppo	2	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
UD	Povoletto	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Faedis	3	3	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0	4	0	3
UD	Premariacco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Pozzuolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Castions di Strada	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Latisana	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Il monitoraggio settimanale indica una pressione del parassita sostanzialmente stabile rispetto alla rilevazione precedente. Tuttavia, il calo delle temperature unitamente all'aumento dell'umidità relativa, sta delineando condizioni favorevoli alla ripresa dell'ovideposizione del dittero.

Con un'infestazione attiva sotto la soglia d'intervento (<5%) e piogge imminenti, si consiglia di rinviare l'uso di ovo-larvicidi o adulticidi e procedere come segue:

- Ripristinare le polveri di roccia antideponenti: applicare caolino o zeolite subito dopo il termine delle piogge.
- Rinnovare le esche attivate con Spinosad (max. 8 interventi/anno): posizionare o reintegrare le esche proteiche attivate dopo l'evento piovoso per intercettare gli adulti in volo. Verificare l'efficacia dell'ultimo trattamento eseguito, l'efficacia media è di 12-15 giorni.

PATOGENI FUNGINI (Occhio di pavone, Piombatura e Lebbra)

Le precipitazioni previste e l'aumento dell'umidità possono favorire Occhio di pavone, Piombatura e Lebbra. Negli oliveti con infestazione elevata valutare con il tecnico di riferimento l'intervento con prodotti a base di rame e zolfo, utili anche come antideponenti nei confronti della mosca dell'olivo. Trattare nelle ore più fresche.

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi

Servizio tecnico SISSAR 327-6574870

Per ERSa 338-9385559