



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO
PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE
n. 19 del 11 settembre 2026**

Sommario

ANDAMENTO METEO	1
FENOLOGIA	1
SITUAZIONE FITOSANITARIA	2
<i>MARGARONIA (Palpita unionalis)</i>	2
<i>MOSCA DELL'OLIVO (Bactrocera oleae)</i>	3

ANDAMENTO METEO

Il quadro meteorologico settimanale si aprirà questo venerdì con una residua instabilità mattutina e piogge residue sul settore centro-orientale e sulla costa, lasciando poi spazio a venti di Bora moderata che favoriranno un primo calo dell'umidità fogliare con massime intorno ai 23-25°C. Successivamente, dal fine settimana a martedì, si instaurerà una finestra di stabilità anticiclonica caratterizzata da giornate soleggiate, ventilazione secca da nord e un progressivo aumento termico con massime fino a 27-28°C in pianura.

Questo scenario asciutto, ideale per l'esecuzione di trattamenti di copertura senza rischio di lavaggio e utile a rallentare temporaneamente l'ovideposizione della mosca dell'olivo, cederà il passo tra mercoledì e giovedì della prossima settimana a una nuova perturbazione.

Il conseguente ritorno di piogge diffuse, l'aumento dell'umidità relativa e il calo delle temperature massime verso i 23°C ripristineranno condizioni microclimatiche favorevoli allo sviluppo della mosca, richiedendo agli olivicoltori il mantenimento di un monitoraggio costante delle trappole in campo.

FENOLOGIA

In tutte le zone monitorate le olive hanno completato l'accrescimento raggiungendo la dimensione massima tipica nella maggior parte delle varietà. Da questo momento in poi si osserverà il successivo viraggio del colore dell'epicarpo, le drupe perdono la durezza tipica dello stadio acerbo e iniziano a diventare leggermente più morbide al tatto.



Foto 1 e 2. Varietà Leccino a Nespoledo (UD) e Bianchera a Nimis (UD)

SITUAZIONE FITOSANITARIA

MARGARONIA (Palpita unionalis)

Nel monitoraggio settimanale le catture di Margaronia dell'olivo hanno subito una diminuzione. Tuttavia nei giovani impianti, dove i danni ai germogli apicali possono compromettere lo sviluppo strutturale delle piante, si consiglia di prestare particolare attenzione.

Qualora si valuti un intervento, si suggerisce l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* var. *kurstaki* per abbassare la presenza dell'insetto. Il trattamento va effettuato di sera.

*MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)*

Le recenti piogge e il calo termico hanno creato condizioni ideali per la ripresa dell'attività della mosca dell'olivo, stimolando la possibile ripresa delle ovideposizioni. È fondamentale intensificare il monitoraggio degli oliveti per scegliere la strategia di difesa più idonea.

Si consiglia di proseguire con i trattamenti per il contenimento degli adulti attraverso esche attivate con Spinosad, specialmente se si registra un aumento delle catture nelle trappole. Intervenire tempestivamente subito dopo le piogge. (max 8 trattamenti/anno).

In presenza di uova e larve vive nei frutti, valutare con il proprio tecnico un intervento larvicida con Acetamiprid (max 2 trattamenti/anno, tempo di carenza: 21 giorni prima della raccolta) o con Flupyradifurone (max 1 trattamento/anno, tempo di carenza: 14 giorni prima della raccolta).

Valutare con il proprio tecnico di riferimento l'utilizzo di Piretro naturale se le catture degli adulti sono elevate per un rapido effetto abbattente.



Foto 3. Larva di terzo stadio fotografata allo stereomicroscopio

Di seguito si riportano le tabelle delle catture settimanali di adulti di mosca dell'olivo e il monitoraggio settimanale delle olive per l'infestazione attiva e dannosa:

Prov.	Comune	29 ^a sett.	30 ^a sett.	31 ^a sett.	32 ^a sett.	33 ^a sett.	34 ^a sett.	35 ^a sett.	36 ^a sett.	37 ^a sett.
UD	Cividale	0	0	3 m	0	0	0	0	0	0
UD	Gemona	3 f + 10 m	2 f + 4 m	0	0		1 m	0	0	1 m
UD	Majano	0	1 m	1 m	1 f	0	0	0	0	0

UD	Moruzzo	0	2 m	1 m	0	1m	0	0	0	0
UD	Nespolo	2 m	1 m	4 f + 4 m	0	0	1 m	1 f	1 m	0
UD	Nimis	0	5 m	2 m	1 m	2f+3m	0	6	7 m	27 m
UD	Caneva	1 m	0	1 f + 1 m	0	0	0	0	1 m	1
PN	Mont. Valc.	0	1 m	2 f + 6 m	0	0	0	1 f	0	4 m
PN	Polcenigo	0	0	1 f + 1 m	2 m	0	0	1 m	1 m	0
PN	S. Quirino	2 f + 6 m	1 f + 4 m	4 f + 7 m	0	1f	0	0	1 m	0
UD	Osoppo	2 f + 1 m	0	1 m	0	0	0	2 m	5 m	0
UD	Pozzuolo	1 m	1 f	1 m	0	0	0	0	0	0
UD	Faedis	0	2 f + 1 m	1 f + 1 m	0	0	0	2 m + 1 f	0	1 m
UD	Povoletto	2 f	0	1 f	0	0	1	0	0	0
UD	Rive d'Arc.	0	2 m	1 f + 1 m	0	0	0	0	0	0
UD	Latisana	1 f + 1 m	1 m	0	0	0	0	0	0	0
UD	Castions di S.	0	1 m	0	1 m	1 m	0	0	1 m	0
UD	Premariacco	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pro v.	Comune	n° catture mosca	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Forisciti	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% MORTALITA' I e II età
UD	Cividale	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Moruzzo	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Majano	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
UD	Nespolo	0	2	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4
UD	Gemona	1	5	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	5	0
UD	Nimis	27	3	0	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0	2	5
PN	Caneva	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	1	4
PN	Polcenigo	0	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
PN	S. Quirino	0	0	0	1	3	0	9	0	1	0	0	2	1	3	12
PN	Mont. V.	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2
UD	Rive D'Arc.	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
UD	Osoppo	0	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
UD	Povoletto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Faedis	1	2	0	2	3	0	2	1	1	0	0	0	2	2	5
UD	Premariacco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Pozzuolo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UD	Castions di S.	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
UD	Latisana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi

Servizio tecnico SISSAR 327-6574870

Per ERSa 338-9385559