



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO
PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE
n. 20 del 18 settembre 2026**

Sommario

ANDAMENTO METEO	1
FENOLOGIA	1
SITUAZIONE FITOSANITARIA	2
OCCHIO DI PAVONE (<i>Spilotea oleagina</i>)	2
MOSCA DELL'OLIVO (<i>Bactrocera oleae</i>)	5

ANDAMENTO METEO

Cambiamento del tempo in atto. Dall'Europa centro settentrionale arrivano correnti umide e più instabili. Il cavo d'onda atlantico influenzerà il meteo con temporali e piogge. Sabato e nei giorni successivi, le temperature saranno tipiche della seconda metà di agosto.

FENOLOGIA

In tutte le zone monitorate le olive hanno completato l'accrescimento raggiungendo la dimensione massima tipica nella maggior parte delle varietà. Da questo momento in poi si osserverà il successivo viraggio del colore dell'epicarpo, le drupe perdono la durezza tipica dello stadio acerbo e inizia la fase di inoliazione della drupa.



Foto 1 e 2. Varietà Bianchera a Gemona e Grignan a Polcenigo

SITUAZIONE FITOSANITARIA

OCCHIO DI PAVONE (*Spilotea oleagina*)

Dai monitoraggi, in particolare sulla varietà *Bianchera*, emerge la presenza di infezioni fungine in alcune località. Nel resto del territorio il fungo sembra aver subito il forte stress idrico estivo e le alte temperature, rimane quindi sotto controllo. Nelle prossime settimane diventeranno tuttavia più evidenti gli ingiallimenti fogliari, le classiche macchie a "occhio di pavone" e la conseguente filloptosi.

Provincia	Comune	Località	N° Foglie Campionate	Classe infestazione				N° Foglie infette	Infezione %
				0	1	2	3		
UD	Nespolo	Nespolo	100	99	0	1	0	1	0,67
UD	Cividale	Cividale	100	90	3	5	2	10	6,33
UD	Nimis	Torlano	100	83	4	8	5	17	11,67

UD	Gemona	Gemona	100	91	6	3	0	9	4,00
UD	Majano	San Salvatore	100	96	2	0	2	4	2,67
PN	Montereale	Malnisio	100	94	5	1	0	6	2,33
PN	Polcenigo	Polcenigo	100	100	0	0	0	0	0,00
PN	San Quirino	Sedrano	100	92	4	3	1	8	4,33
UD	Rive d' arcano	Rive d' arcano	100	97	3	0	0	3	1,00
UD	Osoppo	Osoppo	100	84	13	3	0	16	6,33
UD	Castions di S.	Castions di S.	100	98	2	0	0	2	0,67
UD	Latisana	Latisana	100	93	5	2	0	7	3,00
UD	Pozzuolo	Pozzuolo	100	99	1	0	0	1	0,33
UD	Faedis	Faedis	100	96	4	0	0	4	1,33

		Cultivar Leccino							
Provincia	Comune	Località	N° Foglie Campionate	Classe infestazione				N° Foglie infette	Infezione %
				0	1	2	3		
UD	Nespolo	Nespolo	100	100	0	0	0	0	0,00
UD	Cividale	Cividale	100	97	0	1	2	3	2,67
UD	Nimis	Torlano	100	98	1	1	0	2	1,00
UD	Gemona	Gemona	100	97	3	0	0	3	1,00
UD	Majano	San Salvatore	100	92	5	3	0	8	3,67
PN	Montereale V.	Malnisio	100	100	0	0	0	0	0,00
PN	Polcenigo	Polcenigo	100	99	1	0	0	1	0,33
PN	San Quirino	Sedrano	100	100	0	0	0	0	0,00
PN	Caneva	Fiaschetti	100	97	3	0	0	3	1,00
UD	Rive d' arcano	Rive d' arcano	100	98	2	0	0	2	0,67
UD	Osoppo	Osoppo	100	100	0	0	0	0	0,00
UD	Castions di S.	Castions di S.	100	100	0	0	0	0	0,00
UD	Latisana	Latisana	100	100	0	0	0	0	0,00
UD	Pozzuolo	Pozzuolo	100	99	1	0	0	1	0,33
UD	Faedis	Faedis	100	100	0	0	0	0	0,00
UD	Rive d' arcano	Rive d' arcano	100	99	1	0	0	1	0,33
UD	Osoppo	Osoppo	100	99	1	0	0	1	0,33

		Cultivar Lecciana							
UD	Moruzzo	Moruzzo-Pascul	100	86	14	0	0	14	4,67
		Cultivar Coriana							
UD	Moruzzo	Moruzzo-Pascul	100	100	0	0	0	0	0,00

		Cultivar Oliana							
UD	Moruzzo	Moruzzo-Pascul	100	98	1	1	0	2	1,00

Le presenti infestazioni risultano sensibilmente inferiori al rilievo effettuato a maggio 2026, ad eccezione di una località:

Bianchera

Località	Infezione maggio 26 %	Infezione settembre 26 %
Nespolo	8,33	0,67
Cividale	44,33	6,33
Nimis	9,17	11,67
Gemona	22,00	4,00
Majano	64,00	2,67
Montereale	18,00	2,33
Polcenigo	6,67	0,00
San Quirino	38,67	4,33
Caneva	11,00	0,67
Rive d'Arc.	75,33	1,00
Osoppo	51,67	6,33
Castions di S.	22,33	0,67
Latisana	12,00	3,00
Pozzuolo	3,00	0,33
Faedis	0,33	1,33
Povoletto	5,00	0,33

Leccino

Località	Infezione maggio 26 %	Infezione settembre 26 %
Nespolo	0,67	0,00
Cividale	2,67	2,67
Nimis	0,00	1,00
Gemona	0,67	1,00
Majano	23,67	3,67
Montereale	3,00	0,00
Polcenigo	0,00	0,33
San Quirino	3,00	0,00
Caneva	2,00	1,00
Rive d'Arc.	12,33	0,67
Osoppo	11,00	0,00

Castions di S.	1,33	0,00
Latisana	3,33	0,00
Pozzuolo	0,00	0,33
Faedis	0,67	0,00
Povoletto	0,67	0,33

Nelle zone con sintomi evidenti, valutare insieme al tecnico se vi siano i tempi necessari per effettuare trattamenti a base di rame, così da evitare il rischio di lasciare residui durante la frangitura. In alternativa, posticipare a dopo la raccolta il trattamento.

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Nelle zone di monitoraggio la situazione rimane sotto controllo, tuttavia visti gli sbalzi di temperatura degli ultimi giorni, si consiglia di mantenere la soglia di attenzione alta e continuare a monitorare il proprio oliveto. Laddove si riscontra la presenza di adulti, si consiglia di proseguire con i trattamenti per il contenimento attraverso **esche attivate con Spinosad** (max 8 trattamenti/anno). In alternativa valutare l'opportunità di effettuare una copertura col caolino. Si consiglia di contattare il tecnico per valutare insieme se vi siano i tempi necessari per evitare il rischio di lasciare residui durante la frangitura.

Nelle stazioni dove c'è infestazione attiva può essere utilizzato un prodotto a base di Acetamiprid (**massimo 2 interventi l'anno**). Sospendere il trattamento con Acetamiprid 21 giorni prima della raccolta delle olive.

Di seguito si riportano le tabelle delle catture settimanali di adulti di mosca dell'olivo e il monitoraggio settimanale delle olive per l'infestazione attiva e dannosa:

Prov.	Comune	29 ^a sett.	30 ^a sett.	31 ^a sett.	32 ^a sett.	33 ^a sett.	34 ^a sett.	35 ^a sett.	36 ^a sett.	37 ^a sett.	38 ^a sett.	39 ^a sett.
UD	Cividale	0	0	3 m	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Gemona	3f + 10m	2 f + 4 m	0	0		1 m	0	0	1 m	0	0
UD	Majano	0	1 m	1 m	1 f	0	0	0	0	0	0	0
UD	Moruzzo	0	2 m	1 m	0	1m	0	0	0	0	0	0
UD	Nespolo	2 m	1 m	4 f + 4 m	0	0	1 m	1 f	1 m	0	1	1
UD	Nimis	0	5 m	2 m	1 m	2f+3m	0	6	7 m	27 m	15 m	15
PN	Caneva	1 m	0	1 f + 1 m	0	0	0	0	1 m	1	1 m	1
PN	Mont. Valc.	0	1 m	2 f + 6 m	0	0	0	1 f	0	4 m	11 m	11
PN	Polcenigo	0	0	1 f + 1 m	2 m	0	0	1 m	1 m	0	0	0
PN	S. Quirino	2 f + 6 m	1 f + 4 m	4 f + 7 m	0	1f	0	0	1 m	0	2 m	2
UD	Osoppo	2 f + 1 m	0	1 m	0	0	0	2 m	5 m	0	0	0
UD	Pozzuolo	1 m	1 f	1 m	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Faedis	0	2 f + 1 m	1 f + 1 m	0	0	0	2 m + 1 f	0	1 m	1 m + 1 f	1m+1f

UD	Povoletto	2 f	0	1 f	0	0	1	0	0	0	0	0
UD	Rive d'Arc.	0	2 m	1 f + 1 m	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Latisana	1 f + 1 m	1 m	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Castions di S.	0	1 m	0	1 m	1 m	0	0	1 m	0	0	0
UD	Premariacco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pro v.	Comune	n° catture mosca	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Foriscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% MORTALITA' I e II età
UD	Cividale	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
UD	Moruzzo	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Majano	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	2
UD	Nespolo	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
UD	Gemona	0	1	0	0	0	2	2	0	3	1	1	3	2	8	2
UD	Nimis	15	1	1	1	2	1	2	0	1	0	0	0	3	1	4
PN	Caneva	1	2	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2
PN	Polcenigo	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3
PN	S. Quirino	2	1	0	2	2	0	8	0	10	0	3	1	2	14	10
PN	Mont. V.	11	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4
UD	Rive D'Arc.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Osoppo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Povoletto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Faedis	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
UD	Pozzuolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Castions di S.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Latisana	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi

Servizio tecnico SISSAR 327-6574870

Per ERSA 338-9385559